Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617008.html

瑞博西尼

发音为 (rye'' boe sye' klib)

为什么要开这种药?

Ribociclib 与另一种药物联合用于治疗某种类型的激素受体阳性（取决于雌激素等激素的生长）晚期乳腺癌或已扩散到未绝经妇女身体其他部位的乳腺癌（改变生活）；每月月经期结束）以及接近或已经经历更年期的人。Ribociclib 还与氟维司群（Faslodex）联合用于治疗某种类型的激素受体阳性晚期乳腺癌，或作为初始治疗已扩散至身体其他部位的癌症，或用于其他治疗未成功治疗的人群在已经经历过更年期的女性中。Ribociclib 属于一类称为激酶抑制剂的药物。它的作用是阻断一种异常蛋白质的作用，这种蛋白质发出癌细胞繁殖的信号。这有助于减缓或阻止癌细胞的扩散。

这个药应该怎么用?

Ribociclib 以口服片剂的形式出现。在 28 天周期的前 21 天，通常每天早上一次与食物一起服用或不与食物一起服用。每天大约在同一时间服用 ribociclib。仔细遵循处方标签上的说明，并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用 ribociclib。不要多吃或少吃，也不要比医生开的更频繁。

吞下整个药片；不要分裂、咀嚼或压碎它们。不要服用破碎或压碎的药片。

如果您在服用 ribociclib 后呕吐，请不要再服用一剂。继续您的常规给药计划。

您的医生可能会减少您的 ribociclib 剂量或永久或暂时停止您的治疗。这取决于药物对您的效果以及您所经历的副作用。请务必告诉您的医生您在接受 ribociclib 治疗期间的感受。

向您的药剂师或医生索取患者的制造商信息副本。

该药的其他用途

这种药物可用于其他用途；向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施？

在服用 ribociclib 之前，

- 如果您对 ribociclib、任何其他药物或 ribociclib 片剂中的任何成分过敏，请告诉您的医生和药剂师。向您的药剂师索取成分清单。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用的其他处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。请务必提及以下任何一项：胺碘酮（Nexterone，Pacerone）；某些抗生素，如克拉霉素（Biaxin，在 Prevpac）、红霉素（EES、Ery-tab、Eryped）和莫西沙星（Avelox）；某些抗真菌药物，如伊曲康唑（Onmel、Sporanox）、酮康唑（Nizoral）、泊沙康唑（Noxafil）和伏立康唑（Vfend）；bepridil（美国不再提供）；boceprevir（Victrelis，美国不再提供）；氯喹（阿拉伦）；考尼伐坦；环孢素（Gengraf、Neoral、Sandimmune）；二氢麦角胺 (DHE 45, Migranal); 丙吡胺（Norpace）；麦角胺（Ergomar，在 Cafergot，在 Migergot）；依维莫司（Afinitor，Zortress）；芬太尼（Abstral、Actiq、Fentora、Onsolis）；卤泛群（Halfan；美国不再提供）；氟哌啶醇（Haldol）；人类免疫缺陷病毒 (HIV) 的某些药物，例如依法韦仑（Sustiva，在 Atripla）、茚地那韦（Crixivan）、洛匹那韦（在 Kaletra）、奈非那韦（Viracept）、利托那韦（Norvir，在 Kaletra）和沙奎那韦（Invirase）；某些用于癫痫发作的药物，例如卡马西平（Carbatrol、Equetro、Teril 等）和苯妥英（Dilantin、Phenytek）；美沙酮（多洛芬，美沙酮）；奈法唑酮；昂丹司琼（静脉注射）；匹莫齐特（Orap）；普鲁卡因胺；奎尼丁（Nuedexta）；利福平（Rimactane，Rifadin，在 Rifamate，在 Rifater）；西罗莫司（Rapamune）；索他洛尔（Betapace，Sotylize）；他克莫司（Envarsus XR，Prograf）和他莫昔芬（Soltamox）。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。许多其他药物也可能与 ribociclib 相互作用，因此请务必告诉您的医生您正在服用的所有药物，即使是那些未出现在此列表中的药物。
- 告诉您的医生您正在服用什么草药产品，尤其是圣约翰草。
- 如果您最近心脏病发作，请告诉您的医生；或曾经或曾经有过缓慢的心跳；QT 间期延长（一种罕见的心脏问题，可能导致心律不齐、昏厥或猝死）；血液中钾、钙、磷或镁水平异常；心脏衰竭; 或肝脏、肾脏或心脏病。
- 如果您怀孕或计划怀孕，请告诉您的医生。在开始治疗之前，您需要进行妊娠试验。在治疗期间和最后一次服药后的 3 周内，使用可靠的避孕方法来预防怀孕。与您的医生讨论适合您的避孕方法。如果您在服用 ribociclib 时怀孕，请立即致电您的医生。Ribociclib 可能会伤害胎儿。
- 如果您正在母乳喂养或计划母乳喂养，请告诉您的医生。在服用 ribociclib 期间和最后一次服药后至少 3 周内，您不应该进行母乳喂养。
- 您应该知道这种药物可能会降低男性的生育能力。与您的医生讨论服用 ribociclib 的风险。
- 如果您正在接受手术，包括牙科手术，请告诉医生或牙医您正在服用 ribociclib。

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

服用这种药物时不要吃葡萄柚或喝葡萄柚。

如果我忘记服药该怎么办？

跳过错过的剂量并继续您的常规给药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

这种药物会引起副作用吗？

Ribociclib 可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 腹泻
- 便秘
- 肚子痛
- 头痛
- 脱发
- 背痛
- 瘙痒
- 口腔溃疡
- 手、脚、脚踝或小腿肿胀
- 难以入睡或保持睡眠

一些副作用可能很严重。如果您遇到任何这些症状，请立即致电您的医生：

- 发烧、喉咙痛、发冷或其他感染迹象
- 皮疹
- 皮肤起泡或脱皮
- 嘴唇、眼睛或嘴巴燃烧或起泡
- 快速、不规则或剧烈的心跳
- 呼吸困难或呼吸急促；咳嗽有或没有粘液；或胸痛
- 头晕
- 昏厥
- 皮肤或眼睛发黄
- 深色或棕色（茶色）尿液
- 疲倦
- 食欲不振
- 胃右上方疼痛
- 恶心
- 呕吐
- 比正常情况更容易出血或瘀伤

Ribociclib 可能会导致其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告 (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在室温下，远离过多的热量和水分（不要放在浴室里）。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免受中毒，请始终锁上安全帽，并立即将药物放在安全的位置——一个向上、远离、看不见和够不到的地方。http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) 如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. 如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

我应该知道其他信息吗？

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生会在您治疗前和治疗期间下令进行某些实验室测试，以检查您的身体对 ribociclib 的反应。您的医生也可能会在您治疗之前和治疗期间订购心电图（ECG；测量心脏电活动的测试）。

不要让其他人服用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 基斯加利®

组合产品的名称

- 基斯加利®费梅拉®（作为含有来曲唑和 Ribociclib 的组合产品）

最后修订 - 2020 年 12 月 15 日

了解如何引用此页面

美国卫生系统药剂师协会免责声明

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面：2022 年 3 月 25 日