Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601247.html

Risedronato

pronunciado como (ris ed' roe nate)

por que este medicamento é prescrito?

Os comprimidos de risedronato e de liberação retardada (comprimidos de ação prolongada) são usados para prevenir e tratar a osteoporose (uma condição na qual os ossos se tornam finos e fracos e quebram facilmente) em mulheres que passaram pela menopausa ("mudança de vida", final dos períodos menstruais). Os comprimidos de risedronato também são usados para tratar a osteoporose em homens e em homens e mulheres que estão tomando glicocorticóides (um tipo de medicamento corticosteróide que pode causar osteoporose). Os comprimidos de risedronato também são usados para tratar a doença óssea de Paget (uma condição na qual os ossos são moles e fracos e podem ser deformados, dolorosos ou facilmente quebrados). Risedronato está em uma classe de medicamentos chamados bifosfonatos. Funciona prevenindo a degradação óssea e aumentando a densidade óssea (espessura).

como este medicamento deve ser usado?

Risedronato vem como um comprimido e um comprimido de liberação retardada para tomar por via oral. Os comprimidos de liberação retardada são geralmente tomados uma vez por semana pela manhã, imediatamente após o café da manhã. Os comprimidos são geralmente tomados com o estômago vazio uma vez por dia de manhã, uma vez por semana de manhã, uma vez por mês de manhã ou uma vez por mês durante duas manhãs consecutivas, dependendo da sua condição e da dosagem prescrita pelo seu médico. Se você estiver tomando risedronato uma vez por semana, uma vez por mês ou uma vez por mês por 2 dias seguidos, tome-o no mesmo dia a cada semana ou mês ou nos mesmos 2 dias seguidos a cada mês. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome risedronato exatamente como indicado.

Risedronato pode não funcionar corretamente e pode danificar o esôfago (tubo que conecta a boca e o estômago) ou causar feridas na boca se não for tomado de acordo com as instruções a seguir. Informe o seu médico se você não entender, achar que não se lembrará ou não conseguir seguir estas instruções:

- Deve tomar os comprimidos de risedronato imediatamente após se levantar da cama de manhã e antes de comer ou beber qualquer coisa. Deve tomar os comprimidos de libertação retardada de risedronato imediatamente após o pequeno-almoço. Nunca tome risedronato na hora de dormir ou antes de acordar e sair da cama durante o dia.
- Engula os comprimidos com um copo cheio (180 a 240 mL) de água pura enquanto estiver sentado ou em pé. Engula os comprimidos de liberação retardada com pelo menos 120 mL de água pura enquanto estiver sentado ou em pé. Nunca tome risedronato com chá, café, suco, água mineral, leite, outras bebidas lácteas ou qualquer outro líquido que não seja água pura.

- Engula os comprimidos e os comprimidos de libertação retardada inteiros. Não os parta, mastigue ou esmague. Não chupe os comprimidos nem os mantenha na boca por muito tempo.
- Depois de tomar risedronato, não coma, beba ou tome qualquer outro medicamento por pelo menos 30 minutos. Não se deite por pelo menos 30 minutos depois de tomar risedronato. Sente-se ou fique em pé até que tenham passado pelo menos 30 minutos.

O risedronato controla a osteoporose e a doença óssea de Paget, mas não cura essas condições. Risedronato ajuda a tratar e prevenir a osteoporose apenas desde que seja tomado regularmente. Continue a tomar risedronato mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar risedronato sem falar com seu médico, mas converse com seu médico de tempos em tempos sobre se você ainda precisa tomar risedronato.

O seu médico ou farmacêutico fornecer-lhe-á o folheto informativo do fabricante (Guia de Medicação) quando iniciar o tratamento com risedronato e sempre que reabastecer a sua receita. Leia atentamente as informações e pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver alguma dúvida. Você também pode visitar o site da Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) ou no site do fabricante para obter o Guia de Medicação.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar risedronato,

- informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico ao risedronato, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos ingredientes dos comprimidos de risedronato ou comprimidos de liberação retardada. Pergunte ao seu farmacêutico ou consulte o Guia de Medicação para obter uma lista dos ingredientes
- informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: inibidores da angiogênese, como bevacizumabe (Avastin), everolimus (Afinitor, Zortress), pazopanibe (Votrient), sorafenibe (Nexavar) ou sunitinibe (Sutent); aspirina e outros fármacos anti-inflamatórios não esteróides (AINEs) tais como ibuprofeno (Advil, Ibu-Tab, Motrin, outros) e naproxeno (Aleve, Naprelan, Naprosyn, outros); quimioterapia do câncer; ou esteróides orais, como dexametasona, metilprednisolona (Medrol) e prednisona (Rayos). Se estiver a tomar os comprimidos de libertação retardada, também deve informar o seu médico se estiver a tomar um H_2bloqueador como cimetidina, famotidina (Pepcid), nizatidina (Axid) e ranitidina (Zantac) ou um inibidor da bomba de prótons, como esomeprazol (Nexium, no Vimovo), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec, Zegerid), pantoprazol (Protonix)) e rabeprazol (AcipHex). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.
- você deve saber que Actonel e Atelvia contêm risedronato. Você não pode tomar esses dois medicamentos ao mesmo tempo.
- se estiver tomando outros medicamentos orais, incluindo vitaminas, suplementos ou antiácidos, tome-os pelo menos 30 minutos depois de tomar risedronato.
- Informe o seu médico se tem ou já teve um nível baixo de cálcio no sangue ou quaisquer problemas com o esófago e se não consegue sentar-se ou ficar em pé durante pelo menos 30 minutos. O seu médico pode dizer-lhe que não deve tomar risedronato.

- informe o seu médico se estiver a fazer radioterapia; se tem ou já teve dificuldade em engolir; azia; úlceras ou outros problemas no estômago; anemia (condição em que os glóbulos vermelhos não trazem oxigênio suficiente para todas as partes do corpo); Câncer; qualquer tipo de infecção, especialmente na boca; problemas com sua boca, dentes ou gengivas; qualquer condição que impeça a coagulação normal do sangue; ou doença dentária ou renal.
- informe o seu médico se estiver grávida ou a amamentar. Informe também o seu médico se planeia engravidar a qualquer momento no futuro, porque o risedronato pode permanecer no seu corpo durante anos depois de parar de tomá-lo. Ligue para o seu médico se engravidar durante ou após o tratamento com risedronato.
- você deve saber que risedronato pode causar dores ósseas, musculares ou articulares graves. Você pode começar a sentir essa dor dentro de dias, meses ou anos depois de tomar risedronato pela primeira vez. Embora este tipo de dor possa começar depois de ter tomado risedronato por algum tempo, é importante que você e seu médico percebam que pode ser causado pelo risedronato. Ligue para o seu médico imediatamente se sentir dor intensa a qualquer momento durante o tratamento com risedronato. O seu médico pode dizer-lhe para parar de tomar risedronato e a sua dor pode desaparecer depois de parar de tomar a medicação.
- você deve saber que risedronato pode causar osteonecrose da mandíbula (ONM, uma condição grave do osso da mandíbula), especialmente se você tiver cirurgia ou tratamento odontológico enquanto estiver tomando a medicação. Um dentista deve examinar seus dentes e realizar quaisquer tratamentos necessários, incluindo limpeza ou fixação de dentaduras mal ajustadas, antes de começar a tomar risedronato. Certifique-se de escovar os dentes e limpar a boca adequadamente enquanto estiver tomando risedronato. Fale com o seu médico antes de fazer qualquer tratamento dentário enquanto estiver a tomar este medicamento.
- converse com seu médico sobre outras coisas que você pode fazer para prevenir o desenvolvimento ou agravamento da osteoporose. Seu médico provavelmente lhe dirá para evitar fumar e beber grandes quantidades de álcool e seguir um programa regular de exercícios com pesos.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Você deve comer muitos alimentos ricos em cálcio e vitamina D enquanto estiver tomando risedronato. Seu médico lhe dirá quais alimentos são boas fontes desses nutrientes e quantas porções você precisa por dia. Se você achar difícil comer o suficiente desses alimentos, informe o seu médico. Nesse caso, seu médico pode prescrever ou recomendar um suplemento.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Se você perder uma dose de risedronato uma vez ao dia, não a tome no final do dia. Pule a dose esquecida e tome uma dose na manhã seguinte, como de costume.

Se você perder uma dose de risedronato uma vez por semana, não a tome no final do dia. Tome uma dose na manhã após se lembrar. Em seguida, volte a tomar uma dose uma vez por semana no dia habitual.

Se você esquecer de uma dose mensal de risedronato, mas se lembrar mais de 7 dias antes da próxima dose programada, tome a dose esquecida na manhã seguinte. Se você se lembrar menos de 7 dias antes da próxima dose programada, não tome a dose esquecida. Em vez disso, espere até a manhã da próxima dose programada e, em seguida, tome risedronato como de costume.

Se você perder uma ou ambas as doses dos dois dias seguidos, risedronato uma vez por mês, mas se lembrar mais de 7 dias antes da próxima dose programada, você pode tomar as doses perdidas. Tome a primeira dose esquecida na manhã seguinte e se você esqueceu ambas as doses, tome a segunda dose esquecida na manhã seguinte à primeira. Se você se lembrar menos de 7 dias antes da próxima dose programada,

não tome a(s) dose(s) esquecida(s). Em vez disso, espere até a manhã da próxima dose programada e, em seguida, tome risedronato como de costume.

Se você perder doses de risedronato e não souber o que fazer, ligue para o seu médico. Sempre tome risedronato logo pela manhã. Nunca tome uma dose dupla para compensar a esquecida e nunca tome mais de uma dose em um dia.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Risedronato pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- náusea
- arrotar
- boca seca
- dor de estômago
- diarréia
- constipação
- gás
- dor de cabeça
- tontura
- fraqueza
- cãibras nas pernas
- dor nas costas
- necessidade frequente ou urgente de urinar
- dor ao urinar

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum dos seguintes efeitos secundários, contacte o seu médico imediatamente antes de tomar mais risedronato:

- dificuldade em engolir ou dor ao engolir
- azia nova ou agravada
- dor no peito
- coceira
- irritação na pele
- urticária
- bolhas na pele
- inchaço da face, garganta, língua, lábios, olhos, mãos, pés, tornozelos ou pernas
- dificuldade para respirar

- rouquidão
- espasmos musculares, espasmos ou cãibras
- dormência ou formigamento ao redor da boca ou nas mãos ou pés
- olhos inchados, vermelhos ou doloridos
- sensibilidade à luz
- gengivas doloridas ou inchadas
- afrouxamento dos dentes
- dormência ou sensação de peso na mandíbula
- má cicatrização da mandíbula
- dor maçante e dolorida nos quadris, virilha ou coxas

Risedronato pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este medicamento.

Tomar um medicamento bisfosfonato, como risedronato para osteoporose, pode aumentar o risco de você quebrar o(s) osso(s) da coxa. Você pode sentir dor nos quadris, virilha ou coxas por várias semanas ou meses antes do(s) osso(s) quebrarem, e você pode achar que um ou ambos os ossos da coxa quebraram mesmo que você não tenha caído ou sofrido outro trauma. É incomum que o osso da coxa se quebre em pessoas saudáveis, mas as pessoas que têm osteoporose podem quebrar esse osso mesmo que não tomem risedronato. Converse com seu médico sobre os riscos de tomar risedronato.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, dê à vítima um copo cheio de leite e ligue para o centro de controle de envenenamento local em 1-800-222-1222. Se a vítima desmaiou ou não está respirando, ligue para os serviços de emergência locais no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

- dormência ou formigamento ao redor da boca ou nas mãos ou pés
- espasmos musculares, cãibras ou espasmos
- convulsões

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório.

Antes de fazer qualquer teste de laboratório ou estudo de imagem óssea, informe ao seu médico e ao pessoal do laboratório que você está tomando risedronato.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Actonel®
- Atelvia

nomes rand de produtos combinados

- Actonel®com cálcio (contendo cálcio, risedronato)

Última revisão - 15/01/2016

Saiba como citar esta página

Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022