



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Ev](#) → [İlaçlar, Otlar ve Takviyeler](#) → ritonavir

Source : U.S. National Library of Medicine

Bu sayfanın URL'si: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696029.html>

ritonavir

(ri toe' na veer) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Ritonavir'i diğer bazı ilaçlarla birlikte almak ciddi veya yaşamı tehdit eden yan etkilere neden olabilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz: dihidroergotamin (DHE 45, Migranal), ergotamin (Ergomar, Cafergot'ta, Migergot'ta), ergonovin ve metilergonovin (Methergine) gibi ergot ilaçları; amiodaron (Cordarone, Nexterone, Pacerone), flekainid, propafenon (Rhythmol) ve kinidin (Nuedexta'da) gibi düzensiz kalp atışı ilaçları; ve midazolam (Versed) ve triazolam (Halcion) gibi sakinleştiriciler veya uyku hapları. Bu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, doktorunuz muhtemelen size ritonavir almamanızı söyleyecektir.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Ritonavir, insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonunu tedavi etmek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Ritonavir, proteaz inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kandaki HIV miktarını azaltarak çalışır. Ritonavir HIV'i tedavi etmese de, edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) ve ciddi enfeksiyonlar veya kanser gibi HIV ile ilgili hastalıklar geliştirme şansınızı azaltabilir. Bu ilaçları daha güvenli seks yapmak ve başka yaşam tarzı değişiklikleri yapmakla birlikte almak, HIV virüsünün diğer insanlara bulaşma riskini azaltabilir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Ritonavir bir kapsül, bir tablet ve ağızdan alınacak bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Genellikle günde iki kez yemeklerle birlikte alınır. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Ritonavir'i aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Doktorunuz muhtemelen size düşük dozda ritonavir ile başlayacak ve dozunuzu 2-3 günde bir defadan fazla olmamak üzere kademeli olarak artıracaktır. Bu yönergeleri dikkatlice izleyin.

Ritonavir tabletlerini bütün olarak yutun. Bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin.

Oral solüsyon alıyorsanız, her doz için gereken doğru sıvı miktarını ölçmek için bir doz ölçüm kaşığı, şırınga veya bardak kullanın. Normal bir ev kaşığı kullanmayın. Çözeltiyi tek başına alabilir ya da 8 ons çikolatalı süt veya Sure veya Advera marka diyet takviyeleri ile karıştırarak tadını iyileştirebilirsiniz. İlacınızı bu sıvılardan biriyle karıştırırsanız, karışımı karıştırdıktan sonra 1 saat geçmeden içmelisiniz.

Doktorunuz size ritonavir kapsüllerini almayı bırakmanızı ve bunun yerine tabletleri almaya başlamanızı söylese, geçişten kısa bir süre sonra mide bulantısı, kusma, mide ağrısı ve ishal gibi daha fazla yan etki yaşayabilirsiniz. Vücudunuz tabletlere uyum sağladıkça bu semptomlar düzelebilir.

Kendinizi iyi hissetseniz bile ritonavir almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan ritonavir almayı bırakmayınız. Dozları atlarsanız, reçete edilen dozdan daha azını alırsanız veya ritonavir almayı bırakırsanız, durumunuzun tedavisi daha zor hale gelebilir.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç başka kullanımlar için reçete edilebilir. Daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Ritonavir almadan önce,

- ritonavir'e, diğer ilaçlara veya ritonavir tabletleri, kapsülleri veya solüsyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.
- ÖNEMLİ UYARI bölümündeki ilaçlardan herhangi birini veya aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz: alfuzosin (Üroksatral), apalutamid (Erleada), sisaprid (Propulsid) (ABD'de bulunmamaktadır), kolşisin (Colcrys, Mitigare). böbrek veya karaciğer hastalığı, dronedaron (Multaq), lomitapid (Juxtapid), lovastatin (Altoprev), lurasidon (Latuda), pimozyd (Orap), ranolazin (Ranexa), sildenafil (sadece akciğer hastalığı için kullanılan Revatio markası), simvastatin (Zocor, Vytorin'de), sarı kantaron veya vorikonazol (Vfend). Bu ilaçlardan bir veya daha fazlasını alıyorsanız, doktorunuz muhtemelen size ritonavir almamanızı söyleyecektir.
- ayrıca aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini de doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: varfarin (Coumadin, Jantoven) ve rivaroksaban (Xarelto) gibi antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'); amitriptilin, bupropion (Aplenzin, Forfivo XL, Wellbutrin, Zyban, diğerleri), desipramin (Norpramin), fluoksetin (Prozac), nefazodon, nortriptilin, paroksetin (Paxil) ve trazodon gibi antidepressanlar; atovakuon (Meproon, Malarone'de); bedakuilin (Sirturo); metoprolol (Lopressor, Toprol XL, Dutoprol'de, Lopressor HCT'de) ve timolol gibi beta blokerler; bosentan (Tracleer); buspiron; diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, diğerleri), nifedipin (Adalat, Afeditab CR, Procardia) ve verapamil (Calan, Covera, Verelan, Tarka'da); atorvastatin (Caduet'te Lipitor) ve rosuvastatin (Crestor) gibi kolesterol düşürücü ilaçlar; klaritromisin (PrevPac'te Biaxin); klorazepat (Gen-Xene, Tranxene); kolşisin (Colcrys, Mitigare); abemaciclib (Verzenio), dasatinib (Sprycel), encorafenib (Braftovi), ibrutinib (Imbruvica), ivosidenib (Tibsovo), neratinib (Nerlynx), nilotinib (Tasigna), venetoklaks (Venclexta ve vincristine), vincristine gibi bazı kanser ilaçları ; deksametazon; diazepam (Diastat, Valium); digoksin (Lanoxin); dronabinol (Marinol); elagolix (Orilissa); estazolam; fentanil (Duragesic, Subsys), fostamatinib (Tavalisse), hepatit C virüsü (HCV) için boceprevir (artık ABD'de mevcut değildir; Victrelis), glecaprevir ve pibrentasvir (Mavyret) ve simeprevir (artık ABD'de bulunmamaktadır) gibi bazı ilaçlar ; Olysio); itrakonazol (Onmel, Sporanox); ketokonazol (Nizoral); lidokain (Lidoderm; Epinefrinli Xylocaine içinde); Atazanavir gibi HIV için diğer ilaçlar (Reyataz,

Unuttuđunuz dozu hatırladıđınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdıđınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Ritonavir yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

- uyuşukluk
- ishal
- gaz
- göğüste ağrılı yanma hissi
- yemeklerin tadına bakma yeteneđinde deđişiklik
- baş ağrısı
- eller, ayaklar veya ağız çevresindeki bölgede uyuşma, yanma veya karıncalanma
- kas veya eklem ağrısı
- mide ağrısı, bulantı ve kusma

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

- cildin kabarması veya soyulması
- döküntü
- kurdeşen
- gözlerin, yüzün, dilin, dudakların veya boğazın şişmesi
- boğazın sıkılması
- nefes alma veya yutma zorluğu
- mide bulantısı
- kusma
- karın ağrısı
- aşırı yorgunluk
- enerji eksikliği
- iştah kaybı
- midenin sağ üst kısmında ağrı
- cilt veya gözlerin sararması
- baş dönmesi
- sersemlik

- bilinç kaybı
- düzensiz kalp atışı

Ciddi bir yan etki yaşıyorsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) veya telefonla (1-800-332-1088).

Ritonavir başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorunuz varsa doktorunuzu arayın.

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kaptan, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Tabletleri ve solüsyonu oda sıcaklığında saklayın. Çözeltiyi soğutmayın ve çok ısınmasına veya çok soğumasına izin vermeyin. Ritonavir kapsüllerini soğutmak en iyisidir, ancak bunları 30 güne kadar oda sıcaklığında da saklayabilirsiniz.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web sitesine bakın (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur:<https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Mağdur bayılmışsa, nöbet geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Bir çocuk, çözeltinin normal dozundan daha fazla içerirse, hemen tıbbi yardım almak özellikle önemlidir. Çözelti, bir çocuğa çok zararlı olabilecek büyük miktarda alkol içerir.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

- ellerde veya ayaklarda uyuşma, yanma veya karıncalanma

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, ritonavir'e yanıtınızı kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

rand isimleri

- Norvir®

diğer isimler

- RTV

Son Revize - 01/15/2021

[Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin](#)



Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi

AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmelidir.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022