



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Domicile](#) → [Médicaments, herbes et suppléments](#) → Ritonavir

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696029.html>

Ritonavir

prononcé comme (ri toe' na veer)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

La prise de ritonavir avec certains autres médicaments peut entraîner des effets secondaires graves, voire mortels. Informez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants : des médicaments contre l'ergot tels que la dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), l'ergotamine (Ergomar, dans Cafergot, dans Migergot), l'ergonovine et la méthylergonovine (Methergine) ; médicaments pour les battements cardiaques irréguliers tels que l'amiodarone (Cordarone, Nexterone, Pacerone), la flécaïnide, la propafénone (Rhythmol) et la quinidine (dans Nuedexta); et des sédatifs ou des somnifères tels que le midazolam (Versed) et le triazolam (Halcion). Votre médecin vous dira probablement de ne pas prendre de ritonavir si vous prenez l'un de ces médicaments.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Le ritonavir est utilisé avec d'autres médicaments pour traiter l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Le ritonavir appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de la protéase. Il agit en diminuant la quantité de VIH dans le sang. Bien que le ritonavir ne guérisse pas le VIH, il peut diminuer votre risque de développer le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) et des maladies liées au VIH telles que des infections graves ou un cancer. La prise de ces médicaments, la pratique de rapports sexuels protégés et d'autres changements de mode de vie peuvent réduire le risque de transmission du virus VIH à d'autres personnes.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Le ritonavir se présente sous la forme d'une gélule, d'un comprimé et d'une solution (liquide) à prendre par voie orale. Il est généralement pris deux fois par jour avec les repas. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez le ritonavir exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Votre médecin vous prescrira probablement une faible dose de ritonavir et augmentera progressivement votre dose, pas plus d'une fois tous les 2 à 3 jours. Suivez attentivement ces instructions.

Avalez les comprimés de ritonavir entiers. Ne les fendez pas, ne les mâchez pas et ne les écrasez pas.

Si vous prenez la solution buvable, utilisez une cuillère doseuse, une seringue ou un gobelet pour mesurer la quantité correcte de liquide nécessaire pour chaque dose. N'utilisez pas de cuillère domestique ordinaire. Vous pouvez prendre la solution seule, ou vous pouvez améliorer le goût en la mélangeant avec 8 onces de lait au chocolat ou des compléments alimentaires de marque Ensure ou Advera. Si vous mélangez le médicament avec l'un de ces liquides, vous devez boire le mélange au plus tard 1 heure après l'avoir mélangé.

Si votre médecin vous dit d'arrêter de prendre les gélules de ritonavir et de commencer à prendre les comprimés à la place, vous pourriez ressentir davantage d'effets secondaires tels que nausées, vomissements, douleurs à l'estomac et diarrhée peu de temps après le changement. Ces symptômes peuvent s'améliorer à mesure que votre corps s'adapte aux comprimés.

Continuez à prendre du ritonavir même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre le ritonavir sans en parler à votre médecin. Si vous manquez des doses, prenez moins que la dose prescrite ou arrêtez de prendre le ritonavir, votre état peut devenir plus difficile à traiter.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages. Demandez à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre du ritonavir,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au ritonavir, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients contenus dans les comprimés, les gélules ou la solution de ritonavir. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.
- informez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments de la section AVERTISSEMENT IMPORTANT ou l'un des médicaments suivants : alfuzosine (Uroxatral), apalutamide (Erleada), cisapride (Propulsid) (non disponible aux États-Unis), colchicine (Colcrys, Mitigare) dans personnes atteintes d'une maladie rénale ou hépatique, dronédarone (Multaq), lométapide (Juxtapid), lovastatine (Altoprev), lurasidone (Latuda), pimozide (Orap), ranolazine (Ranexa), sildénafil (seule marque Revatio utilisée pour les maladies pulmonaires), simvastatine (Zocor, dans Vytorin), le millepertuis ou le voriconazole (Vfend). Votre médecin vous dira probablement de ne pas prendre de ritonavir si vous prenez un ou plusieurs de ces médicaments.
- Informez également votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines et des suppléments nutritionnels que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : les anticoagulants (« anticoagulants ») tels que la warfarine (Coumadin, Jantoven) et le rivaroxaban (Xarelto) ; les antidépresseurs tels que l'amitriptyline, le bupropion (Aplenzin, Forfivo XL, Wellbutrin, Zyban, autres), la désipramine (Norpramin), la fluoxétine (Prozac), la néfazodone, la nortriptyline, la paroxétine (Paxil) et la trazodone ; atovaquone (Mepron, dans Malarone); bédaquiline (Sirturo); les bêta-bloquants tels que le métoprolol (Lopressor, Toprol XL, dans Dutoprol, dans Lopressor HCT) et le timolol ; bosentan (Tracler); buspirone; les inhibiteurs calciques tels que le diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, autres), la nifédipine (Adalat, Afeditab CR, Procardia) et le vérapamil (Calan, Covera, Verelan, à Tarka); médicaments hypocholestérolémiants tels que l'atorvastatine (Lipitor, dans Caduet) et la rosuvastatine (Crestor); clarithromycine (Biaxin, dans PrevPac); le clorzépatate (Gen-Xene, Tranxene); la colchicine (Colcrys, Mitigare) ; certains médicaments contre le cancer tels que l'abémaciclib (Verzenio), le dasatinib (Sprycel), l'encorafenib (Braftovi), l'ibrutinib (Imbruvica), l'ivosidenib (Tibsovo), le nératinib (Nerlynx), le nilotinib (Tasigna), le vénétoclax (Venclexta), la vinblastine et la vincristine ; dexaméthasone; diazépam (Diastat, Valium); digoxine (Lanoxine); le dronabinol (Marinol); élagolix (Orilissa); estazolam; fentanyl (Duragesic, Subsys), fostamatinib (Tavalisse), certains médicaments contre le virus de l'hépatite C (VHC) tels que le bocéprévir (n'est plus disponible aux États-Unis ; Victrelis), le glécaprévir et le pibrentasvir (Mavyret) et le siméprévir (n'est plus disponible aux États-Unis ; Olysio); itraconazole (Onmel, Sporanox); kétoconazole (Nizoral); lidocaïne (Lidoderm; dans Xylocaïne avec épinéphrine); d'autres médicaments contre le VIH comme l'atazanavir (Reyataz, en

Evotaz), darunavir (Prezista, dans Prezcoibx), delavirdine (Rescriptor), fosamprénavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), maraviroc (Selzentry), saquinavir (Invirase) et tipranavir (Aptivus); les médicaments contre la dysfonction érectile tels que l'avanafil (Stendra), le sildénafil (Viagra), le tadalafil (Adcirca, Cialis) et le vardénafil (Levitra); les médicaments qui suppriment le système immunitaire tels que la cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), le sirolimus (Rapamune) et le tacrolimus (Astagraf XL, Prograf); certains médicaments contre les convulsions tels que la carbamazépine (Epitol, Equetro, Tegretol, autres), le clonazépam (Klonopin), le divalproex (Depakote), l'éthosuximide (Zarontin), la lamotrigine (Lamictal) et la phénytoïne (Dilantin, Phenytek); mépéridine (Demerol); la méthadone (Dolophine, Methadose); méthamphétamine (Desoxyn); mexilétiline; pérphénazine; quétiapine (Seroquel); quinine (Quaaluan); rifabutine (Mycobutin); rifampicine (Rifadin, Rimactane, dans Rifamate, dans Rifater); rispéridone; salmétérol (Serevent, dans Advair); les stéroïdes oraux ou inhalés tels que la bétaméthasone, le budésonide (Pulmicort), le ciclésonide (Alvesco, Omnaris), la dexaméthasone, la fluticasone (Flonase, Flovent, dans Advair), la méthylprednisolone (Medrol), mométasone (dans Dulera), la prednisone et la triamcinolone; théophylline (Theo 24, Uniphyll, autres); thioridazine; et zolpidem (Ambien, Edluar, Intermezzo, autres). De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec le ritonavir, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. rispéridone; salmétérol (Serevent, dans Advair); les stéroïdes oraux ou inhalés tels que la bétaméthasone, le budésonide (Pulmicort), le ciclésonide (Alvesco, Omnaris), la dexaméthasone, la fluticasone (Flonase, Flovent, dans Advair), la méthylprednisolone (Medrol), mométasone (dans Dulera), la prednisone et la triamcinolone; théophylline (Theo 24, Uniphyll, autres); thioridazine; et zolpidem (Ambien, Edluar, Intermezzo, autres). De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec le ritonavir, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. rispéridone; salmétérol (Serevent, dans Advair); les stéroïdes oraux ou inhalés tels que la bétaméthasone, le budésonide (Pulmicort), le ciclésonide (Alvesco, Omnaris), la dexaméthasone, la fluticasone (Flonase, Flovent, dans Advair), la méthylprednisolone (Medrol), mométasone (dans Dulera), la prednisone et la triamcinolone; théophylline (Theo 24, Uniphyll, autres); thioridazine; et zolpidem (Ambien, Edluar, Intermezzo, autres). De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec le ritonavir, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. fluticasone (Flonase, Flovent, in Advair), méthylprednisolone (Medrol), mométasone (dans Dulera), la prednisone et la triamcinolone; théophylline (Theo 24, Uniphyll, autres); thioridazine; et zolpidem (Ambien, Edluar, Intermezzo, autres). De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec le ritonavir, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. fluticasone (Flonase, Flovent, in Advair), méthylprednisolone (Medrol), mométasone (dans Dulera), la prednisone et la triamcinolone;

- si vous prenez de la suspension buvable de ritonavir, informez également votre médecin si vous prenez du disulfiram (Antabuse) ou du métronidazole (Flagyl, Nuversa, Vandazole).
- informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu un intervalle QT prolongé (un problème cardiaque rare qui peut provoquer des battements cardiaques irréguliers, des évanouissements ou une mort subite), le diabète, l'hémophilie, un taux élevé de cholestérol ou de triglycérides (graisses) dans le sang, ou maladie du foie, y compris l'hépatite B ou C.
- informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez du ritonavir, appelez immédiatement votre médecin. Vous ne devez pas allaiter si vous êtes infectée par le VIH ou si vous prenez du ritonavir.
- vous devez savoir que le ritonavir peut diminuer l'efficacité des contraceptifs hormonaux (pilules contraceptives, patchs, anneaux ou injections). Discutez avec votre médecin de l'utilisation d'une autre forme de contraception.
- vous devez savoir que votre graisse corporelle peut augmenter ou se déplacer vers différentes zones de votre corps, telles que le haut du dos, le cou ("bosse de bison"), les seins et autour de votre ventre. Vous remarquerez peut-être une perte de graisse corporelle au niveau du visage, des jambes et des bras.
- vous devez savoir que vous pourriez souffrir d'hyperglycémie (augmentation de votre taux de sucre dans le sang) pendant que vous prenez ce médicament, même si vous n'êtes pas déjà atteint de diabète. Informez immédiatement votre médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants pendant que vous prenez du ritonavir : soit extrême, miction fréquente, faim extrême, vision floue ou faiblesse. Il est très important d'appeler votre médecin dès que vous présentez l'un de ces symptômes, car une glycémie élevée non traitée peut provoquer une maladie grave appelée acidocétose. L'acidocétose peut devenir mortelle si elle n'est pas traitée à un stade précoce. Les symptômes de l'acidocétose comprennent la bouche sèche, des nausées et des vomissements, un essoufflement, une haleine fruitée et une diminution de la conscience.
- vous devez savoir que pendant que vous prenez des médicaments pour traiter l'infection par le VIH, votre système immunitaire peut se renforcer et commencer à combattre d'autres infections déjà présentes dans votre corps. Cela peut vous amener à développer des symptômes de ces infections. Si vous présentez des symptômes nouveaux ou qui s'aggravent après le début du traitement par le ritonavir, assurez-vous d'en informer votre médecin.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la dose suivante, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Le ritonavir peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

- somnolence
- diarrhée
- gaz
- brûlures d'estomac
- changement dans la capacité de goûter les aliments
- mal de crâne
- engourdissement, brûlure ou picotement des mains, des pieds ou de la zone autour de la bouche
- douleurs musculaires ou articulaires
- douleurs à l'estomac, nausées et vomissements

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence :

- cloques ou desquamation de la peau
- éruption
- urticaire
- gonflement des yeux, du visage, de la langue, des lèvres ou de la gorge
- resserrement de la gorge
- difficulté à respirer ou à avaler
- nausée
- vomissement
- Douleur d'estomac
- fatigue excessive
- manque d'énergie
- perte d'appétit
- douleur dans la partie supérieure droite de l'estomac
- jaunissement de la peau ou des yeux
- vertiges
- étourdissement

- perte de conscience
- rythme cardiaque irrégulier

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Le ritonavir peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez ce médicament.

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez les comprimés et la solution à température ambiante. Ne réfrigérez pas la solution et ne la laissez pas devenir trop chaude ou trop froide. Il est préférable de réfrigérer les gélules de ritonavir, mais vous pouvez également les conserver à température ambiante jusqu'à 30 jours.

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit qui est haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

En cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne sur <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Il est particulièrement important de consulter immédiatement un médecin si un enfant boit plus que la dose habituelle de la solution. La solution contient une grande quantité d'alcool qui pourrait être très nocif pour un enfant.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

- engourdissement, brûlure ou picotement des mains ou des pieds

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira certains tests de laboratoire pour vérifier votre réponse au ritonavir.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

- Norvir®

autres noms

- RTV

Dernière révision - 15/01/2021

[Apprenez à citer cette page](#)



[Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.](#)

AHFS® Renseignements pour les patients sur les médicaments MC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisée par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022