



Express Medicine Shipments, Globally!  
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家 → 薬、ハーブ、サプリメント → リバロキサバン](#)

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611049.html>

## リバロキサバン

(riv' a rox'a ban) と発音されます

### 重要な警告：

心房細動（心臓が不規則に鼓動し、体内で血栓が形成される可能性が高くなり、脳卒中を引き起こす可能性が高い状態）があり、脳卒中や深刻な血栓を防ぐためにリバロキサバンを服用している場合は、この薬の服用をやめた後、脳卒中を起こします。医師に相談せずにリバロキサバンの服用を中止しないでください。気分が良くても、リバロキサバンを服用し続けてください。リバロキサバンの服用を逃さないように、薬がなくなる前に必ず処方箋を補充してください。リバロキサバンの服用を中止する必要がある場合は、血栓が形成されて脳卒中を引き起こすのを防ぐために、医師が別の抗凝固剤（「抗凝血剤」）を処方することがあります。

リバロキサバンなどの「抗凝血剤」を服用しているときに硬膜外麻酔または脊髄くも膜下麻酔または脊椎穿刺を行った場合、脊椎内またはその周囲に血栓が形成され、麻痺する可能性があります。硬膜外カテーテルが体内に残っているか、硬膜外または脊椎の穿刺、脊椎の変形、または脊椎の手術を繰り返した、または行ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。アナグレリド（アグリリン）を服用している場合は、医師と薬剤師に伝えてください。アスピリンおよびその他の非ステロイド性抗炎症薬（NSAID）、たとえばイブプロフェン（Advil、Motrinなど）、インドメタシン（Indocin）、ケトプロフェン、ナプロキセン（Aleve、Anaproxなど）。シロスタゾール；クロピドグレル（プラビックス）；ジピリダモール（ベルサンチン）；エプチフィパチド；ヘパリン；プラスグレル（効率的）；シタロプラム（セレкса）などの選択的セロトニン再取り込み阻害薬、エスシタロプラム（Lexapro）、フルオキセチン（Prozac、Symbyax）、フルボキサミン（Luvox）、パロキセチン（Brisdelle、Paxil、Pexeva）、およびセルトラリン（Zoloft）；デスベンラファキシン（Pristiq）、デュロキセチン（Cymbalta、Drizalma）、レボミルナシبران（Fetzima）、ミルナシبران（Savella）、ベンラファキシン（Effexor）などのセロトニン-ノルエピネフリン再取り込み阻害薬（SNRI）。チカグレロル（プリリント）；チクロピジン；チロフィバン（Aggrastat）、およびワルファリン（Coumadin、Jantoven）。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください：腰痛、筋力低下（特に脚と足）、しびれまたはうずき（特に脚）、腸または膀胱の制御の喪失、または足を動かします。デスベンラファキシン（Pristiq）、デュロキセチン（Cymbalta、Drizalma）、レボミルナシبران（Fetzima）、ミルナシبران（Savella）、ベンラファキシン（Effexor）などのセロトニン-ノルエピネフリン再取り込み阻害薬（SNRI）。チカグレロル（プリリント）；チクロピジン；チロフィバン（Aggrastat）、およびワルファリン（Coumadin、Jantoven）。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください：腰痛、筋力低下（特に脚と足）、しびれまたはうずき（特に脚）、腸または膀胱の制御の喪失、または足を動かします。デスベンラファキシン（Pristiq）、デュロキセチン（Cymbalta、Drizalma）、レボミルナシبران（Fetzima）、ミルナシبران（Savella）、ベンラファキシン（Effexor）などのセロトニン-ノルエピネフリン再取り込み阻害薬（SNRI）。チカグレロル（プリリント）；チクロピジン；チロフィバン（Aggrastat）、およびワルファリン（Coumadin、Jantoven）。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください：腰痛、筋力低下（特に脚と足）、しびれまたはうずき（特に脚）、腸または膀胱の制御の喪失、または足を動かします。

リバロキサバンを服用するリスクについて医師に相談してください。

リバロキサバンによる治療を開始するとき、および処方箋を補充するたびに、医師または薬剤師から製造元の患者情報シート（投薬ガイド）が提供されます。情報を注意深く読み、質問がある場合は医師または薬剤師に尋ねてください。あなたもすることができます

食品医薬品局（FDA）のWebサイトにアクセスしてください

（<http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM280333.pdf> [<http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM280333.pdf>]）または製造元のWebサイトで、投薬ガイドを入手してください。

## なぜこの薬が処方されているのですか？

リバロキサバンは、成人の深部静脈血栓症（DVT;通常は脚の血栓）および肺塞栓症（PE;肺の血栓）の治療に使用されます。リバロキサバンは、成人の初期治療が完了した後にDVTとPEが再発するのを防ぐためにも使用されます。また、心臓弁が原因ではない心房細動（心臓が不規則に鼓動し、体内で血餅が形成される可能性が高くなり、脳卒中を引き起こす可能性がある状態）のある成人の脳卒中や重篤な血餅の予防にも使用されます。疾患。リバロキサバンは、股関節置換術または膝関節置換術を受けている成人、または重篤な病気で入院し、動き回る能力の低下またはその他のリスク要因により血餅を発症するリスクがある人々のDVTおよびPEを予防するためにも使用されます。また、アスピリンと一緒に使用して、冠状動脈疾患（心臓に血液を供給する血管の狭窄）または末梢動脈疾患（血管内の循環不良）の成人の心臓発作、脳卒中、または死亡のリスクを低下させます腕と脚に血液を供給します）。リバロキサバンは、最初の抗凝固（抗凝血）治療を5日以上受けた子供や特定の乳児でDVTとPEが再発するのを治療および予防するためにも使用されます。また、先天性心疾患（出生前に発症する心臓の異常）を患っている2歳以上の子供たちの心臓手術後のDVTおよびPEを予防するためにも使用されます。リバロキサバンは、第Xa因子阻害剤と呼ばれる薬のクラスに含まれています。それは、血餅の形成を助ける特定の天然物質の作用をブロックすることによって機能します。

## わあ、この薬を使うべきですか？

リバロキサバンは、錠剤と懸濁液（液体）として経口摂取できます。リバロキサバンを成人のDVTまたはPEの治療に使用する場合、通常、1日2回21日間食事と一緒に服用し、その後1日1回食事と一緒に服用します。成人のDVTまたはPEを予防するためにリバロキサバンを使用する場合、通常、少なくとも6か月の抗凝固（抗凝血）治療の後、食事の有無にかかわらず1日1回服用します。心房細動のある人の脳卒中を予防するためにリバロキサバンを使用する場合、通常、夕食と一緒に1日1回服用します。股関節または膝関節置換手術後にDVTおよびPEを予防するためにリバロキサバンを服用する場合、通常、食事の有無にかかわらず1日1回服用します。最初の投与は、手術後少なくとも6～10時間で行う必要があります。リバロキサバンは通常、股関節置換手術後35日間、膝関節置換手術後12日間服用します。重篤な病気で入院し、動き回る能力が低下して血栓を発症するリスクのある成人のDVTおよびPEを予防するためにリバロキサバンを服用する場合、通常、入院中から1日1回、食事の有無にかかわらず服用します。その後、合計31～39日間継続します。冠状動脈疾患または末梢動脈疾患の成人にリバロキサバンをアスピリンと一緒に服用する場合、通常、食事の有無にかかわらず1日2回服用します。リバロキサバンを子供や乳児に使用してDVTまたはPEを治療または予防する場合、通常、少なくとも5日間の抗凝固（抗凝血）治療の後、1日1～3回食事を与えます。先天性心疾患のある2歳以上の子供にリバロキサバンを服用すると、

毎日ほぼ同じ時間にリバロキサバンを服用してください。処方箋の指示に注意深く従って、あなたが理解していない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指示どおりにリバロキサバンを服用してください。多かれ少なかれ服用したり、医師の処方よりも頻繁に服用したりしないでください。

大人の場合、錠剤を飲み込めない場合は、錠剤を粉砕してアップルソースと混ぜることができます。あなたがそれを準備した直後に混合物を飲み込んでください。リバロキサバンは、特定の種類の栄養チューブにも投与できません。この薬を栄養チューブに入れるべきかどうか医師に相談してください。医師の指示に注意深く従ってください。

リバロキサバン錠を服用している子供は、錠剤全体を飲み込んでください。それらを分割しないでください。

リバロキサバン経口懸濁液を服用してから30分以内にあなたまたはあなたの子供が嘔吐または吐き出した場合は、嘔吐エピソードの直後にもう一度全量を服用し、定期的にスケジュールされた時間に次の服用をしてください。

### リバロキサバン経口懸濁液を測定するには、次の手順に従います。

- 1.液体を測定するための薬に付属の経口注射器を使用してください。家庭用スプーンを使用して線量を測定しないでください。家庭用ティースプーンは正確な測定装置ではありません。家庭用ティースプーンで用量を測定すると、服用する薬が多すぎたり、薬が不足したりする可能性があります。
- 2.使用前にボトルを10秒間穏やかに振ってください。ボトルの底に顆粒が残っている場合は、さらに10秒間穏やかに振ってください。発泡を防ぐためにボトルを振らないでください。
- 3.キャップを押し下げてボトルキャップを取り外し、反時計回り（左）に回します。ボトルの上部からアダプターを取り外さないでください。
- 4.プランジャーを押し下げて、経口注射器からボトルにすべての空気を押し込みます。次に、経口注射器の開いた先端をアダプターに挿入します。
- 5.経口注射器を所定の位置に保持しながら、ボトルを慎重に上下逆にします。プランジャーを引き戻して、薬の一部をボトルから経口注射器に引き出します。プランジャーを完全に引き出さないように注意してください。
- 6.経口注射器のプランジャーの端の近くに少量の空気が見えます。プランジャーを押すと、薬がボトルに戻り、空気が消えます。プランジャーを引き戻して、正しい投薬量を経口注射器に引き込みます。
- 7.経口注射器をボトルに保持したまま、注射器が上になるようにボトルを慎重に上に向けます。プランジャーを押さずに、ボトルネックアダプターから経口シリンジを取り外します。あなたがそれを経口注射器に引き込んだ直後に薬を服用してください。
- 8.経口注射器の開いた先端を子供の口の片側に置き、液体が子供の口に入るときにプランジャーをゆっくりと押します。お子さんに薬を口に入れるときにゆっくりと飲み込ませてください。
- 9.投与量が5mLを超える場合は、同じシリンジを2回以上使用する必要があり、手順3～7を繰り返す必要があります。
- 10.アダプターをボトルに残します。キャップをボトルに戻し、時計回り（右）に回して締めます。
- 11.経口注射器をきれいな水道水ですすぎ、使用するたびに風乾させます。

気分が良くても、リバロキサバンを服用し続けてください。医師に相談せずにリバロキサバンの服用を中止しないでください。リバロキサバンの服用をやめると、血栓のリスクが高まる可能性があります。

## この薬の用途

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

## 特別な注意事項に従う必要がありますか？

リバロキサバンを服用する前に、

- リバロキサバン、その他の薬、またはリバロキサバン錠の成分にアレルギーがある場合は、医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。
- あなたが服用している、または服用する予定の他の処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品を医師と薬剤師に伝えてください。重要な警告のセクションに記載されている薬剤と、カルバマゼピン（カルバマゼピン、エピトール、エクエトロ、テグレトール、テグレトール-XR、テリル）、エリスロマイシン（EES、エリク、エリペド、エリスロシンなど）、ケトコナゾール、フェニトイン（ジランチン、フェニテック）、リファンピン（リファディン、リマクタン）、およびリトナビル（ノルビル、カレトラ、ピエキラパック）。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。他の多くの薬もリバロキサバンと相互作用する可能性があるため、このリストに記載されていない薬も含め、服用しているすべての薬について医師に必ず伝えてください。
- あなたが服用しているハーブ製品、特にセントジョーンズワートを医師に伝えてください。
- 人工心臓弁を使用している場合、または最近異常なあざや出血に気づいた場合は、医師に相談してください。あなたの医者はおそらくリバロキサバンを服用しないようにあなたに言うでしょう。
- 出血の問題、抗リン脂質抗体症候群（APS、血液凝固を引き起こす状態）、胃や腸の出血や潰瘍、腎臓や肝臓の病気があるかどうかを医師に伝えてください。
- あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。リバロキサバンの服用中に妊娠した場合は、医師にご相談ください。
- 75歳以上の場合、リバロキサバンを服用することのリスクと利点について医師に相談してください。
- 歯科手術を含む手術を受けている場合は、リバロキサバンを服用していることを医師または歯科医に伝えてください。医師は、手術または手技の前にリバロキサバンの服用を中止するように指示する場合があります。手術後、いつリバロキサバンの服用を再開すべきかを医師が教えてくれます。

## 特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

## 服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

大人：

- リバロキサバンを1日1回服用する場合は、忘れた分は1日1回覚えてきたらすぐに服用してください。翌日、通常の投薬スケジュールを再開します。
- DVTまたはPEの治療のためにリバロキサバンを1日2回服用する場合は、その日に覚えてきたらすぐに服用し忘れた分を服用してください。飲み忘れた分を補うために、同時に2回分を飲んでもかまいません。翌日に通常の投薬スケジュールを再開します。

- CADまたはPADをお持ちで、リバロキサバンを1日2回服用して、DVTおよびPEのリスクを軽減し、服用し忘れた場合は、通常の服用スケジュールを続けてください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

## 乳幼児：

- リバロキサバンを1日1回服用する場合は、忘れた分は1日1回覚えたらすぐに服用してください。翌日、通常の投薬スケジュールを再開します。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。
- リバロキサバンを1日2回服用する場合は、忘れた朝の服用を覚えたらすぐに服用してください。朝の服用し忘れた分を補うために、夕方に2回分を同時に服用することができます。翌日に通常の投薬スケジュールを再開します
- リバロキサバンを1日3回服用し、服用し忘れた場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

## この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

リバロキサバンは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 筋けいれん
- 腕や脚の痛み（子供）
- 嘔吐（子供）
- 胃痛
- 咳（子供）
- 発疹（子供）

いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状または重要な警告のセクションに記載されている症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。

- 血まみれの、黒い、またはタール状のスツール
- ピンク、または茶色の尿
- コーヒーかすのように見える血や物質を咳や吐き出す
- 頻繁な鼻血
- 歯茎からの出血
- 重い月経出血
- 弱点
- 疲れ
- 頭痛
- めまいや失神
- ぼやけた視界
- 腕や脚の痛み

- 発疹
- かゆみ
- 呼吸困難または嚥下困難
- じんましん
- 傷口の痛みや腫れ

リバロキサバンは血液が正常に凝固するのを防ぎます。そのため、切断または負傷した場合、出血が止まるまで通常よりも時間がかかる場合があります。この薬はまた、あざや出血を起こしやすくする可能性があります。出血やあざが異常な場合は、すぐに医師に連絡してください。

リバロキサバンは他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の服用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。

（<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]）または電話（1-800-332-1088）。

## この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は入った容器に入れ、しっかりと閉じて、子供の手の届かないところに保管してください。室温で、過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸入器など）は子供に耐性がなく、幼児は簡単に開けることができるため、すべての薬を子供の手の届かないところに置いておくことが重要です。幼児を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください（<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

## n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

**過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。**

- 異常な出血またはあざ
- 血まみれの、黒い、またはタール状のスツール

- 血尿
- コーヒーかすのように見える血や物質を咳や吐き出す

## 他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者と研究室とのすべての約束を守ってください。医師は、リバロキサバンに対する身体の反応を確認するために、特定の臨床検査を命じることがあります。

他の人にあなたの薬を服用させないでください。あなたの処方箋はおそらく詰め替え可能ではありません。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

## ランド名

- Xarelto®

最終改訂日-2022年3月15日

[このページを引用する方法を学ぶ](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. 免責事項](#)

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製  
商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日