

عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611049.html>

## ريفاروكسابان تنطق باسم (riv " a rox 'a ban)

### تحذير هام:

إذا كنت تعاني من الرجفان الأذيني (حالة ينبض فيها القلب بشكل غير منتظم ، مما يزيد من فرصة تكوين الجلطات في الجسم ، وربما يسبب السكتات الدماغية) وكنت تتناول عقار ريفاروكسابان للمساعدة في منع السكتات الدماغية أو جلطات الدم الخطيرة ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بعد التوقف عن تناول هذا الدواء. لا تتوقف عن تناول عقار ريفاروكسابان دون التحدث مع طبيبك. استمر في تناول عقار ريفاروكسابان حتى لو كنت تشعر جيداً. تأكد من إعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك قبل نفاذ الدواء حتى لا تفوتك أي جرعات من عقار ريفاروكسابان. إذا كنت بحاجة إلى التوقف عن تناول عقار ريفاروكسابان ، فقد يصف لك طبيبك مضاداً آخر للتخثر ("مميع الدم") للمساعدة في منع تشكل جلطة دموية والتسبب في إصابتك بسكتة دماغية.

إذا كان لديك تخدير فوق الجافية أو تخدير في العمود الفقري أو ثقب في العمود الفقري أثناء تناول "مخفف الدم" مثل ريفاروكسابان ، فأنت معرض لخطر تكوين جلطة دموية في العمود الفقري أو حوله مما قد يؤدي إلى إصابتك بالشلل. أخبر طبيبك إذا كان لديك قسطرة فوق الجافية تركت في جسمك أو سبق أن تعرضت أو سبق لك أن تعرضت لثقب فوق الجافية أو العمود الفقري متكرراً أو تشوهاً في العمود الفقري أو جراحة في العمود الفقري. أخبر طبيبك والصيدلي إذا كنت تتناول أناجريليد (أجريلين) ؛ الأسبرين وغيره من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية) مثل إيبوبروفين (أدفيل ، وموترين ، وغيرهما) ، وإندوميثاسين (إندوسين) ، وكيوتوروفين ، ونابروكسين (أليف ، وأنابروكس ، وغيرهما) ؛ سيلوستازول ، كلوبيدوجريل (بلافيكس) ؛ ديبيريديمول (بيرسيتين) ؛ eptifibatide. الهيبارين. براسوغريل (فعال) ؛ مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية مثل سيتالوبرام (سيليكسا) ، إيسيتالوبرام (ليكسابرو) ، فلوكستين (بروزاك ، في سيميلاكس) ، فلوفوكسامين (لوفوكس) ، باروكستين (بريسديل ، باكسيل ، بيكسيفا) ، وسيرترالين (زولوفت) ؛ مثبطات امتصاص السيروتونين-النوربينفرين (SNRI) مثل ديسفينلافاكسين (بريستيك) ، دولوكستين (سيمبالتا ، دريزالما) ، ليفوميلاناسيبران (فيتزما) ، ميلناسيبران (سافيل) ، وفينلافاكسين (إيفكسور) ؛ تيكاجريلور (بريلينتا) ؛ تيكلويدين. تيروفيبان (أغراستات) ، وارفارين (كومادين ، جانتوفين). إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية ، فاتصل بطبيبك على الفور: ألم الظهر ، ضعف العضلات (خاصة في ساقيك وقدميك) ، تميل أو وخز (خاصة في ساقيك) ، فقدان السيطرة على الأمعاء أو المثانة ، أو عدم القدرة على ذلك. حرك ساقيك. مثبطات امتصاص السيروتونين-النوربينفرين (SNRI) مثل ديسفينلافاكسين (بريستيك) ، دولوكستين (سيمبالتا ، دريزالما) ، ليفوميلاناسيبران (فيتزما) ، ميلناسيبران (سافيل) ، وفينلافاكسين (إيفكسور) ؛ تيكاجريلور (بريلينتا) ؛ تيكلويدين. تيروفيبان (أغراستات) ، وارفارين (كومادين ، جانتوفين). إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية ، فاتصل بطبيبك على الفور: ألم الظهر ، ضعف العضلات (خاصة في ساقيك وقدميك) ، تميل أو وخز (خاصة في ساقيك) ، فقدان السيطرة على الأمعاء أو المثانة ، أو عدم القدرة على ذلك. حرك ساقيك. مثبطات امتصاص السيروتونين-النوربينفرين (SNRI) مثل ديسفينلافاكسين (بريستيك) ، دولوكستين (سيمبالتا ، دريزالما) ، ليفوميلاناسيبران (فيتزما) ، ميلناسيبران (سافيل) ، وفينلافاكسين (إيفكسور) ؛ تيكاجريلور (بريلينتا) ؛ تيكلويدين. تيروفيبان (أغراستات) ، وارفارين (كومادين ، جانتوفين). إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية ، فاتصل بطبيبك على الفور: ألم الظهر ، ضعف العضلات (خاصة في ساقيك وقدميك) ، تميل أو وخز (خاصة في ساقيك) ، فقدان السيطرة على الأمعاء أو المثانة ، أو عدم القدرة على ذلك. حرك ساقيك.

تحدث إلى طبيبك حول مخاطر تناول عقار ريفاروكسابان.

سيعطيك طبيبك أو الصيدلي ورقة معلومات المريض الخاصة بالشركة المصنعة (دليل الدواء) عندما تبدأ العلاج باستخدام عقار ريفاروكسابان وفي كل مرة تقوم فيها بإعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك. اقرأ المعلومات بعناية واسأل طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك أي أسئلة. يمكنك أيضا

قم بزيارة موقع إدارة الغذاء والدواء (FDA)

[http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM280333.pdf] /DrugSafety/UCM280333.pdf

أو موقع الشركة المصنعة للحصول على دليل الدواء. (http://www.fda.gov/downloads/Drugs

## لماذا يوصف هذا الدواء؟

يستخدم Rivaroxaban لعلاج تجلط الأوردة العميقة (DVT ؛ جلطة دموية ، عادة في الساق) والانسداد الرئوي (PE ؛ جلطة دموية في الرئة) عند البالغين. يستخدم Rivaroxaban أيضاً لمنع حدوث DVT و PE مرة أخرى بعد اكتمال العلاج الأولي عند البالغين. كما أنه يستخدم للمساعدة في منع السكتات الدماغية أو الجلطات الدموية الخطيرة لدى البالغين المصابين بالرجفان الأذيني (حالة ينبض فيها القلب بشكل غير منتظم ، مما يزيد من فرصة تكوين الجلطات في الجسم ، وربما يسبب السكتات الدماغية) التي لا تسببها صمامات القلب مرض. يستخدم Rivaroxaban أيضاً للوقاية من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة و PE عند البالغين الذين يخضعون لجراحة استبدال مفصل الورك أو جراحة استبدال الركبة أو في الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بسبب أمراض خطيرة والمعرضين لخطر الإصابة بجلطة بسبب انخفاض القدرة على الحركة أو عوامل الخطر الأخرى. كما أنه يستخدم مع الأسبرين لتقليل مخاطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة عند البالغين المصابين بمرض الشريان التاجي (تضييق الأوعية الدموية التي تمد القلب بالدم) أو أمراض الشرايين الطرفية (ضعف الدورة الدموية في الأوعية الدموية) التي تمد الذراعين والساقين بالدم). يستخدم Rivaroxaban أيضاً لعلاج ومنع حدوث DVT و PE مرة أخرى عند الأطفال وبعض الرضع الذين تلقوا 5 أيام على الأقل من العلاج الأولي لمنع تخثر الدم (مميع الدم). كما أنه يستخدم للوقاية من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة و PE بعد جراحة القلب لدى الأطفال بعمر سنتين أو أكثر الذين يعانون من أمراض القلب الخلقية (خلل في القلب يتطور قبل الولادة). ينتمي Rivaroxaban إلى فئة من الأدوية تسمى مثبطات العامل Xa. وهو يعمل عن طريق منع عمل مادة طبيعية معينة تساعد على تكوين جلطات الدم.

## كيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي Rivaroxaban على شكل أقراص ومعلق (سائل) ليأخذ عن طريق الفم. عند استخدام عقار ريفاروكسابان لعلاج تجلط الأوردة العميقة أو الانصمام الرئوي عند البالغين ، فإنه عادة ما يتم تناوله مع الطعام مرتين يومياً لمدة 21 يوماً ، ثم مرة واحدة يومياً مع الطعام. عند استخدام عقار ريفاروكسابان للوقاية من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة أو الانصمام الرئوي عند البالغين ، فإنه عادة ما يتم تناوله مرة واحدة يومياً مع أو بدون طعام بعد 6 أشهر على الأقل من علاج منع تخثر الدم (مميع الدم). عند استخدام عقار ريفاروكسابان للوقاية من السكتة الدماغية لدى أولئك الذين يعانون من الرجفان الأذيني ، فإنه عادة ما يتم تناوله مرة واحدة يومياً مع وجبة المساء. عندما يتم تناول عقار ريفاروكسابان للوقاية من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة و PE بعد جراحة استبدال الورك أو الركبة ، فعادة ما يتم تناوله مع الطعام أو بدونه مرة واحدة يومياً. يجب أن تؤخذ الجرعة الأولى من 6 إلى 10 ساعات على الأقل بعد الجراحة. عادة ما يتم تناول Rivaroxaban لمدة 35 يوماً بعد جراحة استبدال مفصل الورك ولمدة 12 يوماً بعد جراحة استبدال الركبة. عندما يتم تناول عقار ريفاروكسابان للوقاية من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة و PE عند البالغين الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب أمراض خطيرة والمعرضين لخطر الإصابة بجلطة بسبب انخفاض القدرة على الحركة ، فعادة ما يتم تناوله مع الطعام أو بدونه مرة واحدة يومياً عندما تكون في المستشفى ثم تستمر لمدة 31 إلى 39 يوماً. عندما يتم تناول عقار ريفاروكسابان مع الأسبرين عند البالغين المصابين بمرض الشريان التاجي أو مرض الشرايين المحيطية ، فإنه يتم تناوله عادة مرتين يومياً مع الطعام أو بدونه. عند استخدام عقار ريفاروكسابان عند الأطفال والرضع لعلاج أو الوقاية من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة أو الانصمام الرئوي ، يتم إعطاؤه عادة من 1 إلى 3 مرات يومياً مع الطعام بعد 5 أيام على الأقل من العلاج المضاد للتخثر (مميع الدم). عندما يتم تناول عقار ريفاروكسابان في الأطفال الذين تبلغ أعمارهم سنتين أو أكثر والذين يعانون من أمراض القلب الخلقية ،

خذ ريفاروكسابان في نفس الوقت تقريباً كل يوم. اتبع الإرشادات الموجودة على ملصق الوصفة الخاص بك بعناية ، واطلب من طبيبك أو الصيدلي شرح أي جزء لا تفهمه. خذ ريفاروكسابان بالضبط حسب التوجيهات. لا تأخذ أكثر أو أقل منه أو تتناوله أكثر مما وصفه طبيبك.

بالنسبة للبالغين ، إذا كنت غير قادر على ابتلاع الأقراص ، يمكنك سحقها وخلطها مع عصير التفاح. ابتلع المزيج مباشرة بعد تحضيره. يمكن أيضاً إعطاء Rivaroxaban في أنواع معينة من أنابيب التغذية. اسأل طبيبك عما إذا كان يجب عليك تناول هذا الدواء في أنبوب التغذية الخاص بك. اتبع تعليمات طبيبك بعناية.

للأطفال الذين يتناولون أقراص ريفاروكسابان ، ابتلعوا الأقراص كاملة ؛ لا تقسمهم.

إذا كنت أنت أو طفلك يتقيأ أو يبصق في غضون 30 دقيقة من تناول جرعة من عقار ريفاروكسابان المعلق عن طريق الفم ، فتناول جرعة كاملة أخرى في أقرب وقت ممكن بعد نوبة القيء ثم تناول الجرعة التالية في الوقت المحدد بانتظام.

### لقياس تعليق rivaroxaban عن طريق الفم ، اتبع الخطوات التالية:

1. استخدم المحقنة الفموية التي تأتي مع الدواء لقياس السائل. لا تستخدم ملعقة منزلية لقياس جرعتك. ملاعق الشاي المنزلية ليست أجهزة قياس دقيقة ، وقد تتلقى الكثير من الأدوية أو لا يكفي الدواء إذا قمت بقياس جرعتك بملعقة صغيرة منزلية.
2. رج العبوة برفق لمدة 10 ثوانٍ قبل الاستخدام. إذا كانت هناك حبيبات متبقية في قاع الزجاج ، فاهتز برفق مرة أخرى لمدة 10 ثوانٍ أخرى. لا تهز الزجاج لتجنب الرغوة.
3. قم بإزالة غطاء الزجاج عن طريق الضغط على الغطاء ، ثم لفه عكس اتجاه عقارب الساعة (إلى اليسار). لا تقم بإزالة المحول من أعلى الزجاج.
4. ادفع كل الهواء من المحقنة الفموية إلى الزجاج عن طريق الضغط على المكبس. ثم أدخل الطرف المفتوح للمحقنة الفموية في المحول.
5. أثناء تثبيت المحقنة الفموية في مكانها ، اقلب الزجاج بعناية رأساً على عقب. اسحب بعض الدواء من الزجاج إلى المحقنة الفموية عن طريق سحب المكبس للخلف. احرص على عدم سحب المكبس بالكامل للخارج.
6. سترى كمية قليلة من الهواء بالقرب من نهاية المكبس في المحقنة الفموية. اضغط على المكبس حتى يعود الدواء إلى الزجاج ويختفي الهواء. اسحب المكبس لسحب جرعة الدواء الصحيحة في المحقنة الفموية.
7. بينما لا تزال تمسك المحقنة الفموية في الزجاج ، اقلب الزجاج بحذر لأعلى بحيث تكون المحقنة في الأعلى. قم بإزالة المحقنة الفموية من محول عنق الزجاج دون الضغط على المكبس. خذ الدواء مباشرة بعد سحبه في المحقنة الفموية.
8. ضع الطرف المفتوح للمحقنة الفموية في جانب واحد من فم طفلك وادفع المكبس ببطء بينما يدخل السائل في فم طفلك. اجعل طفلك يبتلع الدواء ببطء لأنه يدخل في فمه.
9. إذا كانت جرعتك أكثر من 5 مل ، فستحتاج إلى استخدام نفس المحقنة أكثر من مرة وستحتاج إلى تكرار الخطوات من 3 إلى 7.
10. اترك المحول في الزجاج. ضع الغطاء مرة أخرى على الزجاج وأدره في اتجاه عقارب الساعة (إلى اليمين) لتشيده.
11. اشطف المحقنة الفموية بماء الصنبور النظيف واطرفها تجف في الهواء بعد كل استخدام.

استمرفي تناول عقار ريفاروكسابان حتى لو كنت تشعر جيداً. لا تتوقف عن تناول عقار ريفاروكسابان دون التحدث مع طبيبك. إذا توقفت عن تناول عقار ريفاروكسابان ، فقد يزداد خطر الإصابة بجلطة دموية.

## هناك استخدامات لهذا الدواء

يمكن وصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

## قبعة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

### قبل تناول عقار ريفاروكسابان ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كنت تعاني من حساسية تجاه عقار ريفاروكسابان أو أي أدوية أخرى أو أي من مكونات أقراص ريفاروكسابان. اسأل الصيدلي عن قائمة المكونات.
- أخبر طبيبك والصيدلي عن الأدوية الأخرى الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية التي تتناولها أو تخطط لتناولها. تأكد من ذكر الأدوية المدرجة في قسم التحذير الهام وأي مما يلي: كاربامازيبين (كارباترول ، إيبنتول ، إيكيترو ، تيجريتول ، تيجريتول إكس آر ، تيريل) ، إريثروميسين (Erythrocin ، Eryped ، Eryc ، EES ، أخرى) ، كيتوكونازول ، الفينيتوين (ديلانتين ، فينيتيك) ، ريفامبين (ريفادين ، ريماكتان) ، وريتونافير (نورفير ، في كالترا ، في فيكيرا باك). قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية. قد تتفاعل العديد من الأدوية الأخرى أيضاً مع عقار ريفاروكسابان ، لذا تأكد من إخبار طبيبك بجميع الأدوية التي تتناولها ، حتى تلك التي لا تظهر في هذه القائمة.
- أخبر طبيبك عن المنتجات العشبية التي تتناولها ، وخاصة نبتة سانت جون.
- أخبر طبيبك إذا كان لديك صمام قلب صناعي أو لاحظت مؤخراً أي كدمات أو نزيف غير عادي. من المحتمل أن يخبرك طبيبك بعدم تناول عقار ريفاروكسابان.
- أخبر طبيبك إذا كان لديك أو سبق أن عانيت من أي نوع من مشاكل النزيف ، متلازمة أضداد الشحوم الفوسفورية (APS) ؛ حالة تسبب جلطات الدم) ، نزيف أو قرحة في المعدة أو الأمعاء ، أو أمراض الكلى أو الكبد.
- أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو مرضعة. إذا أصبحت حاملاً أثناء تناول عقار ريفاروكسابان ، فاتصل بطبيبك.
- تحدث إلى طبيبك حول مخاطر وفوائد تناول عقار ريفاروكسابان إذا كان عمرك 75 عاماً أو أكبر.
- إذا كنت تخضع لعملية جراحية ، بما في ذلك جراحة الأسنان ، أخبر الطبيب أو طبيب الأسنان أنك تتناول عقار ريفاروكسابان. قد يخبرك طبيبك بالتوقف عن تناول عقار ريفاروكسابان قبل الجراحة أو الإجراء. سيخبرك طبيبك متى يجب أن تبدأ في تناول عقار ريفاروكسابان مرة أخرى بعد الجراحة.

## قبعة تعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

مالم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك ، استمر في نظامك الغذائي المعتاد.

## قبعة يجب أن أفعلها إذا نسيت جرعة؟

### الكبار:

- إذا كنت تتناول عقار ريفاروكسابان مرة واحدة في اليوم ، فتناول الجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها في ذلك اليوم. استأنف جدول الجرعات المعتاد في اليوم التالي.
- إذا كنت تتناول عقار ريفاروكسابان مرتين يومياً لعلاج DVT أو PE ، فتناول الجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها في ذلك اليوم. يمكنك تناول جرعتين في نفس الوقت لتعويض الجرعة الفائتة. استأنف جدول الجرعات المعتاد في اليوم التالي.

- إذا كان لديك CAD أو PAD وتناول عقار ريفاروكسابان مرتين في اليوم لتقليل مخاطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة وال PE وتفويت جرعة ، فما عليك سوى متابعة جدول الجرعات المعتاد. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

## الرضع والأطفال:

- إذا كنت تتناول عقار ريفاروكسابان مرة واحدة في اليوم ، فتناول الجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها في ذلك اليوم. استأنف جدول الجرعات المعتاد في اليوم التالي. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.
- إذا كنت تتناول عقار ريفاروكسابان مرتين في اليوم ، فتناول جرعة الصباح الفائتة بمجرد أن تتذكرها في ذلك اليوم. يمكنك تناول جرعتين في نفس الوقت في المساء لتعويض جرعة الصباح الفائتة. استأنف جدول الجرعات المعتاد في اليوم التالي
- إذا كنت تتناول عقار ريفاروكسابان ثلاث مرات في اليوم وفقدت جرعة ، فتجاوز الجرعة الفائتة واستمر في جدول الجرعات المعتاد. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

## الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

**قد يسبب Rivaroxaban آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:**

- تشنّج عضلي
- ألم في الذراعين أو الساقين (عند الأطفال)
- القيء (عند الأطفال)
- آلام في المعدة
- سعال (عند الأطفال)
- طفح جلدي (عند الأطفال)

**بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض أو تلك المذكورة في قسم تحذير هام ، فاتصل بطبيبك على الفور:**

- براز دموي أو أسود أو قطراني
- البول الوردي أو البني
- السعال أو القيء الدم أو المواد التي تشبه القهوة
- نزيف أنفي متكرر
- نزيف من لثتك
- نزيف الحيض الغزير
- ضعف
- تعب
- صداع الراس
- الدوخة أو الإغماء
- عدم وضوح الرؤية
- ألم في الذراع أو الساق

- متسرع
- متلف، منشوق
- صعوبة في التنفس أو البلع
- قشعريرة
- ألم أو تورم في مواقع الجرح

يمنع Rivaroxaban الدم من التجلط بشكل طبيعي لذلك قد يستغرق الأمر وقتاً أطول من المعتاد حتى تتوقف عن النزيف إذا جرحت أو أصيبت. قد يتسبب هذا الدواء أيضاً في إصابتك بكدمات أو نزيف بسهولة أكبر. اتصل بطبيبك على الفور إذا كان النزيف أو الكدمات أمراً غير معتاد.

قد يسبب Rivaroxaban آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء تناول هذا الدواء.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرة عبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).  
[http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

## قبة يجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

احتفظ بهذا الدواء في الحاوية التي جاء فيها ، ومغلقة بإحكام ، وبعيداً عن متناول الأطفال. قم بتخزينه في درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن الحرارة والرطوبة الزائدة (وليس في الحمام).

من المهم إبقاء جميع الأدوية بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال لأن العديد من الحاويات (مثل الأدوية الأسبوعية وقطرات العين والكريمات والبقع وأجهزة الاستنشاق) ليست مقاومة للأطفال ويمكن للأطفال الصغار فتحها بسهولة. لحماية الأطفال الصغار من التسمم ، قم دائماً بإغلاق أعطية الأمان ووضع الدواء على الفور في مكان آمن - مكان مرتفع وبعيداً عن أنظارهم ومدى وصولهم.  
[http://www.upandaway.org] [http://www.upandaway.org]

يجب التخلص من الأدوية غير الضرورية بطرق خاصة لضمان عدم تمكن الحيوانات الأليفة والأطفال والأشخاص الآخرين من تناولها. ومع ذلك ، يجب ألا تغسل هذا الدواء في المراض. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل طريقة للتخلص من أدويةك هي من خلال برنامج استعادة الأدوية. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك أو اتصل بقسم القمامة / إعادة التدوير المحلي للتعرف على برامج الاستعادة في مجتمعك. راجع موقع ويب التخلص الآمن من الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء [http://goo.gl/c4Rm4p] [http://goo.gl/c4Rm4p] لمزيد من المعلومات إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج الاستعادة.

## نحالة طارئة / جرعة زائدة

في حالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على [https://www.poisohelp.org/help] [https://www.poisohelp.org/help]. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

## قد تشمل أعراض الجرعة الزائدة ما يلي:

- نزيف أو كدمات غير عادية
- براز دموي أو أسود أو قطراني

- دم في البول
- السعال أو القيء الدم أو المواد التي تشبه القهوة

## قبعة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

احتفظ بجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر. قد يطلب طبيبك بعض الاختبارات المعملية للتحقق من استجابة جسمك للريفاروكسابان.

لاتدع أي شخص آخر يأخذ دوائك. الوصفة الخاصة بك وربما لا إعادة الملاء.

من المهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

## أسماء راند

- زاريلتو®

آخر مراجعة - 15/03/2022

[تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة](#)



[إخلاء المسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي](#)

AHFS® معلومات الدواء المريض <sup>TM</sup>. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي® كل الحقوق محفوظة. الازدواجية. 4500 East-West Highway، Suite 900، Bethesda، Maryland. للاستخدام التجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبة الوطنية للطب 8600 Rockville Pike، Bethesda، MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهد الوطنية للصحة

آخر تحديث للصفحة: 25 مارس 2022