



Express Medicine Shipments, Globally!  
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[บ้าน](#) → [ยา สมุนไพรและอาหารเสริม](#) → [ริวารอกซาบัน](#)

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611049.html>

## ริวารอกซาบัน

ออกเสียงว่า (riv " a rox' แบน)

### คำเตือนที่สำคัญ:

หากคุณมีภาวะหัวใจห้องบน มีโรคหลอดเลือดสมองหลังจากที่คุณหยุดใช้ยานี้ อย่าหยุดทานริวารอกซาบันโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ ทานริวารอกซาบันต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าลืมเติมใบสั่งยาของคุณก่อนที่คุณจะหมดยาเพื่อที่คุณจะไม่พลาดปริมาณยาริวารอกซาบัน หากคุณจำเป็นต้องหยุดทานยาริวารอกซาบัน แพทย์ของคุณอาจสั่งยาอื่นเพื่อที่คุณจะไม่พลาดปริมาณยา ( "ทินเนอร์เลือด") เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ลิ่มเลือดก่อตัวและทำให้คุณเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

หากคุณมียาที่ปิดกั้นตามเส้นประสาทหรือไขสันหลัง หรือการเจาะกระดูกสันหลังขณะทาน 'ทินเนอร์เลือด' เช่น ริวารอกซาบัน คุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดในหรือรอบๆ กระดูกสันหลังของคุณ ซึ่งอาจทำให้คุณเป็นอัมพาตได้ แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณมีสายสวนที่ปิดกั้นหรืออยู่ในร่างกาย หรือเคยมีหรือเคยเจาะกระดูกสันหลังส่วนปลายหรือกระดูกสันหลัง กระดูกสันหลังผิดรูป หรือการผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกสันหลังซ้ำๆ นอกแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณกำลังใช้แอนาเกรโรด (Agrylin); แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์อื่น ๆ (NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin, อื่น ๆ ), indomethacin (Indocin), ketoprofen และ naproxen (Aleve, Anaprox, อื่น ๆ ); ซิลอสตามอล; clopidogrel (Plavix); ไโดไพริดาโมล (เพอร์แซนทิน); eptifibatid; เฮปาริน; prasugrel (มีประสิทธิภาพ); สารยับยั้งการรับ serotonin-reuptake ที่เลือกได้ เช่น citalopram (Celexa) escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac ใน Symbyax), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Brisdelle, Paxil, Pexeva) และ sertraline (Zoloft); serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRI) เช่น desvenlafaxine (Pristiq), duloxetine (Cymbalta, Drizalma), levomilnacipran (Fetzima), milnacipran (Savella) และ venlafaxine (Effexor); ticagrelor (Brilinta); ติโคลพิดีน; tirofiban (Aggrastat) และ warfarin (Coumadin, Jantoven) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: ปวดหลัง กล้ามเนื้ออ่อนแรง (โดยเฉพาะที่ขาและเท้าของคุณ) ชาหรือรู้สึกเสียวซ่า (โดยเฉพาะที่ขาของคุณ) สูญเสียการควบคุมลำไส้หรือกระเพาะปัสสาวะหรือไม่สามารถ ขยับขาของคุณ serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRI) เช่น desvenlafaxine (Pristiq), duloxetine (Cymbalta, Drizalma), levomilnacipran (Fetzima), milnacipran (Savella) และ venlafaxine (Effexor); ticagrelor (Brilinta); ติโคลพิดีน; tirofiban (Aggrastat) และ warfarin (Coumadin, Jantoven) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: ปวดหลัง กล้ามเนื้ออ่อนแรง (โดยเฉพาะที่ขาและเท้าของคุณ) ชาหรือรู้สึกเสียวซ่า (โดยเฉพาะที่ขาของคุณ) สูญเสียการควบคุมลำไส้หรือกระเพาะปัสสาวะหรือไม่สามารถ ขยับขาของคุณ

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยา ริวารอกซาบัน

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยยา ริวารอกซาบัน และทุกครั้งที่คุณเติมใบสั่งยา อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคำถามใดๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ

เยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

(<http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM280333.pdf> [<http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM280333.pdf>]) หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อขอรับคู่มือการใช้งาน

## hy เป็นยานี้กำหนด?

Rivaroxaban ใช้ในการรักษาลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก (DVT; ลิ่มเลือด มักอยู่ที่ขา) และเส้นเลือดอุดตันที่ปอด (PE; ลิ่มเลือดในปอด) ในผู้ใหญ่ Rivaroxaban ยังใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ DVT และ PE เกิดขึ้นอีกหลังจากการรักษาเบื้องต้นเสร็จสิ้นในผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือลิ่มเลือดที่ร้ายแรงในผู้ใหญ่ที่มีภาวะหัวใจห้องบน ไซค. Rivaroxaban ยังใช้เพื่อป้องกัน DVT และ PE ในผู้ใหญ่ที่กำลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกหรือข้อเข่า หรือในผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการป่วยร้ายแรง และมีความเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดเนื่องจากความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลงหรือปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ นอกจากนี้ยังใช้ร่วมกับแอสไพรินเพื่อลดความเสี่ยงของอาการหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง หรือการเสียชีวิตในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (หลอดเลือดที่ส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบ) หรือโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ที่ให้เลือดไปเลี้ยงแขนขา) Rivaroxaban ยังใช้ในการรักษาและป้องกัน DVT และ PE ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในเด็กและการกบวมคนที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด (ทินเนอร์เลือด) อย่างน้อย 5 วัน นอกจากนี้ยังใช้เพื่อป้องกัน DVT และ PE หลังการผ่าตัดหัวใจในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (ความผิดปกติในหัวใจที่พัฒนาก่อนคลอด) Rivaroxaban อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า factor Xa inhibitors มันทำงานโดยการปิดกั้นการกระทำของสารธรรมชาติบางชนิดที่ช่วยให้เกิดลิ่มเลือด

## ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

Rivaroxaban มาในรูปแบบแท็บเล็ตและสารแขวนลอย (ของเหลว) ที่จะใช้ทางปาก เมื่อใช้ rivaroxaban เพื่อรักษา DVT หรือ PE ในผู้ใหญ่ มักรับประทานพร้อมกับอาหารวันละสองครั้งเป็นเวลา 21 วัน จากนั้นให้รับประทานอาหารวันละครั้ง เมื่อใช้ rivaroxaban เพื่อป้องกัน DVT หรือ PE ในผู้ใหญ่ มักรับประทานวันละครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหารหลังการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด (ทินเนอร์เลือด) อย่างน้อย 6 เดือน เมื่อใช้ rivaroxaban เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ใหญ่ที่มีภาวะหัวใจห้องบน (atrial fibrillation) มักรับประทานวันละครั้งพร้อมกับอาหารเย็น เมื่อใช้ rivaroxaban เพื่อป้องกัน DVT และ PE หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกหรือข้อเข่า มักรับประทานโดยมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้ง ควรให้ยาครั้งแรกอย่างน้อย 6 ถึง 10 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด โดยปกติ Rivaroxaban จะใช้เวลา 35 วันหลังจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและ 12 วันหลังจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า เมื่อใช้ rivaroxaban เพื่อป้องกัน DVT และ PE ในผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากอาการป่วยร้ายแรง และมีความเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันเนื่องจากความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ลดลง มักให้รับประทานโดยมีหรือไม่มีอาหารวันละครั้งโดยเริ่มเมื่อคุณอยู่ในโรงพยาบาล และต่อเนื่องเป็นเวลา 31 ถึง 39 วัน เมื่อรับประทาน rivaroxaban ร่วมกับแอสไพรินในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย มักรับประทานวันละสองครั้งโดยมีหรือไม่มีอาหาร เมื่อใช้ rivaroxaban ในเด็กและการกบวมเพื่อรักษาหรือป้องกัน DVT หรือ PE มักให้อาหาร 1 ถึง 3 ครั้งต่อวันหลังการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด (ทินเนอร์เลือด) อย่างน้อย 5 วัน เมื่อรับประทานริวารอกซาบันในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

รับประทานยา ริวารอกซาบัน ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคำแนะนำนำบนฉลากใบสั่งยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ rivaroxaban ตรงตามที่กำกับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกำหนด

สำหรับผู้ใหญ่ หาก你不能กลืนเม็ดยาไปได้ คุณสามารถบดให้ละเอียดแล้วผสมกับซอสแอปเปิ้ล กลืนส่วนผสมทันทีหลังจากที่คุณเตรียม นอกจากนี้ยังสามารถให้ Rivaroxaban ในท่อให้อาหารบางประเภท ถามแพทย์ว่าควรทานยาในท่อให้อาหารหรือไม่ ปฏิบัติตามคำแนะนำนำของแพทย์อย่างระมัดระวัง

สำหรับเด็กที่ทานยาเม็ดริวารอกซาบัน ให้กลืนทั้งเม็ด อย่าแยกพวกเขา

หากคุณหรือลูกของคุณอาเจียนหรืออุจจาระเหลวภายใน 30 นาทีหลังจากรับประทานยาเกิน 30 นาที ให้กินยาเต็มขนาดอีกครั้งโดยเร็วที่สุดหลังจากตอนที่อาเจียนแล้วทานยาต่อไปตามเวลาที่กำหนด

### ในการวัดสารแขวนลอยในช่องปาก rivaroxaban ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

- ใช้กระบอกฉีดยาที่มากพร้อมกับยาสำหรับวัดของเหลว อย่าใช้ช้อนที่ใช้ในครัวเรือนเพื่อวัดปริมาณของคุณ ช้อนชาที่ใช้ในครัวเรือนไม่ใช่อุปกรณ์วัดที่แม่นยำ และคุณอาจได้รับยามากเกินไปหรือได้รับยาไม่เพียงพอหากคุณวัดขนาดยาด้วยช้อนชาที่ใช้ในครัวเรือน
- เขย่าขวดเบา ๆ เป็นเวลา 10 วินาทีก่อนใช้ หากมีเม็ดยาเหลืออยู่ที่ด้านล่างของขวด ให้เขย่าเบา ๆ อีกครั้งเป็นเวลา 10 วินาที อย่าเขย่าขวดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดฟอง
- ถอดฝาขวดออกโดยกดฝาลง จากนั้นหมุนทวนเข็มนาฬิกา (ไปทางซ้าย) ห้ามถอดอะแดปเตอร์ออกจากด้านบนของขวด
- ดันอากาศทั้งหมดจากกระบอกฉีดยาในช่องปากเข้าไปในขวดโดยกดลูกสูบ จากนั้นสอดปลายเปิดของกระบอกฉีดยาในช่องปากเข้าไปในอะแดปเตอร์
- ในขณะที่ถือกระบอกฉีดยาเข้าที่ ให้พลิกขวดคว่ำอย่างระมัดระวัง ดึงยาออกจากขวดลงในกระบอกฉีดยาโดยดึงลูกสูบกลับระวังอย่าดึงลูกสูบออกจนสุด
- คุณเห็นอากาศจำนวนเล็กน้อยใกล้กับปลายลูกสูบในกระบอกฉีดยาในช่องปาก กดลูกสูบเพื่อให้ยากลับเข้าไปในขวดและอากาศก็หายไป ดึงลูกสูบกลับมาเพื่อดึงขนาดยาที่ถูกต้องลงในกระบอกฉีดยาในช่องปาก
- ในขณะที่ยังคงถือกระบอกฉีดยาในขวด ให้หมุนขวดขึ้นอย่างระมัดระวังเพื่อให้กระบอกฉีดยาอยู่ด้านบน ถอดกระบอกฉีดยาในช่องปากออกจากอะแดปเตอร์ขวดโดยไม่ต้องกดลูกสูบ ใช้ยาทันทีหลังจากที่คุณดึงเข้าไปในกระบอกฉีดยาในช่องปาก
- วางปลายเปิดของกระบอกฉีดยาในช่องปากไว้ที่ด้านหนึ่งของปากเด็กแล้วดันลูกสูบอย่างช้าๆ ขณะที่ของเหลวเข้าไปในปากของเด็ก ให้บุตรของท่านกลืนยาช้าๆ ขณะเข้าปาก
- ถ้าขนาดยาของคุณมากกว่า 5 มล. คุณจะต้องใช้กระบอกฉีดยาเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง และคุณจะต้องทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 7
- ทิ้งอะแดปเตอร์ไว้ในขวด วางฝากลับบนขวดแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา (ไปทางขวา) เพื่อขันให้แน่น
- ล้างกระบอกฉีดยาในช่องปากด้วยน้ำประปาที่สะอาดและปล่อยให้อากาศแห้งหลังการใช้งานแต่ละครั้ง

ทานริวารอกซาบันต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานริวารอกซาบันโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณหยุดทานยา ริวารอกซาบัน ความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอาจเพิ่มขึ้น

## ใช้สำหรับยา

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้อย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

## หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันทควรปฏิบัติตาม?

### ก่อนรับประทานริวารอกซาบัน

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยา ริวารอกซาบัน ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดริวารอกซาบัน สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม
- แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกำลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใช้ยาอื่นๆ ที่ต้องสั่งโดยแพทย์และไม่ใช้ใบสั่งยา อย่าลืมพูดถึงยาที่ระบุไว้ในส่วนคำเตือนที่สำคัญและสิ่งต่อไปนี้: carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Tegretol-XR, Teril), erythromycin (EES, Eryc, Eryped, Erythrocin, อื่น ๆ ), ketoconazole, phenytoin (Dilantin, Phenytek), rifampin (Rifadin, Rimactane) และ ritonavir (Norvir ใน Kaletra ใน Viekira Pak) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจำนวนมากอาจโต้ตอบกับยา ริวารอกซาบันด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกำลังใช้ แม้แต่ยาที่ไม่ปรากฏในรายการนี้
- บอกแพทย์ว่าคุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณมีลิ้นหัวใจเทียมหรือเพิ่งสังเกตเห็นรอยฟกช้ำหรือมีเลือดออกผิดปกติ แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานริวารอกซาบัน
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณเคยมีหรือเคยมีปัญหาเลือดออกชนิดใดก็ตาม กลุ่มอาการแอนตีฟอสโฟไลปิด (APS; ภาวะที่ทำให้เกิดลิ่มเลือด) มีเลือดออกหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ของคุณ หรือโรคไตหรือตับ
- แจ้งแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานยา ริวารอกซาบัน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ
- พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการใช้ rivaroxaban หากคุณอายุ 75 ปีขึ้นไป
- หากคุณกำลังมีการผ่าตัด รวมถึงการผ่าตัด ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกำลังใช้ยา ริวารอกซาบัน แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณหยุดทานริวารอกซาบันก่อนการผ่าตัดหรือหัตถการ แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณควรเริ่มใช้ยา ริวารอกซาบันอีกครั้ง หลังการผ่าตัด

## ฉันทควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม่?

ให้ทานอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

## ฉันทควรทำอะไรถ้าฉันทลืมนยา?

### ผู้ใหญ่:

- หากคุณทานยา ริวารอกซาบันวันละครั้ง ให้ทานยาที่ลืมนไปทันทีที่นึกได้ในวันนั้น ดำเนินการต่อตารางการจ่ายยาตามปกติของคุณในวันถัดไป
- หากคุณทานยา ริวารอกซาบันวันละสองครั้งเพื่อรักษา DVT หรือ PE ให้ทานยาที่ไม่ได้รับทันทีที่จำได้ในวันนั้น คุณอาจทาน 2 โดสิสพร้อมกันเพื่อชดเชยขนาดที่ไม่ได้รับ ดำเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติของคุณในวันถัดไป

- หากคุณมี CAD หรือ PAD และรับประทาน rivaroxaban วันละสองครั้งเพื่อลดความเสี่ยงของ DVT และ PE และพลาดการรับประทาน ให้ทำตามตารางการให้ยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

### **การกและเด็ก:**

- หากคุณทานยาริวารอกซาบันวันละครั้ง ให้ทานยาที่ลืมไปทันทีที่นึกได้ในวันนั้น ดำเนินการต่อตารางการจ่ายยาตามปกติของคุณในวันถัดไป อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด
- หากคุณทานยาริวารอกซาบันวันละสองครั้ง ให้ทานยาตอนเช้าที่ลืมไปทันทีที่นึกได้ในวันนั้น คุณอาจรับประทาน 2 โดสิในเวลาเดียวกันในตอนเย็นเพื่อชดเชยสำหรับมือที่ลืมไปในตอนเช้า ดำเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติของคุณในวันถัดไป
- หากคุณทานยาริวารอกซาบันสามครั้งต่อวันและพลาดการทานยา ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดำเนินการตามกำหนดเวลาการให้ยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

### **ผลข้างเคียงของหมวก ยานีสามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?**

### **Rivaroxaban อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:**

- กล้ามเนื้อกระตุก
- ปวดแขนหรือขา (ในเด็ก)
- อาเจียน (ในเด็ก)
- อาการปวดท้อง
- อาการไอ (ในเด็ก)
- ผื่น (ในเด็ก)

### **ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคำเตือนที่สำคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:**

- อุจจาระเป็นเลือด สีดำ หรือช้ำ
- ปัสสาวะสีชมพูหรือสีน้ำตาล
- ไอหรืออาเจียนเป็นเลือดหรือวัสดุที่ดูเหมือนกากกาแฟ
- เลือดกำเดาไหลบ่อย
- มีเลือดออกจากเหงือก
- ประจำเดือนมามาก
- ความอ่อนแอ
- เห็นหย่อมเยี่ยว้ำ
- ปวดหัว
- อาการวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลม
- มองเห็นภาพซ้อน
- ปวดแขนหรือขา

- ผื่น
- อาการคัน
- หายใจลำบากหรือกลืนลำบาก
- ลมพิษ
- ปวดหรือบวมบริเวณแผล

Rivaroxaban ป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวตามปกติ ดังนั้นอาจใช้เวลานานกว่าปกติในการหยุดเลือดหากคุณถูกตัดหรือได้รับบาดเจ็บ ยานี้อาจทำให้คุณช้ำหรือมีเลือดออกได้ง่ายขึ้น โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากมีเลือดออกหรือช้ำผิดปกติ

Rivaroxaban อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์ (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

## หมวก ฉนวนควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกำจัดยา?

เก็บยาไว้ในภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องน้ำ)

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจำนวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยาหยอดตาครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ลือคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในที่ปลอดภัยทันที - อันที่อยู่ที่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึง <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

ควรกำจัดยาที่ไม่จำเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยาลงในชักโครก วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนำกลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกำจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

## ก กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่ <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

## อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

- เลือดออกหรือช้ำผิดปกติ
- อุจจาระเป็นเลือด สีดำ หรือชกช้ำ

- เลือดในปัสสาวะ
- ไอหรืออาเจียนเป็นเลือดหรือวัสดุที่ดูเหมือนกากกาแฟ

## หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ rivaroxaban

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ใบสั่งยาของคุณอาจไม่สามารถเติมเงินได้

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่คุณพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

## ชื่อแบรนด์

- ซาเรลโต®

แก้ไขล่าสุด - 03/15/2022

[เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ](#)

AHFS® ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ © ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ  
สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022