



Express Medicine Shipments, Globally!  
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [药物、草药和补充剂](#) → 利伐沙班

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611049.html>

## 利伐沙班

发音为 (riv' a rox' a ban)

### 重要警告:

如果您患有心房颤动（心脏跳动不规律，增加体内血栓形成的机会，并可能导致中风）并且正在服用利伐沙班来帮助预防中风或严重的血栓，您的风险会更高停止服用这种药物后中风。不要在未咨询医生的情况下停止服用利伐沙班。即使您感觉良好，也要继续服用利伐沙班。请务必在药物用完之前重新填写您的处方，这样您就不会错过任何剂量的利伐沙班。如果您需要停止服用利伐沙班，您的医生可能会开另一种抗凝剂（“血液稀释剂”）来帮助防止血栓形成并导致您中风。

如果您在服用利伐沙班等“血液稀释剂”时进行硬膜外麻醉或脊髓麻醉或脊髓穿刺，您可能在脊柱内或脊柱周围形成血栓，从而导致您瘫痪。如果您的体内留有硬膜外导管，或者曾经或曾经反复进行硬膜外或脊柱穿刺、脊柱畸形或脊柱手术，请告诉您的医生。如果您正在服用阿那格雷（Agrylin），请告诉您的医生和药剂师；阿司匹林和其他非甾体抗炎药（NSAID），例如布洛芬（Advil、Motrin等）、消炎痛（Indocin）、酮洛芬和萘普生（Aleve、Anaprox等）；西洛他唑；氯吡格雷（波立维）；双嘧达莫（Persantine）；依替巴肽；肝素；普拉格雷（高效）；选择性5-羟色胺再摄取抑制剂，例如西酞普兰（Celexa），依他普仑（Lexapro）、氟西汀（Prozac，在 Symbyax）、氟伏沙明（Luvox）、帕罗西汀（Brisdelle、Paxil、Pexeva）和舍曲林（Zoloft）；5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂（SNRI），例如去甲文拉法辛（Pristiq）、度洛西汀（Cymbalta、Drizalma）、左旋米那普仑（Fetzima）、米那普仑（Savella）和文拉法辛（Effexor）；替格瑞洛（布里林塔）；噻氯匹定；替罗非班（Aggrastat）和华法林（Coumadin、Jantoven）。如果您出现以下任何症状，请立即就医：背痛、肌肉无力（尤其是腿部和足部）、麻木或刺痛（尤其是腿部）、肠道或膀胱失去控制或无法移动你的腿。5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂（SNRI），例如去甲文拉法辛（Pristiq）、度洛西汀（Cymbalta、Drizalma）、左旋米那普仑（Fetzima）、米那普仑（Savella）和文拉法辛（Effexor）；替格瑞洛（布里林塔）；噻氯匹定；替罗非班（Aggrastat）和华法林（Coumadin、Jantoven）。如果您出现以下任何症状，请立即就医：背痛、肌肉无力（尤其是腿部和足部）、麻木或刺痛（尤其是腿部）、肠道或膀胱失去控制或无法移动你的腿。5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂（SNRI），例如去甲文拉法辛（Pristiq）、度洛西汀（Cymbalta、Drizalma）、左旋米那普仑（Fetzima）、米那普仑（Savella）和文拉法辛（Effexor）；替格瑞洛（布里林塔）；噻氯匹定；替罗非班（Aggrastat）和华法林（Coumadin、Jantoven）。如果您出现以下任何症状，请立即就医：背痛、肌肉无力（尤其是腿部和足部）、麻木或刺痛（尤其是腿部）、肠道或膀胱失去控制或无法移动你的腿。

与您的医生讨论服用利伐沙班的风险。

当您开始使用利伐沙班治疗以及每次重新配药时，您的医生或药剂师都会给您制造商的患者信息表（药物指南）。仔细阅读信息，如有任何问题，请咨询您的医生或药剂师。你也可以

访问食品和药物管理局 (FDA) 网站

(<http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM280333.pdf> [<http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM280333.pdf>]) 或制造商的网站获取用药指南。

## 为什么要开这种药?

利伐沙班用于治疗成人深静脉血栓形成 (DVT; 血栓, 通常在腿部) 和肺栓塞 (PE; 肺血栓)。利伐沙班还用于预防成人完成初始治疗后再次发生 DVT 和 PE。它还用于帮助预防并非由心脏瓣膜引起的心房颤动 (心脏跳动不规则, 增加体内血栓形成的机会, 并可能导致中风) 的成人中风或严重血栓疾病。利伐沙班还用于预防接受髋关节置换或膝关节置换手术的成年人或因严重疾病住院并因四处走动能力下降或其他风险因素而有形成凝块风险的成人的 DVT 和 PE。它还与阿司匹林一起使用, 以降低患有冠状动脉疾病 (向心脏供血的血管变窄) 或外周动脉疾病 (血管循环不良) 的成年人心脏病发作、中风或死亡的风险为手臂和腿供血)。利伐沙班还用于治疗 and 预防接受至少 5 天初始抗凝 (血液稀释剂) 治疗的儿童和某些婴儿再次发生 DVT 和 PE。它还用于预防患有先天性心脏病 (出生前心脏异常) 的 2 岁或以上儿童心脏手术后的 DVT 和 PE。利伐沙班属于一类称为 Xa 因子抑制剂的药物。它的作用是阻止某种有助于血栓形成的天然物质的作用。

## 这个药应该怎么用?

利伐沙班以片剂和悬浮液 (液体) 的形式口服。当利伐沙班用于治疗成人 DVT 或 PE 时, 通常每天两次与食物一起服用, 持续 21 天, 然后每天一次与食物一起服用。当利伐沙班用于预防成人 DVT 或 PE 时, 通常在至少 6 个月的抗凝 (血液稀释剂) 治疗后每天服用一次, 有或没有食物。当利伐沙班用于预防房颤患者中风时, 通常每天在晚餐时服用一次。在髋关节或膝关节置换手术后服用利伐沙班预防 DVT 和 PE 时, 通常每天服用或不服用食物一次。第一剂应在手术后至少 6 至 10 小时服用。利伐沙班通常在髋关节置换手术后 35 天和膝关节置换手术后 12 天服用。服用利伐沙班以预防因严重疾病住院并有因四处走动能力下降而有形成凝块风险的成人的 DVT 和 PE 时, 通常从您住院时开始每天一次与食物一起服用或不与食物一起服用然后持续总共 31 到 39 天。在患有冠状动脉疾病或外周动脉疾病的成人中, 当利伐沙班与阿司匹林一起服用时, 通常每天服用两次, 有或没有食物。当利伐沙班用于儿童和婴儿治疗或预防 DVT 或 PE 时, 通常在至少 5 天的抗凝 (血液稀释剂) 治疗后每天 1 至 3 次与食物一起服用。当 2 岁或以上患有先天性心脏病的儿童服用利伐沙班时,

每天大约在同一时间服用利伐沙班。仔细遵循处方标签上的说明, 并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用利伐沙班。不要多吃或少吃, 也不要比医生开的更频繁。

对于成年人, 如果您无法吞咽药片, 可以将它们压碎并与苹果酱混合。准备好后立即吞下混合物。利伐沙班也可以通过某些类型的饲管给药。询问您的医生是否应该在饲管中服用这种药物。仔细遵循医生的指示。

对于服用利伐沙班片的儿童, 整片吞服; 不要拆分它们。

如果您或您的孩子在服用一剂利伐沙班口服混悬液后 30 分钟内呕吐或吐痰, 请在呕吐发作后尽快再服用一次全剂量, 然后在定期安排的时间服用下一剂。

### **要测量利伐沙班口服混悬液, 请执行以下步骤:**

1. 使用药物随附的口服注射器测量液体。不要使用家用勺子来测量您的剂量。家用茶匙不是准确的测量设备, 如果您用家用茶匙测量剂量, 您可能会收到太多或没有足够的药物。
2. 使用前轻轻摇晃瓶子 10 秒。如果瓶底还有剩余的颗粒, 请再次轻轻摇晃 10 秒钟。不要摇晃瓶子, 以免起泡。
3. 按下瓶盖取下瓶盖, 然后逆时针 (向左) 转动。不要从瓶子顶部取下适配器。
4. 向下推柱塞, 将口腔注射器中的所有空气推入瓶中。然后将口腔注射器的开口尖端插入适配器。
5. 握住口腔注射器, 小心地将瓶子倒置。通过拉回柱塞, 将一些药物从瓶子中抽出到口服注射器中。小心不要将柱塞完全拉出。
6. 您会在口腔注射器的柱塞末端附近看到少量空气。推动柱塞, 使药物回到瓶中, 空气消失。向后拉柱塞, 将正确的药物剂量吸入口服注射器。
7. 仍将口服注射器保持在瓶中, 小心地将瓶子向上翻转, 使注射器位于顶部。在不推动柱塞的情况下从瓶颈适配器上取下口服注射器。将药物吸入口服注射器后立即服用。
8. 将口腔注射器的开口尖端放入您孩子嘴巴的一侧, 当液体进入您孩子的嘴巴时, 慢慢推动柱塞; 让您的孩子在药物进入口中时慢慢吞下。
9. 如果您的剂量超过 5 mL, 您将需要多次使用同一注射器, 并且您需要重复步骤 3 到 7。
10. 将适配器留在瓶中。将盖子放回瓶子上并顺时针 (向右) 转动以拧紧。
11. 每次使用后用干净的自来水冲洗口腔注射器并使其风干。

即使您感觉良好,也要继续服用利伐沙班。不要在未咨询医生的情况下停止服用利伐沙班。如果您停止服用利伐沙班,血栓的风险可能会增加。

## 该药的其他用途

这种药物可用于其他用途;向您的医生或药剂师咨询更多信息。

## 我应该遵循什么特殊的预防措施?

### 在服用利伐沙班之前,

- 如果您对利伐沙班、任何其他药物或利伐沙班片剂中的任何成分过敏,请告诉您的医生和药剂师。向您的药剂师索取成分清单。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用的其他处方药和非处方药、维生素和营养补充剂。请务必提及“重要警告”部分中列出的药物和以下任何药物:卡马西平(Carbatrol、Epitol、Equetro、Tegretol、Tegretol-XR、Teril)、红霉素(EES、Eryc、Eryped、Erythrocin等)、酮康唑、苯妥英(Dilantin、Phenytek)、利福平(Rifadin、Rimactane)和利托那韦(Norvir,在Kaletra,在Viekira Pak)。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。许多其他药物也可能与利伐沙班相互作用,因此请务必告诉您的医生您正在服用的所有药物,即使是未出现在此列表中的药物。
- 告诉您的医生您正在服用什么草药产品,尤其是圣约翰草。
- 如果您有人工心脏瓣膜或最近发现任何不寻常的瘀伤或出血,请告诉您的医生。您的医生可能会告诉您不要服用利伐沙班。
- 如果您有或曾经有过任何类型的出血问题、抗磷脂综合征(APS;一种导致血栓的疾病)、胃或肠出血或溃疡,或者肾脏或肝脏疾病,请告诉您的医生。
- 如果您怀孕、计划怀孕或正在哺乳,请告诉您的医生。如果您在服用利伐沙班期间怀孕,请致电您的医生。
- 如果您75岁或以上,请与您的医生讨论服用利伐沙班的风险和益处。
- 如果您正在接受手术,包括牙科手术,请告诉医生或牙医您正在服用利伐沙班。您的医生可能会告诉您在手术或手术前停止服用利伐沙班。您的医生会告诉您什么时候应该在手术后再次开始服用利伐沙班。

## 我应该遵循特殊的饮食说明吗?

除非您的医生另有说明,否则请继续您的正常饮食。

## 如果我忘记服药该怎么办?

### 成年人:

- 如果您每天服用一次利伐沙班,请在当天记住错过的剂量后立即服用。第二天恢复您的常规给药计划。
- 如果您每天服用两次利伐沙班来治疗DVT或PE,请在当天记住错过的剂量后立即服用。您可以同时服用2剂以弥补错过的剂量。第二天恢复您的常规给药计划。

- 如果您患有 CAD 或 PAD 并每天服用两次利伐沙班以降低 DVT 和 PE 的风险并错过剂量，请继续您的常规给药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

## 婴儿和儿童：

- 如果您每天服用一次利伐沙班，请在当天记住错过的剂量后立即服用。第二天恢复您的常规给药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。
- 如果您每天服用两次利伐沙班，请在当天记住错过的早晨剂量后立即服用。您可以在晚上同时服用 2 剂，以弥补错过的早晨剂量。第二天恢复您的常规给药计划
- 如果您每天服用 3 次利伐沙班并错过一剂，请跳过错过的剂量并继续您的常规给药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

## 这种药物会引起副作用吗？

**利伐沙班可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：**

- 肌肉痉挛
- 手臂或腿部疼痛（儿童）
- 呕吐（儿童）
- 肚子痛
- 咳嗽（儿童）
- 皮疹（儿童）

**一些副作用可能很严重。如果您遇到任何这些症状或重要警告部分中列出的症状，请立即致电您的医生：**

- 血便、黑色或柏油样便
- 粉红色或棕色尿液
- 咳出或吐出看起来像咖啡渣的血液或物质
- 经常流鼻血
- 牙龈出血
- 大量月经出血
- 弱点
- 疲倦
- 头痛
- 头晕或昏厥
- 模糊的视野
- 手臂或腿部疼痛

- 皮疹
- 瘙痒
- 呼吸或吞咽困难
- 麻疹
- 伤口部位疼痛或肿胀

利伐沙班可防止血液正常凝结, 因此如果您被割伤或受伤, 止血可能需要比平时更长的时间。这种药物也可能导致您更容易瘀伤或流血。如果出血或瘀伤异常, 请立即致电您的医生。

利伐沙班可能会引起其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题, 请致电您的医生。

如果您出现严重的副作用, 您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

## 我应该知道这种药物的储存和处置吗?

将这种药物放在它进来的容器中, 紧紧关闭, 并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在室温下, 远离过多的热量和水分 (不要放在浴室里)。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要, 因为许多容器 (例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器) 不适合儿童使用, 而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免于中毒, 请始终锁上安全帽并立即将药物放在安全的位置——一个高高的、远离他们视线和够不到的地方。<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

不需要的药物应以特殊方式处理, 以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是, 您不应该将这种药物冲入马桶。相反, 处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门, 了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站 (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 如果您无权访问回收计划, 请了解更多信息。

## n 紧急情况/过量

如果服用过量, 请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. 如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来, 请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

## 过量服用的症状可能包括以下内容:

- 异常出血或瘀伤
- 血便、黑色或柏油样便

- 尿液中有血
- 咳出或吐出看起来像咖啡渣的血液或物质

## 我应该知道其他信息吗？

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生可能会下令进行某些实验室测试，以检查您的身体对利伐沙班的反应。

不要让其他人服用您的药物。您的处方可能无法补充。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

## 兰特名称

- 拜瑞妥®

最后修订 - 2022年3月15日

[了解如何引用此页面](#)



### [美国卫生系统药剂师协会免责声明](#)

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

---

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面：2022年3月25日