

[Huis](#) → [Medicijnen, kruiden en supplementen](#) → Rivaroxaban

Source : U.S. National Library of Medicine

URL van deze pagina: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611049.html>

Rivaroxaban

uitgesproken als (riv'' a rox' a ban)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Als u atriumfibrilleren heeft (een aandoening waarbij het hart onregelmatig klopt, waardoor de kans op stolsels in het lichaam toeneemt en mogelijk beroertes veroorzaakt) en u rivaroxaban gebruikt om beroertes of ernstige bloedstolsels te voorkomen, loopt u een hoger risico op een beroerte krijgt nadat u bent gestopt met het innemen van dit medicijn. Stop niet met het innemen van rivaroxaban zonder met uw arts te overleggen. Blijf rivaroxaban gebruiken, ook als u zich goed voelt. Zorg ervoor dat u uw recept bijvult voordat uw medicatie opraakt, zodat u geen enkele dosis rivaroxaban hoeft te missen. Als u moet stoppen met het innemen van rivaroxaban, kan uw arts u een ander antistollingsmiddel ("bloedverdunner") voorschrijven om te voorkomen dat zich een bloedstolsel vormt en u een beroerte krijgt.

Als u epidurale of spinale anesthesie of een ruggenmergpunctie krijgt terwijl u een 'bloedverdunner' zoals rivaroxaban gebruikt, loopt u het risico een bloedstolsel te krijgen in of rond uw wervelkolom waardoor u verlamd zou kunnen raken. Vertel het uw arts als u een epidurale katheter heeft die in uw lichaam is achtergebleven of als u herhaalde epidurale of spinale puncties, spinale misvorming of spinale chirurgie heeft of ooit heeft gehad. Vertel uw arts en apotheker als u anagrelide (Agyrin) gebruikt; aspirine en andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) zoals ibuprofen (Advil, Motrin, anderen), indomethacine (Indocin), ketoprofen en naproxen (Aleve, Anaprox, anderen); cilostazol; clopidogrel (Plavix); dipyridamol (Persantine); eptifibatide; heparine; prasugrel (Effient); selectieve serotonineheropnameremmers zoals citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, in Symbyax), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Brisdelle, Paxil, Pexeva) en sertraline (Zoloft); serotonine-noradrenalineheropnameremmers (SNRI) zoals desvenlafaxine (Pristiq), duloxetine (Cymbalta, Drizalma), levomilnacipran (Fetzima), milnacipran (Savella) en venlafaxine (Effexor); ticagrelor (Brilinta); ticlopidine; tirofiban (Aggrastat) en warfarine (Coumadin, Jantoven). Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: ruggpijn, spierzwakte (vooral in uw benen en voeten), gevoelloosheid of tintelingen (vooral in uw benen), verlies van controle over uw darmen of blaas, of onvermogen om beweeg je benen. serotonine-noradrenalineheropnameremmers (SNRI) zoals desvenlafaxine (Pristiq), duloxetine (Cymbalta, Drizalma), levomilnacipran (Fetzima), milnacipran (Savella) en venlafaxine (Effexor); ticagrelor (Brilinta); ticlopidine; tirofiban (Aggrastat) en warfarine (Coumadin, Jantoven). Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: ruggpijn, spierzwakte (vooral in uw benen en voeten), gevoelloosheid of tintelingen (vooral in uw benen), verlies van controle over uw darmen of blaas, of onvermogen om beweeg je benen. serotonine-noradrenalineheropnameremmers (SNRI) zoals desvenlafaxine (Pristiq), duloxetine (Cymbalta, Drizalma), levomilnacipran (Fetzima), milnacipran (Savella) en venlafaxine (Effexor); ticagrelor (Brilinta); ticlopidine; tirofiban (Aggrastat) en warfarine (Coumadin, Jantoven). Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: ruggpijn, spierzwakte (vooral in uw benen en voeten), gevoelloosheid of tintelingen (vooral in uw benen), verlies van controle over uw darmen of blaas, of onvermogen om beweeg je benen.

Praat met uw arts over het risico van het gebruik van rivaroxaban.

Uw arts of apotheker zal u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven wanneer u begint met de behandeling met rivaroxaban en elke keer dat u uw recept bijvult. Lees de informatie aandachtig door en vraag uw arts of apotheker om advies als u vragen heeft. Je kan ook

bezoek de website van de Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM280333.pdf> [<http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM280333.pdf>]) of de website van de fabrikant om de Medicatiegids te verkrijgen.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Rivaroxaban wordt gebruikt voor de behandeling van diepe veneuze trombose (DVT; een bloedstolsel, meestal in het been) en longembolie (PE; een bloedstolsel in de long) bij volwassenen. Rivaroxaban wordt ook gebruikt om te voorkomen dat DVT en PE opnieuw optreden nadat de initiële behandeling bij volwassenen is voltooid. Het wordt ook gebruikt om beroertes of ernstige bloedstolsels te helpen voorkomen bij volwassenen met atriale fibrillatie (een aandoening waarbij het hart onregelmatig klopt, waardoor de kans op stolsels in het lichaam groter wordt en mogelijk beroertes veroorzaakt) die niet wordt veroorzaakt door de hartklep. ziekte. Rivaroxaban wordt ook gebruikt om DVT en PE te voorkomen bij volwassenen die een heup- of knieervangende operatie ondergaan of bij mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen voor ernstige ziekten en het risico lopen een bloedstolsel te ontwikkelen als gevolg van een verminderd bewegingsvermogen of andere risicofactoren. Het wordt ook samen met aspirine gebruikt om het risico op een hartaanval, beroerte of overlijden te verlagen bij volwassenen met coronaire hartziekte (vernauwing van de bloedvaten die het hart van bloed voorzien) of perifere arteriële ziekte (slechte bloedsomloop in de bloedvaten). die de armen en benen van bloed voorzien). Rivaroxaban wordt ook gebruikt voor het behandelen en voorkomen van herhaling van DVT en PE bij kinderen en bepaalde zuigelingen die ten minste 5 dagen een initiële antistollingsbehandeling (bloedverdunner) hebben gekregen. Het wordt ook gebruikt om DVT en PE na een hartoperatie te voorkomen bij kinderen van 2 jaar of ouder met een aangeboren hartaandoening (afwijking in het hart die zich voor de geboorte ontwikkelt). Rivaroxaban zit in een klasse van medicijnen die factor Xa-remmers worden genoemd. Het werkt door de werking te blokkeren van een bepaalde natuurlijke stof die helpt bij de vorming van bloedstolsels.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Rivaroxaban wordt geleverd als een tablet en een suspensie (vloeistof) om via de mond in te nemen. Wanneer rivaroxaban wordt gebruikt voor de behandeling van DVT of PE bij volwassenen, wordt het gewoonlijk gedurende 21 dagen tweemaal daags met voedsel ingenomen en vervolgens eenmaal daags met voedsel. Wanneer rivaroxaban wordt gebruikt om DVT of PE bij volwassenen te voorkomen, wordt het gewoonlijk eenmaal daags met of zonder voedsel ingenomen na ten minste 6 maanden antistollingsbehandeling (bloedverdunner). Wanneer rivaroxaban wordt gebruikt om een beroerte te voorkomen bij patiënten met atriumfibrilleren, wordt het gewoonlijk eenmaal daags bij de avondmaaltijd ingenomen. Wanneer rivaroxaban wordt ingenomen om DVT en PE te voorkomen na een heup- of knieervangende operatie, wordt het gewoonlijk eenmaal daags met of zonder voedsel ingenomen. De eerste dosis moet ten minste 6 tot 10 uur na de operatie worden ingenomen. Rivaroxaban wordt gewoonlijk ingenomen gedurende 35 dagen na een heupervangende operatie en gedurende 12 dagen na een knieervangende operatie. Wanneer rivaroxaban wordt gebruikt om DVT en PE te voorkomen bij volwassenen die voor ernstige ziekten in het ziekenhuis zijn opgenomen en het risico lopen een bloedstolsel te ontwikkelen als gevolg van een verminderd bewegingsvermogen, wordt het gewoonlijk eenmaal daags met of zonder voedsel ingenomen, te beginnen wanneer u in het ziekenhuis bent. en dan in totaal 31 tot 39 dagen doorgaan. Wanneer rivaroxaban samen met aspirine wordt ingenomen bij volwassenen met coronaire hartziekte of perifere arteriële ziekte, wordt het gewoonlijk tweemaal daags ingenomen, met of zonder voedsel. Wanneer rivaroxaban wordt gebruikt bij kinderen en zuigelingen om DVT of PE te behandelen of te voorkomen, wordt het gewoonlijk 1 tot 3 keer per dag met voedsel gegeven na ten minste 5 dagen antistollingsbehandeling (bloedverdunner). Wanneer rivaroxaban wordt ingenomen bij kinderen van 2 jaar of ouder met een aangeboren hartaandoening,

Neem rivaroxaban elke dag op ongeveer dezelfde tijd(en) in. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem rivaroxaban precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Voor volwassenen: als u de tabletten niet kunt doorslikken, kunt u ze fijnmaken en mengen met appelmoes. Slik het mengsel direct nadat je het hebt bereid door. Rivaroxaban kan ook in bepaalde soorten voedingssondes worden gegeven. Vraag uw arts of u dit medicijn in uw voedingssonde moet nemen. Volg de aanwijzingen van uw arts zorgvuldig op.

Voor kinderen die rivaroxaban-tabletten gebruiken, slik de tabletten in hun geheel door; splits ze niet.

Als u of uw kind binnen 30 minuten na het innemen van een dosis rivaroxaban suspensie voor oraal gebruik braakt of spuugt, neem dan zo snel mogelijk na de episode van braken nog een volledige dosis en neem dan uw volgende dosis op het geplande tijdstip in.

Volg deze stappen om rivaroxaban suspensie voor oraal gebruik te meten:

1. Gebruik de orale spuit die bij het medicijn is geleverd om de vloeistof af te meten. Gebruik geen huishoudlepel om uw dosis af te meten. Huishoudelijke theelepels zijn geen nauwkeurige meetinstrumenten en u kunt te veel of te weinig medicatie krijgen als u uw dosis afmeet met een huishoudelijk theelepeltje.
2. Schud de fles voorzichtig gedurende 10 seconden voor gebruik. Als er korrels op de bodem van de fles achterblijven, schud dan nogmaals voorzichtig gedurende 10 seconden. Schud de fles niet om schuimvorming te voorkomen.
3. Verwijder de dop van de fles door op de dop te drukken en draai hem vervolgens tegen de klok in (naar links). Verwijder de adapter niet van de bovenkant van de fles.
4. Duw alle lucht uit de orale spuit in de fles door de zuiger naar beneden te duwen. Steek vervolgens de open punt van de orale spuit in de adapter.
5. Terwijl u de orale spuit op zijn plaats houdt, draait u de fles voorzichtig ondersteboven. Trek een deel van het medicijn uit de fles in de orale spuit door de zuiger naar achteren te trekken. Zorg ervoor dat u de zuiger niet helemaal naar buiten trekt.
6. U ziet een kleine hoeveelheid lucht aan het uiteinde van de zuiger in de orale spuit. Druk op de zuiger zodat het medicijn terug in de fles gaat en de lucht verdwijnt. Trek de zuiger naar achteren om uw juiste medicatiedosis in de orale spuit op te zuigen.
7. Terwijl u de orale spuit nog steeds in de fles houdt, draait u de fles voorzichtig omhoog zodat de spuit bovenop zit. Verwijder de orale spuit van de fleshalsadapter zonder op de zuiger te drukken. Neem het medicijn direct nadat u het in de orale spuit heeft opgezogen.
8. Plaats de open punt van de orale spuit in één kant van de mond van uw kind en druk langzaam op de zuiger terwijl de vloeistof in de mond van uw kind komt; laat uw kind het medicijn langzaam doorslikken terwijl het in de mond komt.
9. Als uw dosis meer dan 5 ml is, moet u dezelfde spuit meer dan één keer gebruiken en moet u stap 3 tot en met 7 herhalen.
10. Laat de adapter in de fles zitten. Plaats de dop terug op de fles en draai deze met de klok mee (naar rechts) om hem vast te draaien.
11. Spoel de orale spuit af met schoon kraanwater en laat hem na elk gebruik aan de lucht drogen.

Blijf rivaroxaban gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van rivaroxaban zonder met uw arts te overleggen. Als u stopt met het innemen van rivaroxaban, kan uw risico op een bloedstolsel toenemen.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u rivaroxaban inneemt,

- vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor rivaroxaban, voor andere medicijnen of voor één van de bestanddelen van rivaroxaban-tabletten. Vraag uw apotheker om een lijst van de ingrediënten.
- vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines en voedingssupplementen u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u de medicijnen vermeldt die worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN en een van de volgende: carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Tegretol-XR, Teril), erytromycine (EES, Eryc, Eryped, Erythrocin, anderen), ketoconazol, fenytoïne (Dilantin, Phenytek), rifampicine (Rifadin, Rimactane) en ritonavir (Norvir, in Kaletra, in Viekira Pak). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met rivaroxaban, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen.
- vertel uw arts welke kruidenproducten u gebruikt, vooral sint-janskruid.
- vertel het uw arts als u een kunstmatige hartklep heeft of onlangs ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen heeft opgemerkt. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen om geen rivaroxaban te gebruiken.
- vertel het uw arts als u een bloedingsprobleem heeft of ooit heeft gehad, antifosfolipidensyndroom (APS; een aandoening die bloedstolsels veroorzaakt), bloeding of een zweer in uw maag of darm, of nier- of leverziekte.
- vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u rivaroxaban gebruikt, neem dan contact op met uw arts.
- praat met uw arts over de risico's en voordelen van het gebruik van rivaroxaban als u 75 jaar of ouder bent.
- als u een operatie ondergaat, waaronder een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u rivaroxaban gebruikt. Uw arts kan u vertellen om te stoppen met het gebruik van rivaroxaban vóór de operatie of procedure. Uw arts zal u vertellen wanneer u na uw operatie weer moet beginnen met het innemen van rivaroxaban.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Volwassenen:

- Als u eenmaal daags rivaroxaban inneemt, neem dan de vergeten dosis in zodra u eraan denkt op die dag. Hervat uw normale doseringsschema de volgende dag.
- Als u rivaroxaban tweemaal per dag inneemt voor de behandeling van een DVT of PE, neem dan de vergeten dosis in zodra u het zich herinnert op die dag. U mag 2 doses tegelijk innemen om de vergeten dosis in te halen. Hervat uw normale doseringsschema de volgende dag.

- Als u CAD of PAD heeft en tweemaal daags rivaroxaban gebruikt om het risico op DVT en PE te verminderen en een dosis overslaat, ga dan gewoon door met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Zuigelingen en kinderen:

- Als u eenmaal daags rivaroxaban inneemt, neem dan de vergeten dosis in zodra u eraan denkt op die dag. Hervat uw normale doseringsschema de volgende dag. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
- Als u rivaroxaban tweemaal per dag inneemt, neem dan de vergeten ochtenddosis in zodra u eraan denkt op die dag. U mag 's avonds 2 doses tegelijk innemen om de vergeten ochtenddosis in te halen. Hervat uw normale doseringsschema de volgende dag
- Als u rivaroxaban driemaal daags inneemt en een dosis overslaat, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Rivaroxaban kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

- spierspasmen
- pijn in armen of benen (bij kinderen)
- braken (bij kinderen)
- buikpijn
- hoesten (bij kinderen)
- uitslag (bij kinderen)

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart of de symptomen die worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

- bloederige, zwarte of teerachtige ontlasting
- roze of bruine urine
- bloed ophoesten of overgeven of materiaal dat op koffiedik lijkt
- frequente bloedneuzen
- bloedend tandvlees
- hevig menstrueel bloedverlies
- zwakheid
- vermoeidheid
- hoofdpijn
- duizeligheid of flauwvallen
- wazig zien
- pijn in arm of been

- uitslag
- jeuk
- moeite met ademen of slikken
- netelroos
- pijn of zwelling op wondplaatsen

Rivaroxaban voorkomt dat bloed normaal stolt, dus het kan langer duren dan normaal voordat u stopt met bloeden als u een snijwond of een verwonding heeft. Dit medicijn kan er ook voor zorgen dat u gemakkelijker blauwe plekken krijgt of bloedt. Bel onmiddellijk uw arts als bloedingen of blauwe plekken ongebruikelijk zijn.

Rivaroxaban kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) of telefonisch (1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse pilopassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op: <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

- ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken
- bloederige, zwarte of teerachtige ontlasting

- bloed in de urine
- bloed ophoesten of overgeven of materiaal dat op koffiedik lijkt

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts kan bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie van uw lichaam op rivaroxaban te controleren.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Uw recept is waarschijnlijk niet navulbaar.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige (zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

- Xarelto®

Laatst herzien - 15/03/2022

[Leer hoe u deze pagina kunt citeren](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022