Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

Bu sayfanın URL'si: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699023.html

rosiglitazon

(roe si gli' ta zone) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Rosiglitazon ve diyabet için diğer benzer ilaçlar, konjestif kalp yetmezliğine (kalbin vücudun diğer bölgelerine yeterince kan pompalayamaması durumu) neden olabilir veya kötüleşebilir. Rosiglitazon kullanmaya başlamadan önce, konjestif kalp yetmezliğiniz varsa veya daha önce olduysa, özellikle kalp yetmezliğiniz aktivitenizi sınırlandıracak kadar şiddetliyse ve sadece dinlenirken rahatsanız veya hastanede kalmanız gerekiyorsa doktorunuza söyleyiniz. sandalye veya yatak. Ayrıca, bir kalp kusuru ile dünyaya gelip gelmediğinizi ve kollarınızda, ellerinizde, ayaklarınızda, ayak bileklerinizde veya alt bacaklarınızda şişme olup olmadığını da doktorunuza söyleyiniz; kalp hastalığı, yüksek tansiyon; koroner arter hastalığı (kalbe giden kan damarlarının daralması); kalp krizi; düzensiz kalp atışı; veya uyku apnesi.

Konjestif kalp yetmezliği geliştirirseniz, belirli semptomlar yaşayabilirsiniz. Özellikle rosiglitazon kullanmaya ilk başladığınızda veya dozunuz artırıldıktan sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz: kısa sürede aşırı kilo alımı; nefes darlığı; kolların, ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi; midede şişlik veya ağrı; gece boyunca nefes darlığı uyanmak; yatarken nefes alabilmek için başınızın altında ekstra yastıklarla uyuma ihtiyacı; sık kuru öksürük veya hırıltı; net düşünme veya kafa karışıklığı; hızlı veya hızlı kalp atışı; ayrıca yürüyemez veya egzersiz yapamaz; veya artan yorgunluk.

Doktorunuz veya eczacınız, rosiglitazon ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her doldurduğunuzda size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Ayrıca Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) web sitesini de ziyaret edebilirsiniz (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) veya İlaç Rehberini edinmek için üreticinin web sitesini ziyaret edin.

Rosiglitazon almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Rosiglitazon, bir diyet ve egzersiz programıyla ve bazen tip 2 diyabeti (vücudun normal olarak insülin kullanmadığı ve

bu nedenle kandaki şeker miktarını kontrol edemez). Rosiglitazon, tiazolidindionlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücudun kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olan doğal bir madde olan insüline duyarlılığını artırarak çalışır. Rosiglitazon, tip 1 diyabet (vücudun insülin üretmediği ve bu nedenle kandaki şeker miktarını kontrol edemediği durum) veya diyabetik ketoasidoz (yüksek kan şekeri tedavi edilmezse ortaya çıkabilecek ciddi bir durum) tedavisinde kullanılmaz.

Zamanla, diyabet ve yüksek kan şekeri olan kişilerde kalp hastalığı, felç, böbrek sorunları, sinir hasarı ve göz sorunları gibi ciddi veya yaşamı tehdit eden komplikasyonlar gelişebilir. İlaç(lar) almak, yaşam tarzı değişiklikleri yapmak (örneğin, diyet, egzersiz, sigarayı bırakmak) ve kan şekerinizi düzenli olarak kontrol etmek, diyabetinizi yönetmenize ve sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir. Bu terapi ayrıca kalp krizi, felç veya böbrek yetmezliği, sinir hasarı (uyuşma, soğuk bacaklar veya ayaklar; erkeklerde ve kadınlarda cinsel yeteneğin azalması), değişiklikler dahil göz sorunları gibi diyabetle ilgili diğer komplikasyonlara yakalanma şansınızı azaltabilir. veya görme kaybı veya diş eti hastalığı. Doktorunuz ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarınız, diyabetinizi yönetmenin en iyi yolu hakkında sizinle konuşacaktır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Rosiglitazon ağızdan almak için bir tablet olarak gelir. Genellikle günde bir veya iki kez yemekle birlikte veya yemeksiz alınır. Rosiglitazonu her gün yaklaşık aynı saatte alınız. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Rosiglitazon'u aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Doktorunuz, vücudunuzun ilaca verdiği cevaba göre 8-12 hafta sonra rosiglitazon dozunuzu artırabilir.

Rosiglitazon, tip 2 diyabetin kontrolüne yardımcı olur ancak tedavi etmez. Kan şekerinizin düşmesi 2 hafta, rosiglitazondan tam olarak yararlanmanız 2-3 ay veya daha uzun sürebilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile rosiglitazon almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan rosiglitazon kullanmayı bırakmayınız.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Rosiglitazon almadan önce,

- rosiglitazona, diğer ilaçlara veya rosiglitazon tabletlerindeki herhangi bir bileşene alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya İlaç Kılavuzuna bakın.
- aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: gemfibrozil (Lopid); diyabet için insülin veya diğer ilaçlar; yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, kalp yetmezliği veya kalp krizi veya felç önleme ilaçları; ve rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

- ÖNEMLİ UYARI bölümünde belirtilen durumlardan herhangi biri veya maküler ödem (göz arkasının şişmesi) gibi diyabetik göz hastalığınız varsa veya olduysa doktorunuza söyleyiniz; veya karaciğer hastalığı. Ayrıca, daha önce troglitazon (Rezulin, artık Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmamaktadır) alıp almadığınızı, özellikle de yan etkiler yaşadığınız için almayı bıraktıysanız, doktorunuza söyleyiniz.
- Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Rosiglitazon kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.
- Henüz menopoz yaşamamışsanız (yaşam değişikliği; aylık adet dönemlerinin sonu) düzenli adet görmemiş olsanız veya adet görmenizi engelleyen bir durumunuz olsa bile rosiglitazonun hamile kalma şansınızı artırabileceğini bilmelisiniz. yumurtlama (yumurtalıklardan bir yumurta bırakma). Sizin için işe yarayacak doğum kontrol yöntemleri hakkında doktorunuzla konuşun.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz veya diyetisyeniniz tarafından yapılan tüm egzersiz ve diyet tavsiyelerine uyduğunuzdan emin olun. Sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve gerekirse kilo vermek önemlidir. Bu, diyabetinizi kontrol etmenize ve rosiglitazonun daha etkili çalışmasına yardımcı olacaktır.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı geldiyse, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Bu ilaç kan şekerinizde değişikliklere neden olabilir. Düşük ve yüksek kan şekeri semptomlarını ve bu semptomlara sahipseniz ne yapmanız gerektiğini bilmelisiniz.

Rosiglitazon yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

- baş ağrısı
- burun akıntısı ve diğer soğuk algınlığı semptomları
- boğaz ağrısı
- sırt ağrısı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenenlerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, derhal doktorunuzu arayın:

- çene, kol, sırt, boyun veya midede ağrı
- göğüs ağrısı
- soğuk ter atmak
- sersemlik
- iştah kaybı
- mide bulantısı
- kusma

- karın ağrısı
- Koyu idrar
- cilt veya gözlerin sararması
- görme değişiklikleri
- görme kaybı
- soluk ten
- baş dönmesi
- gözlerin, yüzün, dudakların, dilin veya boğazın şişmesi
- ses kısıklığı
- yutma veya nefes almada zorluk
- kurdeşen
- kaşıntı
- ateş
- kabarcıklar

Rosiglitazon başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorun yaşarsanız doktorunuzu arayın.

Rosiglitazon kullanmak, genellikle üst kollarda, ellerde veya ayaklarda kırık yaşama riskinizi artırabilir. Bu ilacı almanın riskleri ve tedaviniz sırasında kemiklerinizi sağlıklı tutmanın yolları hakkında doktorunuzla konuşun.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz. (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla (1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve ışıktan, aşırı ısıdan ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri alma programıdır. eczacınızla konuşun

veya topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi almak için yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuzla, göz doktorunuzla ve laboratuvarla birlikte saklayın. Doktorunuz muhtemelen vücudunuzun rosiglitazona tepkisini kontrol etmek için düzenli göz muayeneleri ve bazı laboratuvar testleri isteyecektir. Rosiglitazon'a cevabınızı belirlemek için kan şekeriniz ve glikosile edilmiş hemoglobininiz düzenli olarak kontrol edilmelidir. Doktorunuz ayrıca evde kan şekeri seviyenizi ölçerek rosiglitazona yanıtınızı nasıl kontrol edeceğinizi de söyleyebilir. Bu yönergeleri dikkatlice izleyin.

Acil bir durumda uygun tedaviyi aldığınızdan emin olmak için her zaman bir diyabetik kimlik bileziği takmalısınız.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

rand isimleri

- Avandia®

kombinasyon ürünlerinin rand isimleri

- Avandamet®(Metformin, Rosiglitazon içerir)
- avandaryl®(Glimepirid, Rosiglitazon içerir)

Son Revize - 01/15/2018

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi

AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma

ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022