Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL van deze pagina: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699023.html

Rosiglitazon

uitgesproken als (roe si gli' ta zone)

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Rosiglitazon en andere soortgelijke medicijnen voor diabetes kunnen congestief hartfalen veroorzaken of verergeren (aandoening waarbij het hart niet genoeg bloed naar de andere delen van het lichaam kan pompen). Vertel uw arts voordat u begint met het innemen van rosiglitazon als u congestief hartfalen heeft of ooit heeft gehad, vooral als uw hartfalen zo ernstig is dat u uw activiteit moet beperken en alleen comfortabel voelt als u in rust bent of als u in een rustige omgeving moet blijven. stoel of bed. Vertel het uw arts ook als u geboren bent met een hartafwijking en als u zwelling van de armen, handen, voeten, enkels of onderbenen heeft of ooit heeft gehad; hartziekte, hoge bloeddruk; coronaire hartziekte (vernauwing van de bloedvaten die naar het hart leiden); een hartaanval; een onregelmatige hartslag; of slaapapneu.

Als u congestief hartfalen krijgt, kunt u bepaalde symptomen krijgen. Vertel het uw arts onmiddellijk als u een van de volgende symptomen heeft, vooral wanneer u voor het eerst begint met het innemen van rosiglitazon of nadat uw dosis is verhoogd: grote gewichtstoename in korte tijd; kortademigheid; zwelling van de armen, handen, voeten, enkels of onderbenen; zwelling of pijn in de maag; 's nachts kortademig wakker worden; met extra kussens onder uw hoofd moeten slapen om liggend te kunnen ademen; frequente droge hoest of piepende ademhaling; moeite met helder denken of verwarring; snelle of snelle hartslag; niet in staat om te lopen of te sporten; of verhoogde vermoeidheid.

Uw arts of apotheker zal u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven wanneer u begint met de behandeling met rosiglitazon en elke keer dat u uw recept bijvult. Lees de informatie aandachtig door en vraag uw arts of apotheker om advies als u vragen heeft. U kunt ook de website van de Food and Drug Administration (FDA) bezoeken (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) of de website van de fabrikant om de Medicatiegids te verkrijgen.

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van rosiglitazon.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Rosiglitazon wordt gebruikt in combinatie met een dieet- en trainingsprogramma en soms met een of meer andere medicijnen voor de behandeling van diabetes type 2 (aandoening waarbij het lichaam normaal geen insuline gebruikt en

daarom de hoeveelheid suiker in het bloed niet onder controle). Rosiglitazon zit in een klasse van medicijnen die thiazolidinedionen worden genoemd. Het werkt door de gevoeligheid van het lichaam voor insuline te verhogen, een natuurlijke stof die helpt de bloedsuikerspiegel onder controle te houden. Rosiglitazon wordt niet gebruikt voor de behandeling van type 1-diabetes (aandoening waarbij het lichaam geen insuline aanmaakt en daarom de hoeveelheid suiker in het bloed niet onder controle kan houden) of diabetische ketoacidose (een ernstige aandoening die kan optreden als een hoge bloedsuikerspiegel niet wordt behandeld).

Na verloop van tijd kunnen mensen met diabetes en een hoge bloedsuikerspiegel ernstige of levensbedreigende complicaties krijgen, waaronder hartaandoeningen, beroertes, nierproblemen, zenuwbeschadiging en oogproblemen. Het nemen van medicijnen, het aanbrengen van veranderingen in levensstijl (bijv. dieet, lichaamsbeweging, stoppen met roken) en het regelmatig controleren van uw bloedsuikerspiegel kan helpen om uw diabetes onder controle te houden en uw gezondheid te verbeteren. Deze therapie kan ook uw kansen op een hartaanval, beroerte of andere diabetesgerelateerde complicaties verminderen, zoals nierfalen, zenuwbeschadiging (verdoofd gevoel, koude benen of voeten; verminderd seksueel vermogen bij mannen en vrouwen), oogproblemen, inclusief veranderingen of verlies van gezichtsvermogen, of tandvleesaandoeningen. Uw arts en andere zorgverleners zullen met u praten over de beste manier om uw diabetes onder controle te houden.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Rosiglitazon wordt geleverd als een tablet om via de mond in te nemen. Het wordt meestal één of twee keer per dag ingenomen, met of zonder maaltijden. Neem rosiglitazon elke dag op ongeveer dezelfde tijd(en) in. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem rosiglitazon precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Uw arts kan uw dosis rosiglitazon na 8-12 weken verhogen, op basis van de reactie van uw lichaam op de medicatie.

Rosiglitazon helpt diabetes type 2 onder controle te houden, maar geneest het niet. Het kan 2 weken duren voordat uw bloedsuikerspiegel daalt, en 2-3 maanden of langer voordat u het volledige effect van rosiglitazon voelt. Blijf rosiglitazon innemen, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van rosiglitazon zonder met uw arts te overleggen.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u rosiglitazon inneemt,

- vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor rosiglitazon, voor andere medicijnen of voor één van de bestanddelen van rosiglitazon-tabletten. Vraag uw apotheker of raadpleeg de Medicatiegids voor een lijst van de ingrediënten.
- vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: gemfibrozil (Lopid); insuline of andere medicijnen voor diabetes; medicijnen voor hoge bloeddruk, hoog cholesterol, hartfalen of preventie van een hartaanval of beroerte; en rifampicine (Rifadin, Rimactane, in Rifamate). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

- vertel het uw arts als u een van de in de rubriek BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN genoemde aandoeningen heeft of ooit heeft gehad, of een diabetische oogziekte zoals macula-oedeem (zwelling van de achterkant van het oog); of leverziekte. Vertel het uw arts ook als u ooit troglitazon (Rezulin, niet langer verkrijgbaar in de Verenigde Staten) heeft gebruikt, vooral als u ermee bent gestopt omdat u bijwerkingen kreeg.
- vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u rosiglitazon gebruikt, neem dan contact op met uw arts.
- als u nog geen menopauze heeft gehad (verandering van leven; einde van de maandelijkse menstruatie), moet u weten dat rosiglitazon de kans op zwangerschap kan vergroten, zelfs als u geen regelmatige menstruatie heeft of als u een aandoening heeft waardoor u niet ovuleren (het vrijgeven van een eicel uit de eierstokken). Praat met uw arts over anticonceptiemethoden die voor u werken.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Zorg ervoor dat u alle aanbevelingen voor lichaamsbeweging en voeding van uw arts of diëtist opvolgt. Het is belangrijk om gezond te eten, regelmatig te sporten en indien nodig af te vallen. Dit zal helpen om uw diabetes onder controle te houden en rosiglitazon effectiever te laten werken

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Dit medicijn kan veranderingen in uw bloedsuikerspiegel veroorzaken. U moet weten wat de symptomen zijn van een lage en hoge bloedsuikerspiegel en wat u moet doen als u deze symptomen heeft.

Rosiglitazon kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

- hoofdpijn
- loopneus en andere verkoudheidsverschijnselen
- keelpijn
- rugpijn

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van de volgende symptomen ervaart, of de symptomen die worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

- pijn in de kaak, arm, rug, nek of maag
- pijn op de borst
- uitbrekend in het koude zweet
- duizeligheid
- verlies van eetlust
- misselijkheid
- braken

- buikpijn
- donkere urine
- geel worden van de huid of ogen
- veranderingen in het gezichtsvermogen
- zicht verlies
- bleke huid
- duizeligheid
- zwelling van de ogen, het gezicht, de lippen, de tong of de keel
- heesheid
- moeite met slikken of ademen
- netelroos
- jeuk
- koorts
- blaren

Rosiglitazon kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen ervaart tijdens het gebruik van dit medicijn.

Het gebruik van rosiglitazon kan het risico verhogen dat u een fractuur krijgt, meestal in de bovenarmen, handen of voeten. Praat met uw arts over het risico van het gebruik van dit medicijn en over manieren om uw botten gezond te houden tijdens uw behandeling.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch (1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van licht, overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker

of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling voor meer informatie over terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op: https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts, uw oogarts en het laboratorium. Uw arts zal waarschijnlijk regelmatig oogonderzoeken en bepaalde laboratoriumtests laten uitvoeren om de reactie van uw lichaam op rosiglitazon te controleren. Uw bloedsuikerspiegel en geglycosyleerde hemoglobine moeten regelmatig worden gecontroleerd om uw reactie op rosiglitazon te bepalen. Uw arts kan u ook vertellen hoe u uw reactie op rosiglitazon kunt controleren door uw bloedsuikerspiegel thuis te meten. Volg deze aanwijzingen zorgvuldig.

U moet altijd een identificatiearmband voor diabetes dragen om er zeker van te zijn dat u in geval van nood de juiste behandeling krijgt.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige (zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

- Avandia®

randnamen van combinatieproducten

- Avandamet®(bevat Metformine, Rosiglitazon)
- Avandaryl®(bevat glimepiride, rosiglitazon)

Laatst herzien - 15/01/2018

Leer hoe u deze pagina kunt citeren

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer

AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022