Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699023.html

Rosiglitazone

prononcé comme (roe si gli' ta zone)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

La rosiglitazone et d'autres médicaments similaires pour le diabète peuvent provoquer ou aggraver une insuffisance cardiaque congestive (état dans lequel le cœur est incapable de pomper suffisamment de sang vers les autres parties du corps). Avant de commencer à prendre la rosiglitazone, informez votre médecin si vous souffrez ou avez déjà souffert d'insuffisance cardiaque congestive, en particulier si votre insuffisance cardiaque est si grave que vous devez limiter votre activité et que vous ne vous sentez à l'aise que lorsque vous êtes au repos ou que vous devez rester dans un fauteuil ou lit. Informez également votre médecin si vous êtes né avec une malformation cardiaque et si vous avez ou avez déjà eu un gonflement des bras, des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes ; maladie cardiaque, hypertension artérielle; maladie coronarienne (rétrécissement des vaisseaux sanguins qui mènent au cœur); une crise cardiaque; un rythme cardiaque irrégulier; ou l'apnée du sommeil.

Si vous développez une insuffisance cardiaque congestive, vous pouvez ressentir certains symptômes. Informez immédiatement votre médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants, en particulier lorsque vous commencez à prendre de la rosiglitazone ou après une augmentation de votre dose : prise de poids importante en peu de temps ; essoufflement; gonflement des bras, des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes; gonflement ou douleur à l'estomac; se réveiller essoufflé pendant la nuit; avoir besoin de dormir avec des oreillers supplémentaires sous la tête pour pouvoir respirer en position couchée ; toux sèche fréquente ou respiration sifflante; difficulté à penser clairement ou confusion; rythme cardiaque rapide ou rapide ; incapable de marcher ou de faire de l'exercice; ou une fatigue accrue.

Votre médecin ou votre pharmacien vous remettra la fiche d'information du fabricant (Guide des médicaments) au début du traitement par la rosiglitazone et à chaque renouvellement de votre ordonnance. Lisez attentivement les informations et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez des questions. Vous pouvez également visiter le site Web de la Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) ou le site Web du fabricant pour obtenir le Guide des médicaments.

Discutez avec votre médecin des risques liés à la prise de rosiglitazone.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

La rosiglitazone est utilisée avec un régime alimentaire et un programme d'exercice et parfois avec un ou plusieurs autres médicaments pour traiter le diabète de type 2 (état dans lequel le corps n'utilise pas l'insuline normalement et

ne peut donc pas contrôler la quantité de sucre dans le sang). La rosiglitazone appartient à une classe de médicaments appelés thiazolidinediones. Il agit en augmentant la sensibilité du corps à l'insuline, une substance naturelle qui aide à contrôler la glycémie. La rosiglitazone n'est pas utilisée pour traiter le diabète de type 1 (affection dans laquelle l'organisme ne produit pas d'insuline et ne peut donc pas contrôler la quantité de sucre dans le sang) ou l'acidocétose diabétique (une affection grave qui peut survenir si l'hyperglycémie n'est pas traitée).

Au fil du temps, les personnes atteintes de diabète et d'hyperglycémie peuvent développer des complications graves ou potentiellement mortelles, notamment des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des problèmes rénaux, des lésions nerveuses et des problèmes oculaires. Prendre des médicaments, apporter des changements à votre mode de vie (par exemple, régime alimentaire, exercice, arrêter de fumer) et vérifier régulièrement votre glycémie peuvent aider à gérer votre diabète et à améliorer votre santé. Cette thérapie peut également diminuer vos risques d'avoir une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou d'autres complications liées au diabète telles qu'une insuffisance rénale, des lésions nerveuses (engourdissement, jambes ou pieds froids ; diminution de la capacité sexuelle chez les hommes et les femmes), des problèmes oculaires, y compris des changements ou perte de vision, ou maladie des gencives. Votre médecin et d'autres professionnels de la santé vous parleront de la meilleure façon de gérer votre diabète.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

La rosiglitazone se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale. Il est généralement pris une ou deux fois par jour avec ou sans repas. Prenez la rosiglitazone à peu près à la même heure chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez la rosiglitazone exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Votre médecin peut augmenter votre dose de rosiglitazone après 8 à 12 semaines, en fonction de la réponse de votre corps au médicament.

La rosiglitazone aide à contrôler le diabète de type 2 mais ne le guérit pas. Cela peut prendre 2 semaines pour que votre glycémie diminue et 2 à 3 mois ou plus pour que vous ressentiez tous les bienfaits de la rosiglitazone. Continuez à prendre de la rosiglitazone même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre la rosiglitazone sans en parler à votre médecin.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre la rosiglitazone,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la rosiglitazone, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients contenus dans les comprimés de rosiglitazone. Demandez à votre pharmacien ou consultez le Guide des médicaments pour une liste des ingrédients.
- informez votre médecin et votre pharmacien des médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : gemfibrozil (Lopid); l'insuline ou d'autres médicaments pour le diabète ; les médicaments contre l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, l'insuffisance cardiaque ou la prévention des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux ; et la rifampicine (Rifadin, Rimactane, dans Rifamate). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.

- informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu l'une des conditions mentionnées dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT ou une maladie oculaire diabétique telle qu'un œdème maculaire (gonflement de l'arrière de l'œil); ou une maladie du foie. Informez également votre médecin si vous avez déjà pris de la troglitazone (Rezulin, qui n'est plus disponible aux États-Unis), surtout si vous avez arrêté de le prendre parce que vous avez ressenti des effets secondaires.
- informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez de la rosiglitazone, appelez votre médecin.
- si vous n'avez pas encore connu de ménopause (changement de vie ; fin des menstruations mensuelles), vous devez savoir que la rosiglitazone peut augmenter le risque de tomber enceinte même si vous n'avez pas de menstruations régulières ou si vous souffrez d'une affection qui vous empêche de ovulation (libération d'un ovule par les ovaires). Discutez avec votre médecin des méthodes de contraception qui fonctionneront pour vous.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Assurez-vous de suivre toutes les recommandations d'exercice et diététiques faites par votre médecin ou votre diététiste. Il est important d'avoir une alimentation saine, de faire de l'exercice régulièrement et de perdre du poids si nécessaire. Cela aidera à contrôler votre diabète et aidera la rosiglitazone à agir plus efficacement

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est temps pour la prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre programme de dosage régulier. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Ce médicament peut entraîner des modifications de votre glycémie. Vous devez connaître les symptômes de l'hypoglycémie et de l'hyperglycémie et savoir quoi faire si vous présentez ces symptômes.

La rosiglitazone peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

- mal de crâne
- nez qui coule et autres symptômes du rhume
- mal de gorge
- mal au dos

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants ou ceux énumérés dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT, appelez immédiatement votre médecin :

- douleur à la mâchoire, au bras, au dos, au cou ou à l'estomac
- douleur thoracique
- avoir des sueurs froides
- étourdissement
- perte d'appétit
- nausée
- vomissement

- Douleur d'estomac
- urine foncée
- jaunissement de la peau ou des yeux
- changements de vision
- perte de vision
- peau pâle
- vertiges
- gonflement des yeux, du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge
- enrouement
- difficulté à avaler ou à respirer
- urticaire
- démangeaison
- fièvre
- cloques

La rosiglitazone peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous rencontrez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez ce médicament.

La prise de rosiglitazone peut augmenter le risque de fracture, généralement au niveau des bras, des mains ou des pieds. Discutez avec votre médecin des risques liés à la prise de ce médicament et des moyens de garder vos os en bonne santé pendant votre traitement.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA). (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température ambiante et à l'abri de la lumière, de la chaleur excessive et de l'humidité (pas dans la salle de bain).

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit qui est haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez-en à votre pharmacien

ou contactez votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Respectez tous les rendez-vous avec votre médecin, votre ophtalmologiste et le laboratoire. Votre médecin prescrira probablement des examens oculaires réguliers et certains tests de laboratoire pour vérifier la réponse de votre corps à la rosiglitazone. Votre glycémie et votre hémoglobine glycosylée doivent être contrôlées régulièrement pour déterminer votre réponse à la rosiglitazone. Votre médecin peut également vous dire comment vérifier votre réponse à la rosiglitazone en mesurant votre glycémie à domicile. Suivez attentivement ces instructions.

Vous devez toujours porter un bracelet d'identification du diabète pour être sûr d'obtenir un traitement approprié en cas d'urgence.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

- Avandia®

noms et noms de produits combinés

- Avandamet®(contenant Metformine, Rosiglitazone)
- Avandaryl®(contenant du glimépiride, de la rosiglitazone)

Dernière révision - 15/01/2018

Apprenez à citer cette page

Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.

AHFS®Renseignements pour les patients sur les médicamentsMC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisé par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022