Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

MedlinePlus
Trusted Health Information for You

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603033.html

Rosuvastatină

pronunțat ca (roe soo'' va stat' in)

Înștiințare:

[Postat pe 20.07.2021]

PUBLIC: Pacient, profesionist în sănătate, ginecolog, cardiologie, endocrinologie, farmacie

PROBLEMA:FDA solicită revizuiri ale informațiilor despre utilizarea în timpul sarcinii în informațiile de prescriere a întregii clase de medicamente cu statine. Aceste modificări includ eliminarea contraindicației împotriva utilizării acestor medicamente la toate pacientele gravide. O contraindicație este cel mai puternic avertisment al FDA și este adăugată numai atunci când un medicament nu trebuie utilizat, deoarece riscul depășește în mod clar orice beneficiu posibil. Deoarece beneficiile statinelor pot include prevenirea evenimentelor grave sau potențial fatale la un grup mic de paciente gravide cu risc foarte mare, contraindicarea acestor medicamente la toate femeile gravide nu este adecvată.

FDA se așteaptă că eliminarea contraindicației va permite profesioniștilor din domeniul sănătății și pacienților să ia decizii individuale cu privire la beneficii și riscuri, în special pentru cei cu risc foarte mare de atac de cord sau accident vascular cerebral. Aceasta include pacienții cu hipercolesterolemie familială homozigotă și cei care au avut anterior un atac de cord sau un accident vascular cerebral.

FUNDAL: Statinele sunt o clasă de medicamente eliberate pe bază de rețetă care au fost folosite de zeci de ani pentru a scădea colesterolul lipoproteinelor cu densitate joasă (LDL-C sau „rău”) din sânge. Medicamentele din clasa statinelor includ atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pitavastatina, pravastatina, rosuvastatina și simvastatina.

RECOMANDARI:

- **Pacienți:**Pacienții care iau statine trebuie să-și informeze personalul medical dacă rămân însărcinate sau suspectează că sunt însărcinate. Medicamentul dumneavoastră vă va putea sfătui dacă trebuie să încetați să luați medicamentul în timpul sarcinii și dacă vă puteți opri temporar statina în timpul alăptării. Pacienții cu risc crescut de infarct miocardic sau accident vascular cerebral care necesită statine după naștere nu trebuie să alăpteze și ar trebui să utilizeze alternative, cum ar fi formulele pentru sugari.

- **Profesioniștii din domeniul sănătății**: Profesioniștii din domeniul sănătății ar trebui să întrerupă terapia cu statine la majoritatea pacientelor gravide sau pot lua în considerare nevoile terapeutice continue ale individului

pacienta, in special cele cu risc foarte mare de evenimente cardiovasculare in timpul sarcinii. Din cauza naturii cronice a bolilor cardiovasculare, tratamentul hiperlipidemiei nu este, în general, necesar în timpul sarcinii. Discutați cu pacienții dacă pot întrerupe temporar tratamentul cu statine în timpul alăptării. Avertizați-i pe cei care necesită o statină din cauza riscului cardiovascular că nu este recomandată alăptarea deoarece medicamentul poate trece în laptele matern

FDA speră că limbajul revizuit din informațiile de prescriere va ajuta să-i liniștească pe profesioniștii din domeniul sănătății că statinele pot fi prescrise în siguranță la pacientele care pot rămâne însărcinate și să le ajute să liniștească pacienții cu expunere neintenționată la statine la începutul sarcinii sau înainte ca sarcina să fie recunoscut că medicamentul este puțin probabil să dăuneze copilului nenăscut.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul FDA la: http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation]șihttp://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety].

de ce este prescris acest medicament?

Rosuvastatina este utilizată împreună cu dietă, pierderea în greutate și exerciții fizice pentru a reduce riscul de atac de cord și accident vascular cerebral și pentru a scădea șansele ca o intervenție chirurgicală pe inimă să fie necesară la persoanele care au boli de inimă sau care prezintă riscul de a dezvolta boli de inimă. Rosuvastatina este, de asemenea, utilizată pentru a scădea cantitatea de colesterol, cum ar fi colesterolul cu lipoproteine cu densitate joasă (LDL) ("colesterol rău") și trigliceridele din sânge și pentru a crește cantitatea de colesterol cu lipoproteine cu densitate mare (HDL) ("colesterol bun") în sânge. Rosuvastatina poate fi, de asemenea, utilizată împreună cu dieta pentru a scădea cantitatea de colesterol și alte substanțe grase din sânge la copiii și adolescenții cu vârsta cuprinsă între 8 și 17 ani care au hipercolesterolemie heterozigotă familială (o afecțiune moștenită în care colesterolul nu poate fi eliminat în mod normal din organism).). Rosuvastatin este utilizat împreună cu dieta și singur sau în combinație cu alte medicamente, pentru a scădea cantitatea de colesterol și alte substanțe grase din sânge la adulți și copii și adolescenți cu vârsta între 7 și 17 ani care au hipercolesterolemie homozigotă familială (o afecțiune moștenită). în care colesterolul nu poate fi eliminat în mod normal din organism). Rosuvastatina face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori ai HMG-CoA reductazei (statine). Funcționează prin încetinirea producției de colesterol în organism pentru a scădea cantitatea de colesterol care se poate acumula pe pereții arterelor și blochează fluxul de sânge către inimă, creier și alte părți ale corpului. pentru a scădea cantitatea de colesterol și alte substanțe grase din sânge la adulți și copii și adolescenți cu vârsta între 7 și 17 ani care au hipercolesterolemie homozigotă familială (o afecțiune moștenită în care colesterolul nu poate fi eliminat în mod normal din organism). Rosuvastatina face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori ai HMG-CoA reductazei (statine). Funcționează prin încetinirea producției de colesterol în organism pentru a scădea cantitatea de colesterol care se poate acumula pe pereții arterelor și blochează fluxul de sânge către inimă, creier și alte părți ale corpului. pentru a scădea cantitatea de colesterol și alte substanțe grase din sânge la adulți și copii și adolescenți cu vârsta între 7 și 17 ani care au hipercolesterolemie homozigotă familială (o afecțiune moștenită în care colesterolul nu poate fi eliminat în mod normal din organism). Rosuvastatina face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori ai HMG-CoA reductazei (statine). Funcționează prin încetinirea producției de colesterol în organism pentru a scădea cantitatea de colesterol care se poate acumula pe pereții arterelor și blochează fluxul de sânge către inimă, creier și alte părți ale corpului.

Acumularea de colesterol și grăsimi de-a lungul pereților arterelor (un proces cunoscut sub numele de ateroscleroză) scade fluxul sanguin și, prin urmare, aportul de oxigen către inima, creierul și alte părți ale corpului. S-a demonstrat că scăderea nivelului de colesterol și grăsimi din sânge cu rosuvastatină previne bolile de inimă, angina (durerile în piept), accidentele vasculare și atacurile de cord.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Rosuvastatina se prezintă sub formă de tablete (Crestor) pentru administrare pe cale orală. Rosuvastatina vine, de asemenea, sub formă de capsulă (Ezallor) pentru a se lua pe gură sau pentru a se deschide, se amestecă cu apă și se administrează printr-un tub de hrănire. De obicei, se ia o dată pe zi, cu sau fără alimente. Luați rosuvastatină aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmează

instrucțiunile de pe eticheta cu rețetă și cereți-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați rosuvastatină exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă va începe probabil să luați o doză mică de rosuvastatină și vă va crește treptat doza, nu mai mult de o dată la 2 până la 4 săptămâni.

Înghițiți capsulele (Ezallor) întregi; nu le mesteca sau zdrobi. Dacă nu puteți înghiți capsula, deschideți capsula și presărați cu grijă conținutul pe 1 linguriță de sos de mere. Înghițiți întregul amestec imediat, fără a mesteca. Nu păstrați amestecul de sos de mere pentru utilizare ulterioară.

Continuați să luați rosuvastatină chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați rosuvastatină fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua rosuvastatină,

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la rosuvastatină, la orice alte medicamente sau la oricare dintre ingredientele din comprimate sau capsule de rosuvastatină. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: anticoagulante („diluanți ai sângelui"), cum ar fi warfarina (Coumadin, Jantoven); colchicină (Colcrys); cimetidină (Tagamet); ciclosporină (Gengraf, Neoral, Sandimmune); darolutamidă (Nubeqa); eltrombopag (Promacta); ketoconazol (Nizoral); alte medicamente pentru colesterolul ridicat, cum ar fi fenofibrat (Tricor), gemfibrozil (Lopid) și niacină (Niaspan, Niacor); anumite medicamente pentru virusul hepatitei C (VHC), inclusiv dasabuvir luat cu ombitasvir, paritaprevir și ritonavir (Viekira Pak); glecaprevir administrat cu pibrentasvir (Mavyret), ledipasvir administrat cu sofosbuvir (Harvoni), simeprevir (nu mai este disponibil în SUA), sau sofosbuvir luat cu velpatasvir și/sau voxilaprevir (Epclusa, Vosevi); anumiți inhibitori de protează HIV, inclusiv atazanavir (Reyataz) administrați cu ritonavir (Norvir) și lopinavir și ritonavir (Kaletra); regorafenib (Stivarga); și spironolactonă (Aldactone). Multe alte medicamente pot interacționa, de asemenea, cu rosuvastatina, așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. așa că asigurați-vă că îi spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. așa că asigurați-vă că îi spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.
- dacă luați antiacide cu hidroxid de aluminiu și magneziu (Mylanta, Maalox), luați-le la cel puțin 2 ore după rosuvastatină.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți boală hepatică. Medicul dumneavoastră vă va comanda analize de laborator pentru a vedea cât de bine funcționează ficatul dumneavoastră, chiar dacă nu credeți că aveți boală hepatică. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați rosuvastatină dacă aveți boală hepatică sau dacă testele arată că puteți dezvolta o boală hepatică.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți asiatic, dacă beți mai mult de 2 băuturi alcoolice pe zi, dacă aveți 65 de ani sau mai mult, dacă ați avut vreodată boală hepatică sau dacă aveți sau ați avut vreodată convulsii, dureri musculare sau slăbiciune , tensiune arterială scăzută sau boli de rinichi sau tiroide.

- spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Nu trebuie să rămâneți gravidă în timp ce luați rosuvastatină. Discutați cu medicul dumneavoastră despre metodele contraceptive pe care le puteți utiliza în timpul tratamentului. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați rosuvastatină, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră. Rosuvastatina poate dăuna fătului.
- nu alăptați în timp ce luați rosuvastatină.
- dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați rosuvastatină. Dacă sunteți internat din cauza unei răni grave sau a unei infecții, spuneți medicului care vă tratează că luați rosuvastatină.
- întrebați medicul dumneavoastră despre utilizarea în siguranță a băuturilor alcoolice în timp ce luați rosuvastatină. Alcoolul poate crește riscul de reacții adverse grave.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Mâncați o dietă cu conținut scăzut de grăsimi și colesterol. Asigurați-vă că urmați toate recomandările de exerciții și diete făcute de medicul dumneavoastră sau de dieteticianul. De asemenea, puteți vizita site-ul web al Programului Național de Educație pentru Colesterol (NCEP) pentru informații suplimentare despre dieta lahttp://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf [http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf].

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă sunt mai puțin de 12 ore înainte de programarea următoarei doze, săriți peste doza omisă și continuați programul de dozare obișnuit. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Rosuvastatina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

- constipație
- dureri de stomac
- ameţeală
- dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit
- depresie
- dureri articulare
- durere de cap
- pierderea memoriei sau uitarea
- confuzie

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicul dumneavoastră sau solicitați ajutor medical de urgență:

- dureri musculare, sensibilitate sau slăbiciune (sau dacă aceste simptome continuă după oprirea rosuvastatinei)

- lipsa de energie
- febră
- dureri în piept
- urină închisă, roșiatică; scăderea cantității de urină; slăbiciune; si dureri musculare
- îngălbenirea pielii sau a ochilor
- urină de culoare închisă
- durere în partea dreaptă sus a abdomenului
- greaţă
- oboseală extremă
- slăbiciune
- sângerări sau vânătăi neobișnuite
- pierderea poftei de mâncare
- simptome asemănătoare gripei
- eczemă
- urticarie
- mâncărime
- dificultăți de respirație sau de înghițire
- umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, ochilor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare
- răguşeală

Rosuvastatina poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon (1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră poate comanda analize de laborator în timpul tratamentului, mai ales dacă dezvoltați simptome de afectare a ficatului.

Înainte de a efectua orice test de laborator, spuneți medicului dumneavoastră și personalului de laborator că luați rosuvastatină.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

- Crestor®
- Ezallor®

Ultima revizuire - 15.12.2020

Aflați cum să citați această pagină

Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciştilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022