Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

MedlinePlus
Trusted Health Information for You

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603033.html

Rosuvastatin

uttalas som (roe soo'' va stat' in)

Lägga märke till:

[Upplagt 2021-07-20]

PUBLIK: Patient, vårdpersonal, OBGYN, kardiologi, endokrinologi, apotek

PROBLEM:FDA begär ändringar av informationen om användning under graviditet i förskrivningsinformationen för hela klassen av statinläkemedel. Dessa förändringar inkluderar att ta bort kontraindikationen mot att använda dessa läkemedel hos alla gravida patienter. En kontraindikation är FDA:s starkaste varning och läggs endast till när ett läkemedel inte ska användas eftersom risken klart överväger alla möjliga fördelar. Eftersom fördelarna med statiner kan innefatta förebyggande av allvarliga eller potentiellt dödliga händelser hos en liten grupp gravida patienter med mycket hög risk, är det inte lämpligt att kontraindicera dessa läkemedel hos alla gravida kvinnor.

FDA förväntar sig att ta bort kontraindikationen kommer att göra det möjligt för vårdpersonal och patienter att fatta individuella beslut om fördelar och risker, särskilt för dem som löper mycket hög risk för hjärtinfarkt eller stroke. Detta inkluderar patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi och de som tidigare har haft en hjärtinfarkt eller stroke.

BAKGRUND: Statiner är en klass av receptbelagda läkemedel som har använts i årtionden för att sänka lågdensitetslipoprotein (LDL-C eller "dåligt") kolesterol i blodet. Läkemedel i statinklassen inkluderar atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin och simvastatin.

REKOMMENDATIONER:

- **Patienter:**Patienter som tar statiner bör meddela sin vårdpersonal om de blir gravida eller misstänker att de är gravida. Din hälso- och sjukvårdspersonal kommer att kunna ge råd om du ska sluta ta läkemedlet under graviditeten och om du kan avbryta ditt statin tillfälligt medan du ammar. Patienter som löper hög risk för hjärtinfarkt eller stroke som behöver statiner efter förlossningen bör inte amma och bör använda alternativ som modersmjölksersättning.

- **Hälso- och sjukvårdspersonal**: Hälso- och sjukvårdspersonal bör avbryta statinbehandling hos de flesta gravida patienter, eller så kan de överväga individens pågående terapeutiska behov

patienten, särskilt de som löper mycket hög risk för kardiovaskulära händelser under graviditeten. På grund av den kroniska kardiovaskulära sjukdomen är behandling av hyperlipidemi i allmänhet inte nödvändig under graviditet. Diskutera med patienter om de kan avbryta statiner tillfälligt under amning. Informera dem som behöver en statin på grund av sin kardiovaskulära risk att amning inte rekommenderas eftersom läkemedlet kan passera över i bröstmjölken

FDA hoppas att det reviderade språket i förskrivningsinformationen kommer att hjälpa till att försäkra sjukvårdspersonal om att statiner är säkra att förskriva till patienter som kan bli gravida, och hjälpa dem att lugna patienter med oavsiktlig exponering för statiner i tidig graviditet eller innan graviditeten upptäcks att läkemedlet är kommer sannolikt inte att skada det ofödda barnet.

För mer information besök FDA:s webbplats på: http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation]och http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety].

hur är denna medicin utskriven?

Rosuvastatin används tillsammans med diet, viktminskning och träning för att minska risken för hjärtinfarkt och stroke och för att minska risken för att hjärtoperationer kommer att behövas hos personer som har hjärtsjukdom eller som löper risk att utveckla hjärtsjukdom. Rosuvastatin används också för att minska mängden kolesterol såsom lågdensitetslipoprotein (LDL) kolesterol ("dåligt kolesterol") och triglycerider i blodet och för att öka mängden högdensitetslipoprotein (HDL) kolesterol ("bra kolesterol")) i blodet. Rosuvastatin kan också användas tillsammans med diet för att minska mängden kolesterol och andra fettämnen i blodet hos barn och tonåringar 8 till 17 år som har familjär heterozygot hyperkolesterolemi (ett ärftligt tillstånd där kolesterol inte kan avlägsnas från kroppen normalt). Rosuvastatin används tillsammans med diet, och ensamt eller i kombination med andra läkemedel, för att minska mängden kolesterol och andra fettämnen i blodet hos vuxna och barn och tonåringar i åldern 7 till 17 år som har familjär homozygot hyperkolesterolemi (en ärftlig sjukdom). där kolesterol inte kan avlägsnas från kroppen normalt). Rosuvastatin ingår i en klass av läkemedel som kallas HMG-CoA-reduktashämmare (statiner). Det fungerar genom att bromsa produktionen av kolesterol i kroppen för att minska mängden kolesterol som kan byggas upp på väggarna i artärerna och blockera blodflödet till hjärtat, hjärnan och andra delar av kroppen. för att minska mängden kolesterol och andra fettämnen i blodet hos vuxna och barn och tonåringar i åldern 7 till 17 år som har familjär homozygot hyperkolesterolemi (ett ärftligt tillstånd där kolesterol inte kan avlägsnas från kroppen normalt). Rosuvastatin är i en klass av läkemedel som kallas HMG-CoA-reduktashämmare (statiner). Det fungerar genom att bromsa produktionen av kolesterol i kroppen för att minska mängden kolesterol som kan byggas upp på väggarna i artärerna och blockera blodflödet till hjärtat, hjärnan och andra delar av kroppen. för att minska mängden kolesterol och andra fettämnen i blodet hos vuxna och barn och tonåringar i åldern 7 till 17 år som har familjär homozygot hyperkolesterolemi (ett ärftligt tillstånd där kolesterol inte kan avlägsnas från kroppen normalt). Rosuvastatin ingår i en klass av läkemedel som kallas HMG-CoA-reduktashämmare (statiner). Det fungerar genom att bromsa produktionen av kolesterol i kroppen för att minska mängden kolesterol som kan byggas upp på väggarna i artärerna och blockera blodflödet till hjärtat, hjärnan och andra delar av kroppen.

Ansamling av kolesterol och fetter längs väggarna i dina artärer (en process som kallas ateroskleros) minskar blodflödet och därmed syretillförseln till ditt hjärta, hjärna och andra delar av din kropp. Att sänka dina blodnivåer av kolesterol och fett med rosuvastatin har visat sig förebygga hjärtsjukdomar, angina (bröstsmärtor), stroke och hjärtattacker.

hur ska detta läkemedel användas?

Rosuvastatin kommer som en tablett (Crestor) att ta genom munnen. Rosuvastatin kommer också som en kapsel (Ezallor) att ta genom munnen eller att öppna, blanda med vatten och ge genom en sond. Det tas vanligtvis en gång om dagen med eller utan mat. Ta rosuvastatin vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Följ

anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta rosuvastatin exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Din läkare kommer förmodligen att börja med en låg dos rosuvastatin och gradvis öka din dos, inte mer än en gång varannan till var fjärde vecka.

Svälj kapslarna (Ezallor) hela; tugga eller krossa dem inte. Om du inte kan svälja kapseln, öppna kapseln och strö försiktigt innehållet på 1 tesked äppelmos. Svälj hela blandningen omedelbart utan att tugga. Spara inte äppelmossblandningen för senare användning.

Fortsätt att ta rosuvastatin även om du mår bra. Sluta inte ta rosuvastatin utan att tala med din läkare.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar rosuvastatin,

- tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot rosuvastatin, andra läkemedel eller något av innehållsämnena i rosuvastatin tabletter eller kapslar. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: antikoagulantia ('blodförtunnare') såsom warfarin (Coumadin, Jantoven); kolchicin (Colcrys); cimetidin (Tagamet); cyklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); darolutamid (Nubeqa); eltrombopag (Promacta); ketokonazol (Nizoral); andra mediciner för högt kolesterol såsom fenofibrat (Tricor), gemfibrozil (Lopid) och niacin (Niaspan, Niacor); vissa läkemedel mot hepatit C-virus (HCV), inklusive dasabuvir som tas tillsammans med ombitasvir, paritaprevir och ritonavir (Viekira Pak); glecaprevir taget med pibrentasvir (Mavyret), ledipasvir taget med sofosbuvir (Harvoni), simeprevir (inte längre tillgängligt i USA), eller sofosbuvir taget med velpatasvir och/eller voxilaprevir (Epclusa, Vosevi); vissa HIV-proteashämmare inklusive atazanavir (Reyataz) som tas med ritonavir (Norvir) och lopinavir och ritonavir (Kaletra); regorafenib (Stivarga); och spironolakton (Aldactone). Många andra mediciner kan också interagera med rosuvastatin, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.
- om du tar antacida av aluminium och magnesiumhydroxid (Mylanta, Maalox), ta dem minst 2 timmar efter rosuvastatin.
- tala om för din läkare om du har en leversjukdom. Din läkare kommer att beställa laboratorietester för att se hur väl din lever fungerar även om du inte tror att du har en leversjukdom. Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta rosuvastatin om du har en leversjukdom eller om testerna visar att du kan utveckla en leversjukdom.
- tala om för din läkare om du är asiatisk, om du dricker mer än 2 alkoholhaltiga drycker dagligen, om du är 65 år eller äldre, om du någonsin har haft leversjukdom, eller om du har eller någonsin har haft kramper, muskelvärk eller svaghet , lågt blodtryck eller njur- eller sköldkörtelsjukdom.

- tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Du bör inte bli gravid medan du tar rosuvastatin. Tala med din läkare om preventivmetoder som du kan använda under din behandling. Om du blir gravid medan du tar rosuvastatin, kontakta din läkare omedelbart. Rosuvastatin kan skada fostret.
- amma inte medan du tar rosuvastatin.
- om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar rosuvastatin. Om du är inlagd på sjukhus på grund av allvarlig skada eller infektion, berätta för läkaren som behandlar dig att du tar rosuvastatin.
- fråga din läkare om säker användning av alkoholhaltiga drycker medan du tar rosuvastatin. Alkohol kan öka risken för allvarliga biverkningar.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Ät en diet med låg fetthalt och låg kolesterol. Var noga med att följa alla tränings- och kostrekommendationer från din läkare eller dietist. Du kan också besöka webbplatsen för National Cholesterol Education Program (NCEP) för ytterligare dietinformation påhttp://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf [http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf].

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det är mindre än 12 timmar innan din nästa dos är planerad, hoppa över den missade dosen och fortsätt med ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Rosuvastatin kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

- förstoppning
- magont
- yrsel
- svårt att somna eller att sova
- depression
- ledvärk
- huvudvärk
- minnesförlust eller glömska
- förvirring

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart eller få akut medicinsk hjälp:

- muskelsmärta, ömhet eller svaghet (eller om dessa symtom fortsätter efter att ha avslutat rosuvastatin)

- brist på energi
- feber
- bröstsmärta
- mörk, rödaktig urin; minskad mängd urin; svaghet; och muskelvärk
- gulfärgning av huden eller ögonen
- mörkfärgad urin
- smärta i övre högra delen av buken
- illamående
- extrem trötthet
- svaghet
- ovanlig blödning eller blåmärken
- aptitlöshet
- influensaliknande symtom
- utslag
- nässelfeber
- klåda
- svårigheter att andas eller svälja
- svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar, ögon, händer, fötter, vrister eller underben
- heshet

Rosuvastatin kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332-1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kan beställa laboratorietester under din behandling, särskilt om du utvecklar symtom på leverskada.

Innan du gör något laboratorietest, berätta för din läkare och laboratoriepersonalen att du tar rosuvastatin.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista bör du ta med dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

- Crestor®
- Ezallor®

Senast reviderad - 12/15/2020

Lär dig hur du citerar den här sidan

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul

AHFS®Patientmedicineringsinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022