Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

MedlinePlus
Trusted Health Information for You

Source : U.S. National Library of Medicine

URL van deze pagina: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603033.html

Rosuvastatine

uitgesproken als (roe soo'' va stat' in)

Merk op:

[Geplaatst 07/20/2021]

PUBLIEK: Patiënt, gezondheidsprofessional, OBGYN, cardiologie, endocrinologie, apotheek

KWESTIE: De FDA vraagt om herzieningen van de informatie over gebruik tijdens de zwangerschap in de voorschrijfinformatie van de hele klasse van statinegeneesmiddelen. Deze veranderingen omvatten het verwijderen van de contra-indicatie tegen het gebruik van deze geneesmiddelen bij alle zwangere patiënten. Een contra-indicatie is de sterkste waarschuwing van de FDA en wordt alleen toegevoegd wanneer een geneesmiddel niet mag worden gebruikt, omdat het risico duidelijk opweegt tegen eventuele voordelen. Omdat de voordelen van statines het voorkomen van ernstige of mogelijk fatale voorvallen bij een kleine groep zwangere patiënten met een zeer hoog risico kunnen omvatten, is het niet aangewezen om deze geneesmiddelen bij alle zwangere vrouwen te contra-indiceren.

FDA verwacht dat het verwijderen van de contra-indicatie beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en patiënten in staat zal stellen individuele beslissingen te nemen over voordelen en risico's, vooral voor degenen met een zeer hoog risico op een hartaanval of beroerte. Dit omvat patiënten met homozygote familiaire hypercholesterolemie en patiënten die eerder een hartaanval of beroerte hebben gehad.

ACHTERGROND: Statines zijn een klasse geneesmiddelen op recept die al tientallen jaren worden gebruikt om lipoproteïne met lage dichtheid (LDL-C of "slechte") cholesterol in het bloed te verlagen. Geneesmiddelen in de statineklasse omvatten atorvastatine, fluvastatine, lovastatine, pitavastatine, pravastatine, rosuvastatine en simvastatine.

AANBEVELINGEN:

- **Patiënten:**Patiënten die statines gebruiken, moeten hun beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg op de hoogte stellen als ze zwanger worden of vermoeden dat ze zwanger zijn. Uw beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg kan u adviseren of u moet stoppen met het gebruik van het geneesmiddel tijdens de zwangerschap en of u tijdelijk mag stoppen met het gebruik van statine tijdens het geven van borstvoeding. Patiënten met een hoog risico op een hartaanval of beroerte die statines nodig hebben na de bevalling, mogen geen borstvoeding geven en moeten alternatieven zoals zuigelingenvoeding gebruiken.

- **Professionele gezondheidszorgers**: Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg dienen de statinetherapie bij de meeste zwangere patiënten stop te zetten, of ze kunnen rekening houden met de aanhoudende therapeutische behoeften van het individu

patiënt, met name degenen met een zeer hoog risico op cardiovasculaire voorvallen tijdens de zwangerschap. Vanwege de chronische aard van hart- en vaatziekten is behandeling van hyperlipidemie over het algemeen niet nodig tijdens de zwangerschap. Bespreek met patiënten of zij tijdelijk mogen stoppen met statines tijdens het geven van borstvoeding. Adviseer degenen die een statine nodig hebben vanwege hun cardiovasculaire risico dat borstvoeding niet wordt aanbevolen omdat het geneesmiddel in de moedermelk kan terechtkomen

De FDA hoopt dat de herziene tekst in de voorschrijfinformatie beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg zal helpen gerust te stellen dat statines veilig kunnen worden voorgeschreven aan patiënten die zwanger kunnen worden, en hen zal helpen patiënten met onbedoelde blootstelling aan statine in het begin van de zwangerschap of voordat de zwangerschap wordt erkend dat het geneesmiddel is het is onwaarschijnlijk dat dit schadelijk is voor de ongeboren baby.

Ga voor meer informatie naar de FDA-website op: http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation]enhttp://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety].

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Rosuvastatine wordt samen met een dieet, gewichtsverlies en lichaamsbeweging gebruikt om het risico op een hartaanval en beroerte te verminderen en om de kans te verkleinen dat een hartoperatie nodig is bij mensen met een hartaandoening of die een risico lopen op het ontwikkelen van een hartaandoening. Rosuvastatine wordt ook gebruikt om de hoeveelheid cholesterol, zoals low-density lipoproteïne (LDL)-cholesterol ('slechte cholesterol') en triglyceriden in het bloed te verlagen en om de hoeveelheid high-density lipoproteïne (HDL)-cholesterol ('goede cholesterol') te verhogen.) in het bloed. Rosuvastatine kan ook samen met een dieet worden gebruikt om de hoeveelheid cholesterol en andere vetstoffen in het bloed te verlagen bij kinderen en tieners van 8 tot 17 jaar met familiaire heterozygote hypercholesterolemie (een erfelijke aandoening waarbij cholesterol niet normaal uit het lichaam kan worden verwijderd).). Rosuvastatine wordt gebruikt in combinatie met een dieet, en alleen of in combinatie met andere medicijnen, om de hoeveelheid cholesterol en andere vetstoffen in het bloed te verlagen bij volwassenen en kinderen en tieners van 7 tot 17 jaar met familiaire homozygote hypercholesterolemie (een erfelijke aandoening). waarin cholesterol niet normaal uit het lichaam kan worden verwijderd). Rosuvastatine zit in een klasse medicijnen die HMG-CoA-reductaseremmers (statines) worden genoemd. Het werkt door de productie van cholesterol in het lichaam te vertragen om de hoeveelheid cholesterol die zich op de wanden van de slagaders kan ophopen te verminderen en de bloedtoevoer naar het hart, de hersenen en andere delen van het lichaam te blokkeren. om de hoeveelheid cholesterol en andere vetstoffen in het bloed te verlagen bij volwassenen en kinderen en tieners van 7 tot 17 jaar die familiaire homozygote hypercholesterolemie hebben (een erfelijke aandoening waarbij cholesterol niet normaal uit het lichaam kan worden verwijderd). Rosuvastatine zit in een klasse medicijnen die HMG-CoA-reductaseremmers (statines) worden genoemd. Het werkt door de productie van cholesterol in het lichaam te vertragen om de hoeveelheid cholesterol die zich op de wanden van de slagaders kan ophopen te verminderen en de bloedtoevoer naar het hart, de hersenen en andere delen van het lichaam te blokkeren. om de hoeveelheid cholesterol en andere vetstoffen in het bloed te verlagen bij volwassenen en kinderen en tieners van 7 tot 17 jaar die familiaire homozygote hypercholesterolemie hebben (een erfelijke aandoening waarbij cholesterol niet normaal uit het lichaam kan worden verwijderd). Rosuvastatine zit in een klasse medicijnen die HMG-CoA-reductaseremmers (statines) worden genoemd. Het werkt door de productie van cholesterol in het lichaam te vertragen om de hoeveelheid cholesterol die zich op de wanden van de slagaders kan ophopen te verminderen en de bloedtoevoer naar het hart, de hersenen en andere delen van het lichaam te blokkeren.

Ophoping van cholesterol en vetten langs de wanden van uw bloedvaten (een proces dat bekend staat als atherosclerose) vermindert de bloedstroom en daarmee de zuurstoftoevoer naar uw hart, hersenen en andere delen van uw lichaam. Het is aangetoond dat het verlagen van uw cholesterol- en vetgehalte in het bloed met rosuvastatine hartaandoeningen, angina pectoris (pijn op de borst), beroertes en hartaanvallen voorkomt.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Rosuvastatine wordt geleverd als tablet (Crestor) om via de mond in te nemen. Rosuvastatine wordt ook geleverd als capsule (Ezallor) om via de mond in te nemen of te openen, te mengen met water en via een voedingssonde toe te dienen. Het wordt gewoonlijk eenmaal per dag ingenomen, met of zonder voedsel. Neem rosuvastatine elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. Volg de

aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig door en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem rosuvastatine precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Uw arts zal u waarschijnlijk starten met een lage dosis rosuvastatine en uw dosis geleidelijk verhogen, niet vaker dan eenmaal per 2 tot 4 weken.

Slik de capsules (Ezallor) heel door; kauw of plet ze niet. Als u de capsule niet kunt doorslikken, opent u de capsule en strooit u de inhoud voorzichtig op 1 theelepel appelmoes. Slik het hele mengsel onmiddellijk door zonder te kauwen. Bewaar het appelmoesmengsel niet voor later gebruik.

Blijf rosuvastatine gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van rosuvastatine zonder overleg met uw arts.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u rosuvastatine inneemt,

- vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor rosuvastatine, voor andere medicijnen of voor één van de bestanddelen van rosuvastatine tabletten of capsules. Vraag uw apotheker om een lijst van de ingrediënten.
- vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: anticoagulantia ('bloedverdunners') zoals warfarine (Coumadin, Jantoven); colchicine (Colcrys); cimetidine (Tagamet); ciclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); darolutamide (Nubeqa); eltrombopag (Promacta); ketoconazol (Nizoral); andere medicijnen voor hoog cholesterol zoals fenofibraat (Tricor), gemfibrozil (Lopid) en niacine (Niaspan, Niacor); bepaalde medicijnen tegen het hepatitis C-virus (HCV), waaronder dasabuvir, ingenomen met ombitasvir, paritaprevir en ritonavir (Viekira Pak); glecaprevir ingenomen met pibrentasvir (Mavyret), ledipasvir ingenomen met sofosbuvir (Harvoni), simeprevir (niet langer beschikbaar in de VS), of sofosbuvir ingenomen met velpatasvir en/of voxilaprevir (Epclusa, Vosevi); bepaalde HIV-proteaseremmers, waaronder atazanavir (Reyataz) ingenomen met ritonavir (Norvir), en lopinavir en ritonavir (Kaletra); regorafenib (Stivarga); en spironolacton (Aldactone). Veel andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met rosuvastatine, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. dus zorg ervoor dat u uw arts vertelt over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. dus zorg ervoor dat u uw arts vertelt over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.
- als u antacida van aluminium en magnesiumhydroxide (Mylanta, Maalox) gebruikt, neem deze dan ten minste 2 uur na rosuvastatine in.
- vertel het uw arts als u een leverziekte heeft. Uw arts zal laboratoriumtests bestellen om te zien hoe goed uw lever werkt, zelfs als u denkt dat u geen leverziekte heeft. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen om geen rosuvastatine te gebruiken als u een leverziekte heeft of als uit de tests blijkt dat u mogelijk een leverziekte ontwikkelt.
- vertel het uw arts als u Aziatisch bent, als u meer dan 2 alcoholische dranken per dag drinkt, als u 65 jaar of ouder bent, als u ooit een leverziekte heeft gehad, of als u epileptische aanvallen, spierpijn of zwakte heeft of ooit heeft gehad , lage bloeddruk of nier- of schildklierziekte.

- vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. U mag niet zwanger worden terwijl u rosuvastatine gebruikt. Praat met uw arts over anticonceptiemethoden die u tijdens uw behandeling kunt gebruiken. Als u zwanger wordt terwijl u rosuvastatine gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Rosuvastatine kan de foetus schaden.
- geef geen borstvoeding terwijl u rosuvastatine gebruikt.
- als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u rosuvastatine gebruikt. Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen vanwege ernstig letsel of een infectie, vertel dan de arts die u behandelt dat u rosuvastatine gebruikt.
- vraag uw arts naar het veilige gebruik van alcoholische dranken terwijl u rosuvastatine gebruikt. Alcohol kan het risico op ernstige bijwerkingen verhogen.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Eet een vetarm, cholesterolarm dieet. Zorg ervoor dat u alle aanbevelingen voor lichaamsbeweging en voeding van uw arts of diëtist opvolgt. U kunt ook de website van het National Cholesterol Education Program (NCEP) bezoeken voor aanvullende voedingsinformatie op:http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf [http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf].

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter minder dan 12 uur duurt voordat uw volgende dosis is gepland, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Rosuvastatine kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

- constipatie
- buikpijn
- duizeligheid
- moeite met inslapen of doorslapen
- depressie
- gewrichtspijn
- hoofdpijn
- geheugenverlies of vergeetachtigheid
- verwardheid

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of schakel medische noodhulp in:

- spierpijn, gevoeligheid of zwakte (of als deze symptomen aanhouden na het stoppen met rosuvastatine)

- gebrek aan energie
- koorts
- pijn op de borst
- donkere, roodachtige urine; verminderde hoeveelheid urine; zwakheid; en spierpijn
- geel worden van de huid of ogen
- donker gekleurde urine
- pijn in de rechterbovenhoek van de buik
- misselijkheid
- extreme vermoeidheid
- zwakheid
- ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken
- verlies van eetlust
- griepachtige symptomen
- uitslag
- netelroos
- jeuk
- moeite met ademhalen of slikken
- zwelling van het gezicht, keel, tong, lippen, ogen, handen, voeten, enkels of onderbenen
- heesheid

Rosuvastatine kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch (1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op: https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts kan tijdens uw behandeling laboratoriumtests bestellen, vooral als u symptomen van leverbeschadiging krijgt.

Vertel uw arts en het laboratoriumpersoneel voordat u een laboratoriumtest krijgt dat u rosuvastatine gebruikt.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept (zonder recept verkrijgbaar) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

- Crestor®
- Ezallor®

Laatst herzien - 15-12-2020

Leer hoe u deze pagina kunt citeren

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer

AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022