Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

MedlinePlus
Trusted Health Information for You

Source : U.S. National Library of Medicine

عنوانURL لهذه الصفحة: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610003.html

ساكساجليبتين

تنطقباسم (sax 'a glip tin)

لماذايوصف هذا الدواء؟

يستخدمSaxagliptin جنباً إلى جنب مع النظام الغذائي وممارسة الرياضة لخفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري منالنوع 2 (حالة يكون فيها سكر الدم مرتفعاً جداً لأن الجسم لا ينتج الأنسولين أو يستخدمه بشكل طبيعي). ينتمي ساكساجليبتين إلىفئة من الأدوية تسمى مثبطات)DPP-4(dipeptidyl peptidase-4. وهو يعمل عن طريق زيادة كمية الأنسولين التي ينتجها الجسمبعد الوجبات عند ارتفاع نسبة السكر في الدم. لا يستخدم Saxagliptin لعلاج مرض السكري من النوع 1 (حالة لا ينتج فيها الجسمالأنسولين ، وبالتالي لا يمكنه التحكم في كمية السكر في الدم) أو الحماض الكيتوني السكري (حالة خطيرة قد تتطور إذا لم يتم علاجارتفاع نسبة السكر في الدم).

بمرورالوقت ، يمكن أن يصاب الأشخاص المصابون بالسكري وارتفاع نسبة السكر في الدم بمضاعفات خطيرة أو تهدد الحياة ، بما فيذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل الكلى وتلف الأعصاب ومشاكل العين. قد يساعد تناول الأدوية ، وإجراء تغييرات فينمط الحياة (مثل النظام الغذائي ، والتمارين الرياضية ، والإقلاع عن التدخين) ، وفحص نسبة السكر في الدم بانتظام في إدارة مرضالسكري وتحسين صحتك. قد يقلل هذا العلاج أيضاً من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو غيرها من المضاعفات المرتبطةبمرض السكري مثل الفشل الكلوي وتلف الأعصاب (خدر أو برودة الساقين أو القدمين ؛ انخفاض القدرة الجنسية لدى الرجالوالنساء) ، مشاكل في العين ، بما في ذلك التغييرات أو فقدان البصر أو أمراض اللثة. سيتحدث معك طبيبك ومقدمو الرعاية الصحيةالآخرون حول أفضل طريقة لإدارة مرض السكري الخاص بك.

فكيفيستعمل هذا الدواء؟

يأتيSaxagliptin كجهاز لوحي ليأخذ عن طريق الفم. عادة ما يتم تناوله مرة واحدة في اليوم مع أو بدون طعام. خذ saxagliptin فينفس الوقت تقريباً كل يوم. اتبع الإرشادات الموجودة على ملصق الوصفة الخاص بك بعناية ، واطلب من طبيبك أو الصيدلي شرحأي جزء لا تفهمه. خذ saxagliptin تماماً حسب التوجيهات. لا تأخذ أكثر أو أقل منه أو تتناوله أكثر مما وصفه طبيبك.

يتحكمSaxagliptin في مرض السكري من النوع 2 ولكنه لا يعالجها. استمر في تناول saxagliptin حتى لو كنت تشعر جيداً. لاتتوقف عن تناول saxagliptin دون التحدث مع طبيبك.

سيعطيكطبيبك أو الصيدلي ورقة معلومات المريض الخاصة بالشركة المصنعة (دليل الدواء) عندما تبدأ العلاج باستخدام saxagliptin وفي كل مرة تقوم فيها بإعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك. اقرأ المعلومات بعناية واسأل طبيبك أو الصيدلي إذا كانلديك أي أسئلة. يمكنك أيضاً زيارة موقع إدارة الغذاء والدواء (FDA) (/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm http://www.fda.gov

]http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm[) أو موقع الشركة المصنعة للحصول على دليل الدواء.

هناكاستخدامات لهذا الدواء

يمكنوصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

قبعةالاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبلتناول ساكساجليبتين ،

- أخبرطبيبك والصيدلي إذا كان لديك حساسية من saxagliptin أو أي أدوية أخرى أو أي من مكونات أقراص saxagliptin. اسألالصيدلي أو تحقق من دليل الأدوية للحصول على قائمة بالمكونات.

- أخبرطبيبك والصيدلي عن الأدوية الأخرى الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التيتتناولها أو تخطط لتناولها. تأكد من ذكر أي مما يلي: بعض الأدوية المضادة للفطريات مثل إيتراكونازول (أونميل ، سبورانوكس) وكيتوكونازول (نيزورال) ؛ كلاريثروميسين (بياكسين) ؛ أدوية معينة لفيروس نقص المناعة البشرية (فيروس نقص المناعةالبشرية) أو الإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسب) مثل أتازانافير (رياتاز ، في إيفوتاز) ، وإنديناڤير (كريكسيفان) ، ونلفينافير(فيراسبت) ، وريتونافير (نورفير ، في كاليترا) ، وساكوينافير (إنفيراز) ؛ الأنسولين أو الأدوية الفموية لمرض السكري مثلكلوربروباميد (ديابينيز) ، جليمبيريد (أماريل ، في دويتاكت) ، غليبيزيد (جلوكوترول) ، غليبوريد (ديابيتا ، جليناز ، في جلوكوفانس) ، ناتيجلينيد (ستارليكس) ، بيوجليتازون (أكتوس ، في أكتوبلوس ميت ، في Duetact) ، ريباجلينيد (براندين ، في براندیمت) ، روزيجليتازون (أفانديا) ، تولازاميد ، وتولبوتاميد ؛ نيفازودون. و telithromycin (لم يعد متوفراً في الولايات المتحدة ؛Ketek). قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية.

- أخبرطبيبك إذا كنت تشرب أو شربت كميات كبيرة من الكحول ، إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (تورم البنكرياس) ، وحصىالمرارة ، ومستويات عالية من الدهون الثلاثية (المواد الدهنية) في الدم ، وفشل القلب ، والحماض الكيتوني السكري ، أومرض الكلى.
- أخبرطبيبك إذا كنت حاملاًأو تخططين للحمل أو مرضعة. إذا أصبحت حاملاًأثناء تناول saxagliptin ، فاتصل بطبيبك.

- إذاكنت تخضع لعملية جراحية ، بما في ذلك جراحة الأسنان ، أخبر الطبيب أو طبيب الأسنان أنك تتناول عقار ساكساجليبتين.
- تحدثإلى طبيبك حول ما يجب عليك فعله إذا تعرضت للأذى أو إذا أصبت بحمى أو عدوى. قد تؤثر هذه الحالات على نسبةالسكر في الدم وكمية saxagliptin التي قد تحتاجها.

قبعةتعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

تأكدمن اتباع جميع التمارين والتوصيات الغذائية التي قدمها طبيبك أو اختصاصي التغذية. من المهم تناول نظام غذائي صحيوممارسة الرياضة بانتظام وفقدان الوزن إذا لزم الأمر. سيساعد ذلك في السيطرة على مرض السكري لديك ومساعدة saxagliptin على العمل بشكل أكثر فعالية.

قبعةيجب أن أفعلها إذا نسيت جرعة؟

خذالجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها. ومع ذلك ، إذا حان الوقت تقريباً للجرعة التالية ، فتجاوز الجرعة الفائتة وتابع جدول الجرعاتالمعتاد. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة الفائتة ما لم يخبرك طبيبك بضرورة ذلك.

الآثارالجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قديسبب هذا الدواء تغيرات في نسبة السكر في الدم. يجب أن تعرف أعراض انخفاض السكر في الدموارتفاعه وماذا تفعل إذا كانت لديك هذه الأعراض.

قديسبب ساكساجليبتين آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- إلتهابالحلق
- صداعالراس
- المالمفاصل

بعضالآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أياً من هذه الأعراض ، فتوقف عن تناول saxagliptin واتصل بطبيبك على الفور:

- متسرع
- قشعريرة
- تقشيرالجلد
- متلهف،متشوق
- انتفاخالوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق
- صعوبةفي التنفس أو البلع
- بحةفي الصوت
- ألممستمر ، يبدأ في الجزء العلوي الأيسر أو منتصف المعدة ولكنه قد ينتشر إلى الظهر
- التقيؤ
- فقدانالشهية
- التعبالمفرط
- ضيقفي التنفس خاصة عند الاستلقاء
- تورمفي القدمين أو الكاحلين أو الساقين
- زيادةالوزن المفاجئة

قديسبب ساكساجليبتين آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء تناول هذا الدواء.

إذاكنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرةعبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).
([http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]http://www.fda.gov/Safety/MedWatch[]) أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

قبعةيجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

احتفظبهذا الدواء في الحاوية التي جاء فيها ، ومغلقة بإحكام ، وبعيداً عن متناول الأطفال. قم بتخزينه في درجة حرارة الغرفة وبعيداًعن الحرارة والرطوبة الزائدة (وليس في الحمام).

يجبالتخلص من الأدوية غير الضرورية بطرق خاصة لضمان عدم تمكن الحيوانات الأليفة والأطفال والأشخاص الآخرين من تناولها. ومعذلك ، يجب ألا تغسل هذا الدواء في المرحاض. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل طريقة للتخلص من أدويتك هي من خلال برنامج استعادةالأدوية. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك أو اتصل بقسم القمامة / إعادة التدوير المحلي للتعرف على برامج الاستعادة في مجتمعك.راجع موقع ويب التخلص الآمن من الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p] لمزيد من المعلومات إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج الاستعادة.

منالمهم إبقاء جميع الأدوية بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال لأن العديد من الحاويات (مثل الأدوية الأسبوعية وقطرات العين والكريماتوالبقع وأجهزة الاستنشاق) ليست مقاومة للأطفال ويمكن للأطفال الصغار فتحها بسهولة. لحماية الأطفال الصغار من التسمم ،قم دائماً بإغلاق أغطية الأمان ووضع الدواء على الفور في مكان آمن - مكان مرتفع وبعيداً عن أنظارهم ومدى وصولهم. http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

نحالة طارئة / جرعة زائدة

فيحالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعانيمن صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

قبعةمعلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

احتفظبجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر. من المحتمل أن يطلب طبيبك بعض الاختبارات المعملية قبل وأثناء علاجك بالساكساجليبتينللتحقق من استجابة جسمك له. يجب فحص نسبة السكر في الدم والهيموجلوبين الغليكوزيلاتي (HbA1c) بانتظاملتحديد استجابتك للساكساجليبتين. قد يخبرك طبيبك أيضاً بكيفية التحقق من استجابتك للساكساجليبتين عن طريق قياسمستويات السكر في الدم أو البول في المنزل. اتبع هذه التعليمات بعناية.

يجبعليك دائماً ارتداء سوار تحديد مرض السكري للتأكد من حصولك على العلاج المناسب في حالات الطوارئ.

لاتدع أي شخص آخر يأخذ دوائك. اسأل الصيدلي عن أي أسئلة لديك حول إعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك.

منالمهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجاتمثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباًأو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماءراند

- اونجليزا®

أسماءراند للمنتجات المركبة

- كومبيجليز®)يحتوي على ميتفورمين ، ساكساجليبتين(XR

- Qtern®(تحتوي على داباجليفلوزين وساكساجليبتين)

- Qternmet®)يحتوي على داباجليفلوزين ، ميتفورمين ،ساكساجليبتين(XR

آخرمراجعة - 15/07/2019

تعلمكيفية الاستشهاد بهذه الصفحة

إخلاءالمسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

AHFS®معلومات الدواء المريض ™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي®كل الحقوق محفوظة.
الازدواجية .4500 East-West Highway، Suite 900، Bethesda، Maryland ،
للاستخدامالتجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبةالوطنية للطب 8600 Rockville Pike، Bethesda، MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية
المعاهدالوطنية للصحة
آخرتحديث للصفحة: 25 مارس 2022