Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606023.html

Sitagliptin

pronunțat ca (stai un glip' tin)

de ce este prescris acest medicament?

Sitagliptin este utilizat împreună cu dietă și exerciții fizice și, uneori, cu alte medicamente pentru a scădea nivelul zahărului din sânge la adulții cu diabet zaharat de tip 2 (afecțiune în care zahărul din sânge este prea mare, deoarece organismul nu produce sau nu utilizează insulina în mod normal). Sitagliptin face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori de dipeptidil peptidază-4 (DPP-4). Acționează prin creșterea cantităților de anumite substanțe naturale care scad zahărul din sânge atunci când este mare. Sitagliptin nu este utilizat pentru a trata diabetul de tip 1 (afecțiune în care organismul nu produce insulină și, prin urmare, nu poate controla cantitatea de zahăr din sânge).

De-a lungul timpului, persoanele care au diabet și zahăr din sânge ridicat pot dezvolta complicații grave sau care pun viața în pericol, inclusiv boli de inimă, accident vascular cerebral, probleme cu rinichii, leziuni ale nervilor și probleme oculare. Luarea de medicamente, modificarea stilului de viață (de exemplu, dietă, exerciții fizice, renunțarea la fumat) și verificarea regulată a zahărului din sânge vă pot ajuta să vă gestionați diabetul și să vă îmbunătățiți sănătatea. Această terapie vă poate reduce, de asemenea, șansele de a avea un atac de cord, un accident vascular cerebral sau alte complicații legate de diabet, cum ar fi insuficiența renală, afectarea nervilor (amorțire, picioare sau picioare reci; scăderea capacității sexuale la bărbați și femei), probleme oculare, inclusiv modificări. sau pierderea vederii sau boala gingiilor. Medicul dumneavoastră și alți furnizori de asistență medicală vă vor vorbi despre cel mai bun mod de a vă gestiona diabetul.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Sitagliptin se prezintă sub formă de tablete de luat pe cale orală. De obicei, se ia o dată pe zi, cu sau fără alimente. Luați sitagliptin aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați sitagliptin exact așa cum este recomandat. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Sitagliptinul ajută la controlul nivelului ridicat de zahăr din sânge, dar nu vindecă diabetul. Continuați să luați sitagliptin chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați sitagliptin fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua sitagliptin,

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la sitagliptin sau la orice alte medicamente.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: digoxină (Lanoxicaps, Lanoxin); insulină; și anumite medicamente orale pentru diabet, inclusiv acetohexamidă, clorpropamidă (Diabinese), glimepiridă (Amaryl), glipizidă (Glucotrol, în Metaglip), gliburidă (Diabeta, Glycron, Micronase), tolazamidă (Tolinase) și tolbutamidă. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă beți sau ați băut vreodată cantități mari de alcool și dacă aveți sau ați avut vreodată cetoacidoză diabetică (o afecțiune gravă care poate apărea atunci când glicemia este prea mare), pancreatită (umflarea pancreasului), calculi biliari, nivelurile de trigliceride (substanțe grase) în sânge, insuficiență cardiacă sau boli de rinichi.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați sitagliptin, adresați-vă medicului dumneavoastră.
- dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați sitagliptin.
- discutați cu medicul dumneavoastră despre ce ar trebui să faceți dacă vă răniți sau dacă faceți febră sau infecție. Aceste afecțiuni vă pot afecta glicemia.
- discutați cu medicul dumneavoastră despre simptomele glicemiei crescute și scăzute și despre alte complicații ale diabetului zaharat, ce să faceți dacă dezvoltați aceste simptome și cum să preveniți aceste afecțiuni.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Asigurați-vă că urmați toate recomandările de dietă și exerciții fizice făcute de medicul dumneavoastră sau dietetician.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Sitagliptin poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

- nas înfundat sau care curge
- Durere de gât
- durere de cap
- diaree
- greaţă

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă prezentați oricare dintre aceste simptome, încetați să luați sitagliptin și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră:

- febră, greață, vărsături, pierderea poftei de mâncare, durere continuă care începe în partea stângă sus sau în mijlocul stomacului, dar se poate răspândi la spate
- dificultăți de respirație, creștere rapidă în greutate sau umflarea picioarelor sau gleznelor
- mâncărimi ale pielii, vezicule sau descuamări ale pielii
- dureri articulare
- eczemă
- urticarie
- umflarea feței, buzelor, limbii și gâtului
- dificultate la respirație sau la înghițire

Sitagliptin poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați acest medicament.

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor. http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă poate prescrie anumite teste înainte și în timpul tratamentului dumneavoastră cu sitagliptin. Glicemia și hemoglobina glicozilată (HbA1c) trebuie verificate în mod regulat pentru a determina răspunsul dumneavoastră la sitagliptin. De asemenea, medicul dumneavoastră vă va spune cum să verificați

răspunsul dumneavoastră la sitagliptin prin măsurarea nivelului de zahăr din sânge sau din urină acasă. Urmați aceste instrucțiuni cu atenție.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

- Januvia®

rand nume de produse combinate

- Janumet®(conține metformină, sitagliptin)
- Juvisync®(conține simvastatină, sitagliptin)¶
- Steglujan®(conținând Ertugliflozin, Sitagliptin)

¶-Acest produs de marcă nu mai este pe piață. Pot fi disponibile alternative generice.

Ultima revizuire - 15.02.2021

Aflați cum să citați această pagină

Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciştilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022