



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Дом](#) → [Лекарства, травы и добавки](#) → Софосбувир и Велпатасвир

Source : U.S. National Library of Medicine

URL этой страницы: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616034.html>

Софосбувир и Велпатасвир

произносится как (soe fos 'bue vir) (vel pat' as vir)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Возможно, вы уже инфицированы гепатитом В (вирус, поражающий печень и вызывающий ее серьезное повреждение), но не имеете симптомов заболевания. В этом случае прием комбинации софосбувира и велпатасвира может увеличить риск того, что ваша инфекция станет более серьезной или опасной для жизни, и у вас появятся симптомы. Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо была инфекция, вызванная вирусом гепатита В. Ваш врач направит вас на анализ крови, чтобы узнать, есть ли у вас или когда-либо болели гепатитом В. Ваш врач также будет контролировать вас на наличие признаков инфекции гепатита В во время и в течение нескольких месяцев после лечения. При необходимости ваш врач может дать вам лекарство для лечения этой инфекции до и во время лечения комбинацией софосбувира и велпатасвира.

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач может назначить определенные тесты до, во время и после лечения, чтобы проверить реакцию вашего организма на комбинацию софосбувира и велпатасвира.

Поговорите со своим врачом о рисках, связанных с приемом комбинации софосбувира и велпатасвира.

зачем назначают это лекарство?

Комбинация софосбувира и велпатасвира используется отдельно или с рибавирином (Копегус, Ребетол, Рибасфера) для лечения хронического гепатита С (продолжающаяся вирусная инфекция, поражающая печень) у взрослых и детей в возрасте 6 лет и старше или с массой тела не менее 37 фунтов (17 кг). Софосбувир относится к классу противовирусных препаратов, называемых нуклеотидными ингибиторами полимеразы NS5B вируса гепатита С (ВГС). Велпатасвир относится к классу противовирусных препаратов, называемых ингибиторами комплекса репликации NS5A ВГС. Комбинация софосбувира и велпатасвира останавливает распространение вируса гепатита С внутри организма.

Как следует использовать это лекарство?

Комбинация софосбувира и велпатасвира выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают независимо от приема пищи один раз в день в течение 12 недель. Принимайте софосбувир и велпатасвир примерно в одно и то же время каждый день. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Принимайте софосбувир и велпатасвир точно по назначению. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Продолжайте принимать софосбувир и велпатасвир, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием софосбувира и велпатасвира, не посоветовавшись с врачом.

Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать софосбувир и велпатасвир,

- сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на софосбувир, велпатасвир, любые другие лекарства или какие-либо ингредиенты в таблетках софосбувира и велпатасвира. Попросите у фармацевта список ингредиентов.
- сообщите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите любое из следующего: амиодарон (некстерон, пацерон); аторвастатин (Липитор, в Кадуэте); карбамазепин (Карбатрол, Эпитол, Экветро, Тегретол, Терил); дигоксин (ланоксин); эфавиренз (Сутива, в Атрипла); окскарбазепин (Окстеллар, Трилептал); фенобарбитал; фенитоин (Дилантин, Фенитек); ингибиторы протонной помпы, такие как декслансопразол (Dexilant), эзомепразол (Nexium, in Vimovo), лансопразол (Prevacid, in Prevpac), омепразол (Prilosec, Zegerid), пантопразол (Protonix) и рабепразол (АсирНех): рифабутин (Mycobutin); рифампин (Рифадин, Римактан, Рифамат, Рифатер); рифапентин (Прифтин); розувастатин (Крестор); тенофовир ДФ (Виреад, Атрипла, Комплера, Стрибилд, Трувада, другие); типранавир (Aptivus) при приеме с ритонавиром (Norvir); топотекан (гикамтин); и варфарин (Кумадин, Жантовен). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с софосбувиром и велпатасвиром, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке.
- если вы принимаете антациды, принимайте их за 4 часа до или через 4 часа после софосбувира и велпатасвира.
- сообщите своему врачу, если вы принимаете лекарство от расстройства желудка, изжоги или язвы (H2блокаторы), такие как циметидин, ранитидин (Зантак), фамотидин (Пепсид, в Дуксисе) или низатидин. Ваш врач может порекомендовать вам принимать это лекарство за 12 часов до или через 12 часов после приема софосбувира и велпатасвира или одновременно с приемом софосбувира и велпатасвира.
- Расскажите своему врачу, какие растительные продукты вы принимаете, особенно зверобой.
- сообщите своему врачу, если у вас есть вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) или есть или когда-либо были какие-либо проблемы с печенью, кроме гепатита С.
- Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели при приеме софосбувира и велпатасвира, позвоните своему врачу.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Софосбувир и велпатасвир могут вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов является серьезным или не проходит:

- СЫПЬ
- недостаток энергии
- чувство раздражения
- чувствую себя подавленным

Софосбувир и велпатасвир могут вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) или по телефону (1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, так как многие контейнеры (например, контейнеры для еженедельных таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх и подальше, вне поля их зрения и досягаемости.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств — это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной утилизации лекарственных средств (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) для получения дополнительной информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

п экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в Интернете по адресу <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

какую другую информацию я должен знать?

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

- Эпклюза®

Последняя редакция - 15.05.2020

[Научитесь цитировать эту страницу](#)



[Американское общество фармацевтов системы здравоохранения, Inc. Отказ от ответственности](#)

AHFS®Информация о лекарствах для пациентов™. © Copyright, 2022. Американское общество фармацевтов системы здравоохранения.®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Бетесда, Мэриленд. Все права защищены. Дублирование для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.

Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья

Последнее обновление страницы: 25 марта 2022 г.