



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Medicamentos, hierbas y suplementos](#) → Sofosbuvir y Velpatasvir

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616034.html>

Sofosbuvir y Velpatasvir

pronunciado como (soe fos' bue vir) (vel pat' as vir)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

Es posible que ya esté infectado con hepatitis B (un virus que infecta el hígado y puede causar daño hepático grave), pero no tener ningún síntoma de la enfermedad. En este caso, tomar la combinación de sofosbuvir y velpatasvir puede aumentar el riesgo de que su infección se vuelva más grave o ponga en peligro su vida y desarrolle síntomas. Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido una infección por el virus de la hepatitis B. Su médico ordenará un análisis de sangre para ver si tiene o alguna vez ha tenido infección por hepatitis B. Su médico también lo controlará para detectar signos de infección por hepatitis B durante y durante varios meses después de su tratamiento. Si es necesario, su médico puede darle medicamentos para tratar esta infección antes y durante su tratamiento con la combinación de sofosbuvir y velpatasvir.

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico puede ordenar ciertas pruebas antes, durante y después de su tratamiento para verificar la respuesta de su cuerpo a la combinación de sofosbuvir y velpatasvir.

Hable con su médico sobre los riesgos de tomar la combinación de sofosbuvir y velpatasvir.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La combinación de sofosbuvir y velpatasvir se usa sola o con ribavirina (Copegus, Rebetol, Ribasphere) para tratar la hepatitis C crónica (una infección viral continua que daña el hígado) en adultos y niños a partir de los 6 años o que pesan al menos 37 libras (17 kg). El sofosbuvir pertenece a una clase de medicamentos antivirales llamados inhibidores de la polimerasa NS5B del virus de la hepatitis C (VHC) de nucleótidos. Velpatasvir pertenece a una clase de medicamentos antivirales llamados inhibidores del complejo de replicación NS5A del VHC. La combinación de sofosbuvir y velpatasvir impide que el virus que causa la hepatitis C se propague dentro del cuerpo.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La combinación de sofosbuvir y velpatasvir viene en tabletas para tomar por vía oral. Por lo general, se toma con o sin alimentos una vez al día durante 12 semanas. Tome sofosbuvir y velpatasvir aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome sofosbuvir y velpatasvir exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Continúe tomando sofosbuvir y velpatasvir incluso si se siente bien. No deje de tomar sofosbuvir y velpatasvir sin consultar a su médico.

Pídale a su farmacéutico o médico una copia de la información del fabricante para el paciente.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar sofosbuvir y velpatasvir,

- Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al sofosbuvir, al velpatasvir, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes de las tabletas de sofosbuvir y velpatasvir. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.
- informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos nutricionales está tomando o piensa tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: amiodarona (Nexterone, Pacerone); atorvastatina (Lipitor, en Caduet); carbamazepina (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); digoxina (Lanoxin); efavirenz (Sustiva, en Atripla); oxcarbazepina (Oxtellar, Trileptal); fenobarbital; fenitoína (Dilantin, Phenytek); inhibidores de la bomba de protones como dexlansoprazol (Dexilant), esomeprazol (Nexium, en Vimovo), lansoprazol (Prevacid, en Prevpac), omeprazol (Prilosec, Zegerid), pantoprazol (Protonix) y rabeprazol (AcipHex); rifabutina (Mycobutin); rifampicina (Rifadin, Rimactane, en Rifamate, Rifater); rifapentina (Priftin); rosuvastatina (Crestor); tenofovir DF (Viread, en Atripla, Complera, Stribild, Truvada, otros); tipranavir (Aptivus) cuando se toma con ritonavir (Norvir); topotecán (Hycamtin); y warfarina (Coumadin, Jantoven). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios. Muchos otros medicamentos también pueden interactuar con sofosbuvir y velpatasvir, así que asegúrese de informar a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando, incluso los que no aparecen en esta lista.
- si está tomando antiácidos, tómelos 4 horas antes o 4 horas después de sofosbuvir y velpatasvir.
- Informe a su médico si está tomando algún medicamento para la indigestión, la acidez estomacal o las úlceras (H2 bloqueadores) como cimetidina, ranitidina (Zantac), famotidina (Pepcid, en Duexis) o nizatidina. Su médico puede indicarle que tome este medicamento 12 horas antes o 12 horas después de sofosbuvir y velpatasvir, o al mismo tiempo que toma sofosbuvir y velpatasvir.
- dígame a su médico qué productos a base de hierbas está tomando, especialmente hierba de San Juan.
- informe a su médico si tiene el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o si tiene o alguna vez ha tenido algún tipo de problema hepático que no sea hepatitis C.
- informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada mientras toma sofosbuvir y velpatasvir, llame a su médico.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

El sofosbuvir y el velpatasvir pueden causar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

- erupción
- falta de energía
- sentirse irritable
- sentirse deprimido

El sofosbuvir y el velpatasvir pueden ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o por teléfono (1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea en <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

- Epclusa®

Última revisión - 15/05/2020

[Aprende a citar esta página](#)



[Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad](#)

SAIA® Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022