



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Domicile](#) → [Médicaments, herbes et suppléments](#) → Sofosbuvir et Velpatasvir

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616034.html>

Sofosbuvir et Velpatasvir

prononcé comme (soe fos' bue vir) (vel pat' comme vir)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

Vous pouvez déjà être infecté par l'hépatite B (un virus qui infecte le foie et peut causer de graves dommages au foie), mais ne présentez aucun symptôme de la maladie. Dans ce cas, la prise de l'association sofosbuvir et velpatasvir peut augmenter le risque que votre infection devienne plus grave ou potentiellement mortelle et que vous développiez des symptômes. Informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une infection par le virus de l'hépatite B. Votre médecin vous prescrira un test sanguin pour voir si vous avez ou avez déjà eu une infection à l'hépatite B. Votre médecin vous surveillera également pour déceler tout signe d'infection par le virus de l'hépatite B pendant et pendant plusieurs mois après votre traitement. Si nécessaire, votre médecin pourra vous prescrire des médicaments pour traiter cette infection avant et pendant votre traitement par l'association sofosbuvir et velpatasvir.

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin peut prescrire certains tests avant, pendant et après votre traitement pour vérifier la réponse de votre corps à l'association de sofosbuvir et de velpatasvir.

Discutez avec votre médecin des risques liés à la prise de l'association sofosbuvir et velpatasvir.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'association de sofosbuvir et de velpatasvir est utilisée seule ou avec la ribavirine (Copegus, Rebetol, Ribasphere) pour traiter l'hépatite C chronique (une infection virale en cours qui endommage le foie) chez les adultes et les enfants de 6 ans et plus ou qui pèsent au moins 37 livres (17 kg). Le sofosbuvir appartient à une classe de médicaments antiviraux appelés inhibiteurs nucléotidiques de la polymérase NS5B du virus de l'hépatite C (VHC). Le velpatasvir appartient à une classe de médicaments antiviraux appelés inhibiteurs du complexe de réplication NS5A du VHC. La combinaison de sofosbuvir et de velpatasvir agit en empêchant le virus responsable de l'hépatite C de se propager à l'intérieur du corps.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'association du sofosbuvir et du velpatasvir se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale. Il est généralement pris avec ou sans nourriture une fois par jour pendant 12 semaines. Prenez le sofosbuvir et le velpatasvir à peu près à la même heure chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez le sofosbuvir et le velpatasvir exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Continuez à prendre le sofosbuvir et le velpatasvir même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre le sofosbuvir et le velpatasvir sans en parler à votre médecin.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demandez à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre le sofosbuvir et le velpatasvir,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au sofosbuvir, au velpatasvir, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients contenus dans les comprimés de sofosbuvir et de velpatasvir. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.
- informez votre médecin et votre pharmacien des médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines et des suppléments nutritionnels que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : amiodarone (Nexterone, Pacerone); atorvastatine (Lipitor, dans Caduet); carbamazépine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); digoxine (Lanoxine); éfavirenz (Sustiva, dans Atripla); oxcarbazépine (Oxtellar, Trileptal); phénobarbital; phénytoïne (Dilantin, Phenytek); les inhibiteurs de la pompe à protons tels que le dexlansoprazole (Dexilant), l'ésoméprazole (Nexium, dans Vimovo), le lansoprazole (Prevacid, dans Prevpac), l'oméprazole (Prilosec, Zegerid), le pantoprazole (Protonix) et le rabéprazole (AcipHex) : la rifabutine (Mycobutin) ; rifampicine (Rifadin, Rimactane, dans Rifamate, Rifater); rifapentine (Priftin); rosuvastatine (Crestor); ténofovir DF (Viread, dans Atripla, Complera, Stribild, Truvada, autres); le tipranavir (Aptivus) lorsqu'il est pris avec le ritonavir (Norvir); topotécan (Hycamtin); et la warfarine (Coumadin, Jantoven). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec le sofosbuvir et le velpatasvir, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste.
- si vous prenez des antiacides, prenez-les 4 heures avant ou 4 heures après le sofosbuvir et le velpatasvir.
- informez votre médecin si vous prenez un médicament contre l'indigestion, les brûlures d'estomac ou les ulcères (H2 bloquants) tels que la cimétidine, la ranitidine (Zantac), la famotidine (Pepcid, dans Duexis) ou la nizatidine. Votre médecin peut vous dire de prendre ce médicament 12 heures avant ou 12 heures après le sofosbuvir et le velpatasvir, ou en même temps que vous prenez le sofosbuvir et le velpatasvir.
- dites à votre médecin quels produits à base de plantes vous prenez, en particulier le millepertuis.
- informez votre médecin si vous avez le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou si vous avez ou avez déjà eu un problème hépatique autre que l'hépatite C.
- informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez du sofosbuvir et du velpatasvir, appelez votre médecin.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Le sofosbuvir et le velpatasvir peuvent provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

- éruption
- manque d'énergie
- se sentir irritable
- se sentir déprimé

Le sofosbuvir et le velpatasvir peuvent provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez ce médicament.

Si vous ressentez un effet indésirable grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne sur <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

- Epcluse®

Dernière révision - 15/05/2020

[Apprenez à citer cette page](#)



[Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.](#)

AHFS® Renseignements pour les patients sur les médicaments MC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisée par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022