Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607051.html

Sorafenibe

pronunciado como (soe raf' e nib)

por que este medicamento é prescrito?

O sorafenibe é usado para tratar o carcinoma de células renais avançado (CCR; um tipo de câncer que começa nos rins). O sorafenibe também é usado para tratar o carcinoma hepatocelular (um tipo de câncer de fígado) que não pode ser tratado com cirurgia e um certo tipo de câncer de tireoide que se espalhou para outras partes do corpo e não pode ser tratado com iodo radioativo. O sorafenibe está em uma classe de medicamentos chamados inibidores da quinase. Funciona bloqueando a ação de uma proteína anormal que sinaliza as células cancerígenas para se multiplicarem. Isso ajuda a impedir a propagação de células cancerígenas.

como este medicamento deve ser usado?

Sorafenib vem como um comprimido para tomar por via oral. Geralmente é tomado duas vezes ao dia. O sorafenib é tomado sem alimentos, 1 hora antes ou 2 horas após uma refeição. Tome sorafenibe aproximadamente no mesmo horário todos os dias. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome sorafenibe exatamente como indicado. Não tome mais ou menos ou tome com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Engula os comprimidos inteiros com água. Não os parta, mastigue ou esmague.

O seu médico pode diminuir a sua dose de sorafenib durante o tratamento, ou pode dizer-lhe para parar de tomar sorafenib temporariamente ou permanentemente por um período de tempo se sentir efeitos secundários. Certifique-se de informar o seu médico como você está se sentindo durante o tratamento com sorafenibe.

Continue a tomar sorafenib mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar sorafenib sem falar com o seu médico.

Sorafenibe não está disponível em farmácias. Você só pode obter sorafenibe pelo correio em uma farmácia especializada. Pergunte ao seu médico se você tiver alguma dúvida sobre como receber sua medicação.

Peça ao seu farmacêutico ou médico uma cópia das informações do fabricante para o paciente.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar sorafenibe,

- informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico ao sorafenibe, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos ingredientes dos comprimidos de sorafenibe. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.
- informe o seu médico se você tem câncer de pulmão e está recebendo tratamento com carboplatina (Paraplatin) e paclitaxel (Abraxane, Onxol, Taxol) ou gemcitabina (Gemzar) e cisplatina (Platinol). Seu médico provavelmente lhe dirá para não tomar sorafenibe se você tiver câncer de pulmão e estiver recebendo esses medicamentos.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas e suplementos nutricionais que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: certos medicamentos para arritmias, como amiodarona (Nexterone, Pacerone), dofetilide (Tikosyn), dronedarone (Multaq), procainamida, quinidina (em Nuedexta) e sotalol (Betapace, Sorine, Sotylize); anticoagulantes (diluentes do sangue) tais como varfarina (Coumadin, Jantoven); carbamazepina (Equetro, Tegretol, Teril); dexametasona; ibutilida (Corvert); irinotecano (Camptosar); neomicina; fenobarbital; fenitoína (Dilantin, Phenytek); rifabutina (Micobutina); ou rifampicina (Rifadin, Rimactane). Muitos outros medicamentos também podem interagir com o sorafenibe, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo aqueles que não aparecem nesta lista.
- informe ao seu médico quais produtos à base de plantas você está tomando, especialmente a erva de São João.
- informe o seu médico se você tem ou já teve pressão alta, problemas de sangramento, dor no peito, problemas cardíacos, prolongamento do intervalo QT (um ritmo cardíaco irregular que pode levar a desmaios, perda de consciência, convulsões ou morte súbita), níveis baixos de potássio, cálcio ou magnésio no sangue, batimentos cardíacos irregulares, insuficiência cardíaca, problemas renais que não sejam câncer de rim ou problemas de fígado que não sejam câncer de fígado.
- informe o seu médico se estiver grávida ou planeia engravidar. Você terá que fazer um teste de gravidez antes de iniciar o tratamento. Se você é uma mulher que pode engravidar, você deve usar métodos contraceptivos eficazes durante o tratamento e por 6 meses após a dose final. Se você é homem e tem uma parceira que pode engravidar, você deve usar métodos contraceptivos eficazes durante o tratamento e por 3 meses após a dose final. Converse com seu médico sobre métodos de controle de natalidade que funcionarão para você. Se engravidar enquanto estiver a tomar sorafenib, contacte o seu médico imediatamente. O sorafenibe pode prejudicar o feto.
- informe o seu médico se estiver a amamentar ou planeia amamentar. Não deve amamentar enquanto estiver a tomar sorafenib e durante 2 semanas após a sua dose final.
- se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a tomar sorafenib.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Pule a dose esquecida e continue seu esquema de dosagem regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

O sorafenibe pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- cansaço
- fraqueza
- vermelhidão da pele
- perda de cabelo
- coceira
- pele seca ou descamação
- perda de apetite
- constipação
- diarréia
- boca seca
- perda de peso
- dor nas articulações
- dormência, dor ou formigamento nas mãos ou pés
- dor de cabeça

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu médico imediatamente:

- hematomas ou sangramentos incomuns
- fezes pretas e/ou alcatroadas
- sangue vermelho nas fezes
- vômito sangrento
- vomitando material que se parece com borra de café
- febre
- dor de estômago severa
- náusea
- vômito
- dor no peito
- falta de ar
- tontura ou desmaio
- suor excessivo
- batimentos cardíacos rápidos, acelerados ou irregulares
- dor de cabeça forte repentina

- confusão
- mudanças na visão
- convulsões
- irritação na pele
- vermelhidão, dor, inchaço ou bolhas nas palmas das mãos ou solas dos pés
- bolhas e descamação da pele
- urticária
- coceira
- vermelhidão da pele
- aftas
- urina escura
- amarelecimento da pele ou olhos
- dor na parte superior direita do estômago

O sorafenibe pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

- diarréia
- erupção cutânea ou outros problemas de pele

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico irá pedir alguns exames laboratoriais para verificar a resposta do seu corpo ao sorafenib. O seu médico também irá verificar a sua pressão arterial todas as semanas durante as primeiras seis semanas do seu tratamento e depois de tempos a tempos, conforme necessário.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Deve trazer esta lista consigo sempre que visitar um médico ou se for internado num hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Nexavar®

Última revisão - 15/02/2019

Saiba como citar esta página

Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022