Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : Medicines Org UK

TARGOCID 200 mg toz

çözünen ti üzerindef Ör in enjeksiyon/infüzyon veya oral solüsyon

T ID®400 mg toz

enjeksiyon/infüzyon veya oral solüsyon için solüsyon

teikoplanin

SANOFI

Bunu görmek veya okumak zor mu?
Yardım için telefon 0800 035 2525

Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı size vermeden önce tüm bu bilgileri dikkatlice okuyunuz.

- Bunu sakla. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Başka sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.
- Herhangi bir yan etki görürseniz doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu Lea et'te listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

Bu lea et'te ne var?

1. TARGOCİD nedir ve ne için kullanılır?
2. Targocid almadan önce bilmeniz gerekenler
3. Targocid nasıl kullanılır
4. Olası yan etkiler
5. Targocid nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. TARGOCİD nedir ve ne için kullanılır?

Targocid bir antibiyotiktir. 'Teikoplanin' adı verilen bir ilaç içerir. Vücudunuzdaki enfeksiyonlara neden olan bakterileri öldürerek çalışır.

Targocid yetişkinlerde ve çocuklarda (yeni doğan bebekler dahil) aşağıdakilerin bakteriyel enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır:

- cilt ve derinin altı - bazen 'yumuşak doku' olarak adlandırılır
- kemikler ve eklemler
- akciğer
- idrar yolu
- kalp - bazen 'endokardit' olarak adlandırılır
- karın duvarı - peritonit
- yukarıda listelenen koşullardan herhangi birinin neden olduğu kan

Targocid, neden olduğu bazı enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılabilir.*Clostridium di cile*"bağırsaktaki bakteriler. Bunun için solüsyon ağızdan alınır.

2. Targocid almadan önce bilmeniz gerekenler

Targocid'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- teikoplanine veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine alerjiniz varsa (bölüm 6'da listelenmiştir).

Uyarılar ve önlemler

Aşağıdaki durumlarda TARGOCİD almadan önce doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz:

- 'vankomisin' adı verilen bir antibiyotiğe alerjiniz varsa
- vücudunuzun üst kısmında bir kasılma olduysa (kırmızı adam sendromu)
- trombosit sayısında azalma (trombositopeni) varsa
- böbrek problemleriniz var
- İşitme sorunlarına ve/veya böbrek sorunlarına neden olabilecek başka ilaçlar alıyorsanız. Böbreklerinizin ve/veya karaciğerinizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için düzenli testler yaptırabilirsiniz ("Diğer ilaçlar ve Targocid" bölümüne bakınız).

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse (veya emin değilseniz), TARGOCİD almadan önce doktorunuzla, eczacınızla veya hemşirenizle konuşun.

Teikoplanin kullanımı ile Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, eozinofili ve sistemik semptomlar (DRESS) ile ilaç reaksiyonu (DRESS), akut jeneralize ekzantematöz püstüloz (AGEP) dahil olmak üzere ciddi cilt reaksiyonları bildirilmiştir. Bölüm 4'te açıklandığı gibi ciddi bir kızarıklık veya başka cilt semptomları geliştirirseniz, TARGOCİD almayı bırakın ve derhal doktorunuzla iletişime geçin veya tıbbi yardım isteyin.

testler

Tedavi sırasında kanınızı, böbreklerinizi, karaciğerinizi ve/veya işitme duyunuzu kontrol etmek için testler yaptırabilirsiniz. Bu, aşağıdaki durumlarda daha olasıdır:

- tedaviniz uzun sürecek
- yüksek yükleme dozlarıyla tedavi edilmeniz gerekiyor (günde iki kez 12mg/kg)
- böbrek probleminiz var
- sinir sisteminizi, böbreklerinizi veya işitme duyunuzu etkileyebilecek başka ilaçlar alıyorsanız veya alıyorsanız.

Uzun süre TARGOCİD verilen kişilerde antibiyotikten etkilenmeyen bakteriler normalden fazla çoğalabilir - doktorunuz bunu kontrol edecektir.

Diğer ilaçlar ve Targocid

Başka ilaçlar kullanıyorsanız, yakın zamanda kullandıysanız veya kullanabilecekseniz doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize söyleyiniz. Bunun nedeni, Targocid'in diğer bazı ilaçların çalışma şeklini etkileyebilmesidir. Ayrıca bazı ilaçlar Targocid'in çalışma şeklini etkileyebilir. Özellikle aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize söyleyiniz:

- Aminoglikozidler aynı enjeksiyonda Targocid ile karıştırılmamalıdır. Ayrıca işitme sorunlarına ve/veya böbrek sorunlarına da neden olabilirler.
- amfoterisin B - işitme sorunlarına ve/veya böbrek sorunlarına neden olabilen mantar enfeksiyonlarını tedavi eden bir ilaç
- siklosporin - işitme sorunlarına ve/veya böbrek sorunlarına neden olabilecek bağışıklık sistemini etkileyen bir ilaç
- sisplatin - işitme sorunlarına ve/veya böbrek sorunlarına neden olabilen kötü huylu tümörleri tedavi eden bir ilaç
- su tabletleri (furosemid gibi) – işitme sorunlarına ve/veya böbrek sorunlarına neden olabilen 'diüretik' olarak da adlandırılır.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse (veya emin değilseniz), TARGOCİD almadan önce doktorunuzla, eczacınızla veya hemşirenizle konuşun.

Hamilelik, emzirme ve doğurganlık

Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı vermeden önce doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışınız. Bu ilacın size hamileyken verilip verilmeyeceğine onlar karar vereceklerdir. Potansiyel bir iç kulak ve böbrek problemleri riski olabilir.

Emziriyorsanız, bu ilacı vermeden önce doktorunuza söyleyiniz. Targocid size verilirken emzirmeye devam edip edemeyeceğiniz o karar verecektir. Hayvan üreme çalışmaları, doğurganlık sorunlarına dair kanıt göstermedi.

Araç ve makine kullanma

Targocid ile tedavi edilirken baş ağrınız olabilir veya başınız dönebilir. Böyle bir durumda araç veya herhangi bir alet veya makine kullanmayınız.

Targocid sodyum içerir

Bu ilaç, flakon başına 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum içerir ve esasen "sodyum içermez".

3. Targocid nasıl kullanılır

Önerilen doz

Böbrek problemi olmayan yetişkinler ve çocuklar (12 yaş ve üzeri)

Deri ve yumuşak doku, akciğer ve idrar yolu enfeksiyonları

- Başlangıç dozu (ilk üç doz için): Bir damar veya kasa enjeksiyon yoluyla 12 saatte bir vücut ağırlığının her kilogramı için 6 mg
- İdame dozu: Günde bir kez, bir damar veya kas içine enjeksiyon yoluyla verilen, vücut ağırlığının her kilogramı için 6 mg

Kemik ve eklem enfeksiyonları ve kalp enfeksiyonları

- Başlangıç dozu (ilk üç ila beş doz için): 12 saatte bir damara enjeksiyon yoluyla vücut ağırlığının her kilogramı için 12 mg
- İdame dozu: günde bir kez vücut ağırlığının her kilogramı için damar veya kasa enjeksiyon yoluyla 12 mg

Enfeksiyonun neden olduğu '*Clostridium di cile*' bakteri

Önerilen doz, 7 ila 14 gün boyunca günde iki kez ağızdan 100 ila 200 mg'dır.

Böbrek sorunları olan yetişkinler ve yaşlı hastalar Böbrek problemleriniz varsa, genellikle tedavinin dördüncü gününden sonra dozunuzun düşürülmesi gerekecektir:

- Hafif ve orta derecede böbrek sorunları olan kişiler için - idame dozu iki günde bir veya idame dozunun yarısı günde bir kez verilecektir.
- Şiddetli böbrek sorunları olan veya hemodiyalizde olan kişiler için - idame dozu her üç günde bir veya idame dozunun üçte biri günde bir kez verilecektir.

Periton diyalizi hastaları için peritonit

Başlangıç dozu, bir damara tek bir enjeksiyon olarak vücut ağırlığının her kilogramı için 6 mg'dır ve ardından:

- Birinci hafta: Her diyaliz torbasında 20 mg/L
- İkinci hafta: Diğer her diyaliz torbasında 20 mg/L
- Üçüncü hafta: Gecelik diyaliz torbasında 20 mg/L.

Bebekler (doğumdan 2 aya kadar)

- Başlangıç dozu (ilk gün): Damar içine infüzyon yoluyla vücut ağırlığının her kilogramı için 16 mg.
- İdame dozu: Günde bir kez, bir damara infüzyon yoluyla verilen, vücut ağırlığının her kilogramı için 8 mg.

Çocuklar (2 aydan 12 yaşına kadar)

- Başlangıç dozu (ilk üç doz için): Bir damara enjeksiyon yoluyla 12 saatte bir vücut ağırlığının her kilogramı için 10 mg.
- İdame dozu: Günde bir kez, bir damara enjeksiyon yoluyla verilen, vücut ağırlığının her kilogramı için 6 ila 10 mg.

Targocid nasıl verilir

İlaç normalde size bir doktor veya hemşire tarafından verilecektir.

- Damar (damar içi kullanım) veya kas (kas içi kullanım) içine enjeksiyon yoluyla verilecektir.
- Damar içine damlatılarak infüzyon şeklinde de verilebilir.

Bebeklere doğumdan 2 aylık olana kadar sadece infüzyon verilmelidir.

Bazı enfeksiyonları tedavi etmek için çözelti ağızdan alınabilir (ağızdan kullanım).

Kullanmanız gerekenden daha fazla Targocid kullandıysanız

Doktorunuz veya hemşirenizin size çok fazla ilaç vermesi olası değildir. Ancak, size çok fazla Targocid verildiğini düşünüyorsanız veya ajite iseniz, hemen doktorunuz veya hemşirenizle konuşun.

Targocid almayı unutursanız

Doktorunuz veya hemşireniz size Targocid'i ne zaman vereceğinize dair talimatlara sahip olacaktır. Size ilacı reçete edildiği gibi vermeyecekleri olası değildir. Ancak, endişeleniyorsanız, doktorunuz veya hemşirenizle konuşun.

Targocid almayı bırakırsanız

İlk önce doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşmadan bu ilacı almayı bırakmayınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak herkes bunları almayabilir.

Ciddi yan etkiler

Aşağıdaki ciddi yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, tedavinizi durdurun ve hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyin - acil tıbbi tedaviye ihtiyacınız olabilir:

yaygın olmayan(100 kişide 1 kişiye kadar etki edebilir)

- yaşamı tehdit eden ani alerjik reaksiyon - belirtiler şunları içerebilir: nefes almada veya hırıltılı solunumda zorluk, şişme, kızarıklık, kaşıntı, ateş, titreme

Nadir(1000 kişide 1 kişiye kadar etki edebilir)

- üst gövdenin hareket etmesi

Bilinmeyen(frekans mevcut verilerden tahmin edilemez)

- deride, ağızda, gözlerde veya cinsel organlarda kabarcıklar - bunlar 'toksik epidermal nekroliz' veya 'Stevens-Johnson sendromu' olarak adlandırılan bir şeyin belirtileri olabilir
- deri altında şişlikler (cilt kıvrımlarınız, göğüs, karın (mide dahil), sırt ve kollar dahil) ile birlikte kırmızı pullu yaygın döküntü ve ateşin eşlik ettiği kabarcıklar - bunlar 'Akut jeneralize ekzantematöz püstüloz (AGEP)' adı verilen bir şeyin belirtileri olabilir. '
- 'eozinofili ve sistemik semptomlarla (DRESS) ilaç reaksiyonu'. DRESS, başlangıçta u benzeri semptomlar ve yüzde kızarıklık olarak ortaya çıkar, ardından yüksek sıcaklıkta uzun süreli bir kızarıklık, kan testlerinde görülen karaciğer enzimlerinde artış ve bir tür beyaz kan hücresi (eozinofili) ve genişlemiş lenf düğümlerinde artış görülür.

Yukarıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

Aşağıdaki ciddi yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz - acil tıbbi tedaviye ihtiyacınız olabilir:

yaygın olmayan(100 kişide 1 kişiye kadar etki edebilir)

- damarda şişme ve pıhtılaşma
- nefes almada veya hırıltılı solunumda zorluk (bronkospazm)
- normalden daha fazla enfeksiyon kapma - bunlar kan hücresi sayınızda azalma belirtileri olabilir

Bilinmeyen(frekans mevcut verilerden tahmin edilemez)

- beyaz kan hücrelerinin eksikliği - belirtiler şunları içerebilir: ateş, şiddetli titreme, boğaz ağrısı veya ağız ülseri (agranülositoz)
- böbrek sorunları veya böbreklerinizin çalışma biçimindeki değişiklikler - testlerde gösterilir. Daha yüksek dozlar alırsanız böbrek problemlerinin sıklığı veya şiddeti artabilir.
- epileptik ts

Yukarıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

Diğer yan etkiler

Aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz:

Yaygın(10 kişiden 1'i etkileyebilir)

- Döküntü, eritem, kaşıntı
- Ağrı
- Ateş

yaygın olmayan(100 kişide 1 kişiye kadar etki edebilir)

- trombosit sayısında azalma.
- karaciğer enzimlerinin kan seviyelerinde yükselme
- kan kreatinin seviyelerinde yükselme (böbreğinizi izlemek için)
- işitme kaybı, kulak çınlaması veya sizin veya etrafınızdaki şeylerin hareket ettiği hissi
- hissetme veya hasta olma (kusma), ishal
- baş dönmesi veya baş ağrısı hissi

Nadir(1.000 kişide 1'e kadar etkileyebilir)

- enfeksiyon (apse).

Bilinmeyen(frekans mevcut verilerden tahmin edilemez)

- Enjeksiyonun yapıldığı yerdeki problemler - deride kızarıklık, ağrı veya şişlik gibi

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki görürseniz doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu Lea et'te listelenmeyen olası yan etkileri içerir.

Birleşik Krallık

Yan etkileri ayrıca www.mhra.gov.uk/yellowcard adresindeki Sarı Kart Şeması aracılığıyla doğrudan bildirebilir veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Sarı Kart arayabilirsiniz. Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlanmasına yardımcı olabilirsiniz.

5. Targocid nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın. EXP'den sonra bu ilacı, flakonun kartonu ve etiketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.

Bu ilaç herhangi bir özel saklama koşulu gerektirmez.

Targocid sulandırıldıktan ve kullanıma hazır hale getirildikten sonra saklama ve kullanım zamanı hakkında bilgiler, 'Targocid'in hazırlanması ve kullanımı hakkında sağlık uzmanları için pratik bilgiler' bölümünde açıklanmıştır.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Targocid ne içerir?

- Etkin madde teikoplanindir. Her flakon 200 mg veya 400 mg teikoplanin içerir.
- Diğer bileşenler sodyum klorür ve sodyum hidroksittir.

Targocid neye benziyor ve paketin içeriği

Targocid, enjeksiyon/infüzyon veya oral solüsyon için bir tozdur.

Toz süngerimsi, fildişi ve renkli homojen bir kütledir.

Toz paketlenmiştir:

- Tip I, bromobütil kauçuk tıpa ve plastik ip-o üst alüminyum sarı kapak ile kapatılmış 200 mg için 10 mL faydalı hacimli renksiz cam flakonda.
- Tip I, bromobütil kauçuk tıpa ve plastik ip-o üst alüminyum yeşil kapak ile kapatılmış 400 mg için 22 mL faydalı hacimli renksiz cam flakonda.

Paket boyutu:

- 1 toz şişesi
- 5x1 toz şişeler
- 10x1 toz şişeler
- 25x1 toz şişeler

Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

Ruhsat Sahibi ve Üretici

Pazarlama Yetki Sahibi Sano , 410
Thames Valley Park Drive, Reading,
Berkshire, RG6 1PT, Birleşik Krallık.
Tel: 0800 035 2525
e- posta: uk-medicalinformation@sano .com

Üretici firma
Sano Srl, Via Valcanello 4
03012 Anagni (FR), İtalya

Bu tıbbi ürün, EEA Üye Devletlerinde aşağıdaki isimler altında ruhsatlandırılmıştır: Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık: Targocid

Bu lea et en son 12/2021'de revize edilmiştir.

Aşağıdaki bilgiler yalnızca tıp veya sağlık uzmanlarına yöneliktir:

Sağlık uzmanları için Targocid'in hazırlanması ve kullanımı hakkında pratik bilgiler.

Bu ilaç sadece tek kullanımlıktır.

Uygulama yöntemi

Sulandırılmış çözelti doğrudan enjekte edilebilir veya alternatif olarak daha fazla seyreltilebilir.

Enjeksiyon, ya 3 ila 5 dakikalık bir bolus olarak ya da 30 dakikalık bir infüzyon olarak verilecektir.

Bebeklere doğumdan 2 aylık olana kadar sadece infüzyon verilmelidir.

Sulandırılmış çözelti ağızdan da verilebilir.

Sulandırılmış çözeltinin hazırlanması

200 mg ve 400 mg toz flakona 3.14 mL enjeksiyonluk su eklenerek solüsyon sulandırılır. Su, köpürmeyi önlemek için tüm toz eriyene kadar döndürülmesi gereken şişeye yavaş yavaş eklenir. Köpük oluşursa, köpüğün kaybolması için solüsyonu yaklaşık 15 dakika bekletin.

Sadece berrak solüsyonlar kullanılmalıdır.

Çözeltinin rengi sarımsıdan koyu sarıya kadar değişebilir.

Nihai çözelti, plazma ile izotoniktir ve pH'ı 7.2-7.8'dir.

Şişenin nominal teikoplanin içeriği	200 mg	400 mg
Toz flakon hacmi	10 ml	22 ml
Nominal teikoplanin dozunu içeren hacim (5 mL şırınga ve 23 G iğne ile ekstrakte edilmiştir)	3,0 mL	3,0 mL

Seyreltilmiş çözeltinin infüzyondan önce hazırlanması Targocid, aşağıdaki infüzyon çözeltilerinde uygulanabilir:

- sodyum klorür 9 mg/mL (%0,9) solüsyon
- Zil sesi çözümü
- Ringer-laktat solüsyonu
- %5 dekstroz enjeksiyonu
- %10 dekstroz enjeksiyonu
- %0,18 sodyum klorür ve %4 glikoz solüsyonu
- %0.45 sodyum klorür ve %5 glikoz solüsyonu
- %1,36 veya %3,86 glikoz solüsyonu içeren periton diyalizi solüsyonu.

Sulandırılmış çözeltinin raf ömrü

Önerilen şekilde hazırlanan sulandırılmış çözeltinin kimyasal ve fiziksel kullanım stabilitesi 2 ila 8°C'de 24 saat gösterilmiştir.

Mikrobiyolojik açıdan ilaç hemen kullanılmalıdır. Hemen kullanılmazsa, kullanım sırasındaki saklama süreleri ve kullanımdan önceki koşullar kullanıcının sorumluluğundadır ve sulandırma kontrollü ve onaylanmış aseptik koşullarda gerçekleştirilmediği sürece normalde 2 ila 8°C'de 24 saatten uzun olmayacaktır.

Seyreltilmiş ilacın raf ömrü

Önerilen şekilde hazırlanan sulandırılmış çözeltinin kimyasal ve fiziksel kullanım stabilitesi 2 ila 8°C'de 24 saat gösterilmiştir.

Mikrobiyolojik açıdan ilaç hemen kullanılmalıdır. Hemen kullanılmazsa, kullanımdaki saklama süreleri ve kullanımdan önceki koşullar kullanıcının sorumluluğundadır ve sulandırma/seyreltme kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullarda gerçekleştirilmediği sürece normalde 2 ila 8°C'de 24 saatten uzun olmayacaktır. .

İmha etmek

Kullanılmayan herhangi bir ilaç veya atık malzeme yerel gerekliliklere uygun olarak atılmalıdır.