

[Huis](#) → [Medicijnen, kruiden en supplementen](#) → Telbivudine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL van deze pagina: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607045.html>

Telbivudine

uitgesproken als (tel biv' u deen)

Merk op:

Telbivudine is niet langer beschikbaar in de VS. Als u momenteel telbivudine gebruikt, dient u uw arts te bellen om over te stappen op een andere behandeling.

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Telbivudine kan ernstige of levensbedreigende schade aan de lever veroorzaken en een aandoening die lactaatacidose wordt genoemd (ophoping van een zuur in het bloed). Vertel het uw arts als u veel alcohol drinkt of ooit heeft gedronken, als u injecteerbare straatdrugs gebruikt of ooit heeft gebruikt, en als u levercirrose (littekenvorming) of een andere leverziekte dan hepatitis B heeft of ooit heeft gehad. Vertel het uw arts en apotheker als u de volgende medicijnen gebruikt of heeft gebruikt: paracetamol (Tylenol, andere); cholesterolverlagende medicijnen (statines); ijzer producten; isoniazide (INH, Nydraside); medicijnen voor de behandeling van het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) of het verworven immunodeficiëntiesyndroom (aids); methotrexaat (Rheumatrex); niacine (nicotinezuur); of rifampicine (Rifadin, Rimactane). Als u een van de volgende symptomen ervaart, bel onmiddellijk uw arts: geel worden van de huid of ogen; donkergekleurde urine; lichtgekleurde stoelgang; moeite met ademen; buikpijn; of zwelling; misselijkheid; braken; ongebruikelijke spierpijn; verlies van eetlust gedurende ten minste enkele dagen; gebrek aan energie; extreme zwakte of vermoeidheid; het koud hebben, vooral in de armen of benen; duizeligheid of duizeligheid; of snelle of onregelmatige hartslag.

Stop niet met het innemen van telbivudine zonder met uw arts te overleggen. Als u stopt met het innemen van telbivudine, kan uw hepatitis verergeren. Dit is het meest waarschijnlijk gedurende de eerste paar maanden nadat u bent gestopt met het innemen van telbivudine. Zorg ervoor dat u geen doses overslaat of dat u geen telbivudine meer heeft. Vul uw recept minimaal 5 dagen voordat u verwacht dat u de nieuwe voorraad medicijnen nodig heeft bij. Als u een van de volgende symptomen ervaart nadat u bent gestopt met het innemen van telbivudine, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts: extreme vermoeidheid, zwakte, misselijkheid, braken, verlies van eetlust, gele verkleuring van de huid of ogen, donkergekleurde urine of lichtgekleurde stoelgang.

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium voor, tijdens en na uw behandeling met telbivudine. Uw arts zal bepaalde tests bestellen om de reactie van uw lichaam op telbivudine te controleren

gedurende deze periode.

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van telbivudine.

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Telbivudine wordt gebruikt voor chronische (langdurige) hepatitis B-infectie (zwellen van de lever veroorzaakt door een virus) bij mensen die ook tekenen van leverbeschadiging kunnen vertonen. Telbivudine zit in een klasse van medicijnen die nucleoside-analogen worden genoemd. Het werkt door de hoeveelheid hepatitis B-virus (HBV) in het lichaam te verminderen. Telbivudine geneest hepatitis B niet en kan complicaties van chronische hepatitis B, zoals levercirrose of leverkanker, mogelijk niet voorkomen. Telbivudine voorkomt niet de verspreiding van hepatitis B naar andere mensen via seksueel contact, het delen van naalden of contact met bloed.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Telbivudine wordt geleverd als tablet om via de mond in te nemen. Het wordt gewoonlijk eenmaal per dag ingenomen, met of zonder voedsel. Neem telbivudine elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem telbivudine precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Vraag uw apotheker of arts om een kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u telbivudine inneemt,

- vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor telbivudine of voor andere medicijnen.
- vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u de medicijnen vermeldt die worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWING en een van de volgende: chloroquine (Aralen); erytromycine (EES, E-Mycin, Erythrocin); fenofibraat (Antara, Lofibra, Triglide); gemfibrozil (Lopid); hydroxychloroquine (Plaquenil); medicijnen om afstoting van een getransplanteerd orgaan te voorkomen, zoals ciclosporine (Neoral, Sandimmune) of tacrolimus (Prograf); medicijnen om schimmelinfecties te behandelen, zoals fluconazol (Diflucan), itraconazol (Sporanox), ketoconazol (Nizoral), posaconazol (Noxafil) of voriconazol (Vfend); orale steroïden zoals dexamethason (Decadron, Dexone), methylprednisolon (Medrol) en prednison; (deltason), penicillamine (Cuprimine); probenecide; of zidovudine (AZT, Retrovir, in Combivir, in Trizivir). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen.
- Vertel het uw arts als u een levertransplantatie (operatie ter vervanging van een zieke lever) of nierziekte heeft of ooit heeft gehad.
- Vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u telbivudine gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Geef geen borstvoeding terwijl u telbivudine gebruikt.

- Als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u telbivudine gebruikt.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Telbivudine kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

- hoofdpijn
- diarree
- rug- of gewrichtspijn
- moeite met inslapen of doorslapen
- jeuk
- uitslag

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, of de symptomen die worden vermeld in de sectie BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

- spierpijn, pijn, zwakte of gevoeligheid

Telbivudine kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik van dit medicijn.

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, aangezien veel containers (zoals wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en

jonge kinderen kunnen ze gemakkelijk openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op: <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige (zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

- Tyzeka®

Laatst herzien - 15-05-2018

[Leer hoe u deze pagina kunt citeren](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS® Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022