Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

טריפלונומיד

מבוטא בתור (ter''i floo' noe mide)

אזהרה חשובה:

.עלול לגרום לנזק כבד חמור או מסכן חיים, שעלול לדרוש השתלת כבד. הסיכון לנזק לכבד עלול להיות מוגבר אצל אנשים הנוטלים תרופות אחרות הידועים כגורמות לנזק לכבד, ובאנשים שכבר סובלים ממחלת כבד. ספר לרופא שלך אם יש לך מחלת כבד. הרופא שלך עשוי לומר לך לא לקחת טריפלונומיד. ספר לרופא ולרוקח על כל התרופות שאתה נוטל כדי שיוכלו לבדוק אם כל אחת מהתרופות שלך עלולה להגביר את הסיכון שתפתח נזק לכבד במהלך הטיפול בטריפלונומיד. אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים, התקשר לרופא מיד: בחילות, הקאות, עייפות קיצונית, דימום או חבורות חריגות, חוסר אנרגיה, אובדן תיאבון, כאב בחלק הימני העליון של הבטן, הצהבה של העור או העיניים. , שתן בצבע כהה, או תסמינים דמויי שפעת. אם יש חשד לנזק לכבד, הרופא שלך עשוי להפסיק את הטריפלונומיד ועשוי לתת לך טיפול שיעזור להסיר את הטריפלונומיד מהר יותר מגופך Teriflunomide

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך והמעבדה. הרופא שלך יזמין בדיקות מסוימות לפני שתתחיל בטיפול ובאופן קבוע במהלך הטיפול כדי לבדוק את תגובת הגוף שלך ל-teriflunomide.

אין ליטול טריפלונומיד אם את בהריון או מתכננת להיכנס להריון. טריפלונומיד עלול להזיק לעובר. אין להתחיל ליטול טריפלונומיד עד שעשית בדיקת הריון עם תוצאות שליליות והרופא שלך אומר לך שאינך בהריון. עליך להשתמש בשיטה יעילה למניעת הריון לפני שתתחיל ליטול טריפלונומיד, במהלך הטיפול בטריפלונומיד ועד שנתיים לאחר הטיפול, עד שבדיקות דם מראות שיש לך רמות נמוכות מספיק של טריפלונומיד בדם. אם המחזור שלך מאוחר, אתה מחמיץ מחזור, או שאתה חושב שאתה עלול להיות בהריון במהלך הטיפול בטריפלונומיד או במשך שנתיים לאחר הטיפול, התקשר מיד לרופא שלך. אם אתה זכר ובן זוגך יכול להיכנס להריון, עליך ובן זוגך להשתמש באמצעי מניעה יעילים במהלך הטיפול.

הרופא או הרוקח שלך יספקו לך את גיליון המידע של היצרן למטופל (מדריך התרופות) כאשר תתחיל טיפול בטריפלונומיד ובכל פעם שתמלא מחדש את המרשם שלך. קרא את המידע בעיון ושאל את הרופא או הרוקח אם יש לך שאלות כלשהן. אתה יכול גם

בקר באתר מינהל המזון והתרופות (FDA) (/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]http://www.fda.gov) או באתר היצרן לקבלת מדריך התרופות.

שוחח עם הרופא שלך על הסיכונים בנטילת טריפלונומיד.

היי האם נרשמה תרופה זו?

:כולל)מחלה שבה העצבים אינם פועלים כראוי ואנשים עלולים לחוות חולשה, חוסר תחושה, אובדן קואורדינציה בשרירים ובעיות בראייה, דיבור ושליטה בשלפוחית השתן ;MS(משמש לטיפול במבוגרים עם צורות שונות של טרשת נפוצה Teriflunomide

- תסמונת מבודדת קלינית (CIS; אפיזודות של סימפטומים עצביים שנמשכים לפחות 24 שעות),
- צורות הפוגה-הפוגה (מהלך המחלה שבו התסמינים מתלקחים מעת לעת), או
- צורות פרוגרסיביות משניות (מהלך מחלה שבו הישנות מתרחשות לעתים קרובות יותר).

.הוא בקבוצה של תרופות הנקראות סוכנים אימונומודולטורים. חושבים שהוא פועל על ידי הפחתת דלקת והפחתת פעולתם של תאי חיסון שעלולים לגרום לנזק עצבי Teriflunomide

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

.מגיע כטבליה לנטילה דרך הפה. זה נלקח בדרך כלל פעם ביום עם או בלי אוכל. קח טריפלונומיד בערך באותה שעה בכל יום. עקוב אחר ההוראות על תווית המרשם שלך בקפידה, ובקש מהרופא או הרוקח שלך להסביר כל חלק שאינך מבין. קח טריפלונומיד בדיוק לפי ההוראות. אין ליטול יותר או פחות ממנו או לקחת אותו לעתים קרובות יותר ממה שרשם הרופא שלך Teriflunomide

.עשוי לסייע בשליטה על הסימפטומים של טרשת נפוצה, אך אינו מרפא אותה. המשך ליטול טריפלונומיד גם אם אתה מרגיש טוב. אל תפסיק ליטול טריפלונומיד מבלי לדבר עם הרופא שלך Teriflunomide

השימושים בתרופה זו

תרופה זו עשויה להירשם לשימושים אחרים; שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

לפני נטילת טריפלונומיד,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי לטריפלונומיד (פריחה, כוורות, קוצר נשימה, נפיחות של הפנים, העיניים, הפה, הגרון, הלשון, השפתיים, הידיים, הרגליים, הקרסוליים או הרגליים התחתונות), לפלונומיד (ערבה) , כל תרופה אחרת, או כל אחד מהמרכיבים בטבליות טריפלונומיד. שאל את הרוקח שלך או עיין במדריך התרופות לקבלת רשימה של המרכיבים.
- ספר לרופא שלך אם אתה נוטל לפלונומיד (ערבה). הרופא שלך כנראה יגיד לך לא לקחת טריפלונומיד אם אתה נוטל תרופה זו.

- ספר לרופא ולרוקח אילו עוד תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחים אתה נוטל או מתכוון לקחת. הקפד לציין את התרופות המפורטות בסעיף אזהרה חשובה וכל אחת מהאפשרויות הבאות: Lotronex(alosetron; נוגדי קרישה ('מדללי דם') כגון וורפרין (קומדין, ג'נוטון); atorvastatin (ליפיטור, בקאדואט); cefachlor; סימטידין (Tagamet); ציפרלקס (Cipro); Cymbalta(duloxetine; אלטרומבופג (פרומקטה); Lasix(furosemide; גפיטיניב (אירסה); קטופרופן; תרופות שעלולות לגרום לנזק עצבי כגון תרופות לסרטן, HIV או איידס; תרופות אחרות המדכאות את המערכת החיסונית כגון אזתיופרין (Azasan, Imuran)، ציקלוספורין (Gengraf, Neoral, Sandimmune)، סירולימוס (Rapamune) וטקרולימוס (XR, Prograf; (Astagraf, Envarsus)؛ Otrexup, Rasuvo, Trexall(methotrexate؛מיטוקסנטרון؛ Starlix(nateglinide؛ אמצעי מניעה דרך הפה (גלולות למניעת הריון)؛ Abraxane, Taxol(paclitaxel؛ פניצילין G؛ פיוגליטזון (Actos, ב-Actoplus Met, ב-Duetact)؛ Avandia(; rosuvastatin)Crestor(; בריפאמט, בריפאטר)؛ סימבסטטין (זוקור, ב-Vytorin)؛ תיאופילין (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl)، אחרים Pravachol(; repaglinide)pravastatin(פרנדין, בפרנדימט)؛ rifampin (Rifadin, Rimactane)، בריפאמט، בריפאטר)؛ Crestor(rosuvastatin)Avandia(؛ rosiglitazone؛ סימבסטטין (זוקור، ב-Vytorin)؛ תיאופילין (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl)، אחרים Pravachol(؛ repaglinide)pravastatin(פרנדין، בפרנדימט)؛ rifampin (Rifadin, Rimactane)، בריפאמט، בריפאטר)؛ Crestor(rosuvastatin)Avandia(؛ rosiglitazone؛ סימבסטטין (זוקור، ב-Vytorin)؛ תיאופילין (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl)، אחרים Zanaflex(؛ tizanidine;וזידובודין (רטרוביר، בקומביבר، בטריזיבר). ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את מינון התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי. תרופות רבות אחרות עשויות לקיים אינטראקציה עם טריפלונומיד، לכן הקפידו לספר לרופא על כל התרופות שאתם נוטלים، גם אלו שאינן מופיעות ברשימה זו. Trexall(؛ מיטוקסנטרון؛ Starlix(nateglinide؛ אמצעי מניעה דרך הפה (גלולות למניעת הריון)؛ Abraxane, Taxol(paclitaxel؛ פניצילין G؛ פיוגליטזון (Actos، ב-Actoplus Met، ב-Duetact)؛ Avandia(; rosuvastatin)Crestor(; בריפאמט، בריפאטר)؛ סימבסטטין (זוקור، ב-Vytorin)؛ תיאופילין (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl)، אחרים Pravachol(؛ repaglinide)pravastatin(פרנדין، בפרנדימט)؛ rifampin (Rifadin, Rimactane)، בריפאמט، בריפאטר)؛ Crestor(rosuvastatin)Avandia(؛ rosiglitazone؛ סימבסטטין (זוקור، ב-Vytorin)؛ תיאופילין (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl)، אחרים Zanaflex(؛ tizanidine;וזידובודין (רטרוביר، בקומביבר، בטריזיבר). ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את מינון התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי. תרופות רבות אחרות עשויות לקיים אינטראקציה עם טריפלונומיד، לכן הקפידו לספר לרופא על כל התרופות שאתם נוטלים، גם אלו שאינן מופיעות ברשימה זו. Trexall(؛ מיטוקסנטרון؛ Starlix(nateglinide؛ אמצעי מניעה דרך הפה (גלולות למניעת הריון)؛ Abraxane, Taxol(paclitaxel؛ פניצילין G؛ פיוגליטזון (Actos، ב-Actoplus Met، ב-Duetact)؛ Avandia(; rosuvastatin)Crestor(; בריפאמט، בריפאטר)؛ סימבסטטין (זוקור، ב-Vytorin)؛ תיאופילין (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl)، אחרים Pravachol(؛ repaglinide)pravastatin(פרנדין، בפרנדימט)؛ rifampin (Rifadin, Rimactane)، בריפאמט، בריפאטר)؛ Crestor(rosuvastatin)Avandia(؛ rosiglitazone؛ סימבסטטין (זוקור، ב-Vytorin)؛ תיאופילין (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl)، אחרים Zanaflex(؛ tizanidine;וזידובודין (רטרוביר، בקומביבר، בטריזיבר). ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את מינון התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי. תרופות רבות אחרות עשויות לקיים אינטראקציה עם טריפלונומיד، לכן הקפידו לספר לרופא על כל התרופות שאתם נוטלים، גם אלו שאינן מופיעות ברשימה זו. אמצעי מניעה דרך הפה (גלולות למניעת הריון)؛ Abraxane, Taxol(paclitaxel؛ פניצילין G؛ פיוגליטזון (Actos، ב-Actoplus Met، ב-Duetact)؛ Pravachol(; repaglinide)pravastatin(פרנדין (פרנדימט)؛ rifampin (Rifadin, Rimactane)، בריפאמט، בריפאטר)؛ Crestor(rosuvastatin)Avandia(؛ rosiglitazone؛ סימבסטטין (זוקור، ב-Vytorin)؛ תיאופילין (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl)، אחרים)؛ Zanaflex(tizanidine؛וזידובודין (רטרוביר، בקומביבר، בטריזיבר). ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את מינון התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לא

- ספר לרופא שלך אם יש לך זיהום עכשיו, כולל זיהום מתמשך שאינו חולף, או אם יש לך או הייתה לך אי פעם תגובה חמורה בעור לאחר שנטלת תרופה נוספת; סוכרת; בעיות נשימה; סרטן או מצבים אחרים המשפיעים על מח העצם או מערכת החיסון; לחץ דם גבוה; נוירופתיה היקפית (חוסר תחושה, צריבה או עקצוץ בידיים או ברגליים שמרגישים שונה מתסמיני הטרשת הנפוצה שלך); או מחלת כליות.

- ספר לרופא שלך אם אתה מניקה. אין להניק בזמן נטילת טריפלונומיד.

- אם בת זוגך מתכננת להיכנס להריון, עליך לדבר עם הרופא שלך על הפסקת טריפלונומיד וקבלת טיפול שיעזור להסיר את התרופה מגופך מהר יותר. אם בת הזוג שלך לא מתכננת להיכנס להריון, עליך ובן זוגך להשתמש בשיטה יעילה למניעת הריון במהלך הטיפול בטריפלונומיד ועד שנתיים לאחר הטיפול, עד שבדיקות דם מראות שיש לך רמות נמוכות מספיק של טריפלונומיד בגוף. דמ.

- אם אתה עובר ניתוח, כולל ניתוח שיניים, ספר לרופא או לרופא השיניים שאתה נוטל טריפלונומיד.

- ייתכן שאתה כבר נגוע בשחפת (שחפת; זיהום ריאות חמור) אך אין לך תסמינים כלשהם של המחלה. ספר לרופא שלך אם יש לך או סבלת אי פעם בשחפת, אם חיית או ביקרת במדינה שבה השחפת נפוצה, או אם היית בסביבה של מישהו שיש לו או היה אי פעם שחפת. לפני שתתחיל את הטיפול בטריפלונומיד, הרופא שלך יבצע בדיקת עור כדי לראות אם יש לך שחפת. אם יש לך שחפת, הרופא שלך יטפל בזיהום זה לפני שתתחיל ליטול טריפלונומיד.

- אין לך חיסונים כלשהם מבלי לדבר עם הרופא שלך בזמן שאתה נוטל טריפלונומיד ובמשך 6 חודשים לאחר הפסקת הטיפול.

- עליך לדעת שטריפלונומיד עלול לגרום ללחץ דם גבוה. עליך לבדוק את לחץ הדם שלך לפני תחילת הטיפול ובאופן קבוע בזמן שאתה נוטל תרופה זו.

האם עליי לעקוב אחר הוראות תזונה מיוחדות?

אלא אם כן הרופא שלך אומר לך אחרת, המשך בתזונה הרגילה שלך.

כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

קח את המנה שהוחמצה ברגע שאתה זוכר אותה. עם זאת, אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה, דלג על המנה שהוחמצה והמשך בלוח הזמנים הקבוע שלך במינון. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

התרופה יכולה לגרום לתופעות לוואי?

:עלול לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף Teriflunomide

- איבוד שיער
- שִׁלְשׁוּל
- ראייה מטושטשת
- כְּאֵב שִׁנַּיִם
- אקנה
- כאבי פרקים או שרירים
- חֲרֶדָה
- ירידה במשקל

תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים הללו או מאלה המפורטים בסעיף אזהרה חשובה, הפסק ליטול טריפלונומיד והתקשר מיד לרופא שלך או קבל טיפול רפואי חירום:

- דופק מהיר, לא סדיר או איטי
- כְּאֵב רֹאשׁ
- סְחָרְחוֹרֶת
- עור חיוור
- בִּלְבּוּל
- חום, שיעול, כאב גרון, צמרמורות וסימנים אחרים של זיהום
- חוסר תחושה, צריבה או עקצוץ בידיים, בזרועות, ברגליים או ברגליים
- אובדן טונוס שרירים
- חולשה או כבדות ברגליים
- עור קר ואפור
- עור אדום, מתקלף או שלפוחיות
- פריחה
- כוורות
- עקצוץ
- קושי בבליעה
- נפיחות של הפנים, העיניים, הפה, הגרון, הלשון או השפתיים

- קוצר נשימה
- פריחה שעלולה להופיע עם חום, בלוטות נפוחות או נפיחות בפנים
- כאבי בטן, צד או גב

.עלול לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות בזמן נטילת התרופה Teriflunomide

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatchבאינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA) ([http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]http://www.fda.gov/Safety/MedWatch[) או בטלפון (332-800-1-1088).

צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

שמור את התרופה במיכל שבו היא הגיעה, סגור היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן אותו בטמפרטורת החדר והרחק מעודפי חום ולחות (לא בחדר האמבטיה).

חשוב להרחיק את כל התרופות מטווח ראייה ומהישג ידם של ילדים, שכן מיכלים רבים (כגון מטפלי גלולות שבועיים ואלו עבור טיפות עיניים, קרמים, מדבקות ומשאפים) אינם עמידים לילדים וילדים צעירים יכולים לפתוח אותם בקלות. כדי להגן על ילדים צעירים מפני הרעלה, תמיד לנעול מכסי בטיחות ולהניח מיד את התרופה במקום בטוח - כזה שנמצא למעלה והרחק ומחוץ לטווח ראייה והישג ידם.[http://www.upandaway.org]http://www.upandaway.org[

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכניות החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות ([http://goo.gl/c4Rm4p]http://goo.gl/c4Rm4p[) למידע נוסף אם אין לך גישה לתוכנית החזרה.

במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת [https://www.poisonhelp.org/help]https://www.poisonhelp.org/help[. אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

צריך לדעת מידע אחר?

אל תיתן לאף אחד לקחת את התרופות שלך. שאל את הרוקח שלך כל שאלה שיש לך לגבי מילוי מחדש של המרשם שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כגון ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

שמות רנד

- אובאג'יו®

עדכון אחרון - 15/01/2021

למד כיצד לצטט דף זה

האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc. כתב ויתור
AHFS®מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות®כל הזכויות שמורות. שִׁכפּוּל .4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland ,
לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 משרד הבריאות האמריקאי ושירותי אנוש המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022