Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699032.html

talidomida

pronunciado como (tha li' doe mide)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

Riesgo de defectos de nacimiento graves y potencialmente mortales causados por la talidomida.

Para todas las personas que toman talidomida:

Las mujeres embarazadas o que podrían quedar embarazadas mientras toman este medicamento no deben tomar talidomida. Incluso una sola dosis de talidomida tomada durante el embarazo puede causar defectos de nacimiento graves (problemas físicos presentes en el bebé al nacer) o la muerte del feto. Un programa llamado Talidomida REMS®(anteriormente conocido como el Sistema para la educación sobre la talidomida y la seguridad en la prescripción [STEPS®]) ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para garantizar que las mujeres embarazadas no tomen talidomida y que las mujeres no queden embarazadas mientras toman talidomida. Todas las personas a las que se les receta talidomida, incluidos hombres y mujeres que no pueden quedar embarazadas, deben estar registradas en Thalidomide REMS®, tiene una receta de talidomida de un médico registrado en Thalidomide REMS®, y surta la receta en una farmacia que esté registrada con Thalidomide REMS®para recibir este medicamento.

Deberá ver a su médico todos los meses durante su tratamiento para hablar sobre su condición y cualquier efecto secundario que pueda estar experimentando. En cada visita, su médico puede darle una receta para un suministro de medicamentos de hasta 28 días sin reposición. Debe surtir esta receta dentro de los 7 días.

No done sangre mientras esté tomando talidomida y durante 4 semanas después de su tratamiento.

No comparta la talidomida con nadie más, ni siquiera con alguien que pueda tener los mismos síntomas que usted tiene.

Para mujeres que toman talidomida:

Si puede quedar embarazada, deberá cumplir ciertos requisitos durante su tratamiento con talidomida. Debe cumplir con estos requisitos incluso si tiene antecedentes de no poder quedar embarazada. Se le puede eximir de cumplir con estos requisitos solo si no ha menstruado (tuvo el período) durante 24 meses seguidos, o si se ha sometido a una histerectomía (cirugía para extirpar el útero).

Debe usar dos formas aceptables de control de la natalidad durante 4 semanas antes de comenzar a tomar talidomida, durante su tratamiento y durante 4 semanas después de su tratamiento. Su médico le dirá qué formas de control de la natalidad son aceptables. Debe usar estas dos formas de control de la natalidad en todo momento a menos que pueda garantizar que no tendrá ningún contacto sexual con un hombre durante 4 semanas antes de su tratamiento, durante su tratamiento y durante 4 semanas después de su tratamiento.

Algunos medicamentos pueden hacer que los anticonceptivos hormonales sean menos efectivos. Si planea usar anticonceptivos hormonales (píldoras anticonceptivas, parches, implantes, inyecciones, anillos o dispositivos intrauterinos) durante su tratamiento con talidomida, informe a su médico sobre todos los medicamentos, vitaminas y suplementos herbales que está tomando o planea tomar. . No olvide mencionar: griseofulvina (Grifulvin); ciertos medicamentos para tratar el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), incluidos amprenavir (Agenerase), atazanavir (Reyataz), darunavir (Prezista), fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), lopinavir (en Kaletra), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir , en Kaletra), saquinavir (Invirase) y tipranavir (Aptivus); ciertos medicamentos para las convulsiones, como carbamazepina (Carbatrol, Equetro, Tegretol) y fenitoína (Dilantin, Phenytek); modafinilo (Provigil); penicilina; rifampicina (Rimactane, Rifadin); rifabutina (Mycobutin); y la hierba de San Juan. Muchos otros medicamentos pueden interferir con la acción de los anticonceptivos hormonales, así que asegúrese de informarle a su médico todos los medicamentos que está tomando o planea tomar, incluso aquellos que no aparecen en esta lista.

Debe tener dos pruebas de embarazo negativas antes de poder comenzar a tomar talidomida. También deberá hacerse una prueba de embarazo en un laboratorio en ciertos momentos durante su tratamiento. Su médico le dirá cuándo y dónde hacerse estas pruebas.

Deje de tomar talidomida y llame a su médico de inmediato si cree que está embarazada, tiene un período menstrual tardío, irregular o perdido, tiene algún cambio en su sangrado menstrual o tiene relaciones sexuales sin usar dos formas de control de la natalidad. En algunos casos, su médico puede recetarle un anticonceptivo de emergencia ("la píldora del día después") para evitar el embarazo. Si queda embarazada durante su tratamiento, su médico debe llamar a la FDA y al fabricante. Su médico también se asegurará de que hable con un médico que se especialice en problemas durante el embarazo y que pueda ayudarla a tomar las mejores decisiones para usted y su bebé.

Para hombres que toman talidomida:

La talidomida está presente en el semen (líquido que contiene esperma que se libera a través del pene durante el orgasmo). Debe usar un condón de látex o sintético o evitar por completo cualquier contacto sexual con una mujer embarazada o que pueda quedar embarazada mientras toma este medicamento y durante 4 semanas después de su tratamiento. Esto es necesario incluso si se ha sometido a una vasectomía (cirugía para evitar que los espermatozoides abandonen su cuerpo y provoquen un embarazo). Informe inmediatamente a su médico si ha tenido relaciones sexuales sin protección con una mujer que puede quedarse embarazada o si cree por cualquier motivo que su pareja está embarazada.

No done semen o esperma mientras esté tomando talidomida y durante 4 semanas después de su tratamiento.

Riesgo de coágulos de sangre:

Si está tomando talidomida para tratar el mieloma múltiple (un tipo de cáncer de la médula ósea), existe el riesgo de que desarrolle un coágulo de sangre en los brazos, las piernas o los pulmones. Este riesgo es mayor cuando la talidomida se usa junto con otros medicamentos de quimioterapia como la dexametasona. Llame a su médico de inmediato si experimenta alguno de los siguientes síntomas: dolor, sensibilidad, enrojecimiento, calor o hinchazón en los brazos o las piernas; dificultad para respirar; o dolor en el pecho. Su médico puede recetarle un anticoagulante ("diluyente de la sangre") o aspirina para ayudar a detener la formación de coágulos durante su tratamiento con talidomida.

Hable con su médico sobre los riesgos de tomar talidomida.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La talidomida se usa junto con la dexametasona para tratar el mieloma múltiple en personas a las que se les ha diagnosticado recientemente esta enfermedad. También se usa solo o con otros medicamentos para tratar y prevenir los síntomas cutáneos del eritema nodoso leproso (ENL; episodios de llagas en la piel, fiebre y daño a los nervios que ocurren en personas con la enfermedad de Hansen [lepra]). La talidomida pertenece a una clase de medicamentos llamados agentes inmunomoduladores. Trata el mieloma múltiple al fortalecer el sistema inmunitario para combatir las células cancerosas. Trata el ENL al bloquear la acción de ciertas sustancias naturales que causan la hinchazón.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La talidomida viene envasada en cápsulas para tomar por vía oral. La talidomida generalmente se toma con agua una vez al día a la hora de acostarse y al menos 1 hora después de la cena. Si está tomando talidomida para tratar el ENL, es posible que su médico le indique que la tome más de una vez al día, al menos 1 hora después de las comidas. Tome la talidomida aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome la talidomida exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Mantenga las cápsulas en su empaque hasta que esté listo para tomarlas. No abra las cápsulas ni las manipule más de lo necesario. Si su piel entra en contacto con cápsulas rotas o polvo, lave el área expuesta con agua y jabón.

La duración de su tratamiento depende de cómo respondan sus síntomas a la talidomida y si sus síntomas regresan cuando deja de tomar el medicamento. Su médico puede necesitar interrumpir su tratamiento o reducir su dosis si experimenta ciertos efectos secundarios. No deje de tomar talidomida sin hablar con su médico. Cuando su tratamiento esté completo, su médico probablemente disminuirá su dosis gradualmente.

Otros usos de este medicamento

La talidomida también se usa a veces para tratar ciertas afecciones de la piel que involucran hinchazón e irritación. También se usa para tratar ciertas complicaciones del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), como estomatitis aftosa (afección en la que se forman úlceras en la boca), diarrea asociada al VIH, síndrome de emaciación asociado al VIH, ciertas infecciones y sarcoma de Kaposi (un tipo de cáncer de piel). La talidomida también se ha usado para tratar algunos tipos de cáncer y tumores, pérdida de peso severa en pacientes con sistemas inmunitarios debilitados, enfermedad crónica de injerto contra huésped (una complicación que puede ocurrir después de un trasplante de médula ósea).

en la que el material recién trasplantado ataca el cuerpo del receptor del trasplante) y la enfermedad de Crohn (una afección en la que el cuerpo ataca el revestimiento del tracto digestivo, causando dolor, diarrea, pérdida de peso y fiebre). Hable con su médico acerca de los riesgos de usar este medicamento para su condición.

Este medicamento a veces se prescribe para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar talidomida,

- Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la talidomida o a cualquier otro medicamento.
- informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar los medicamentos enumerados en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE y cualquiera de los siguientes: antidepresivos; barbitúricos como pentobarbital (Nembutal), fenobarbital y secobarbital (Seconal); clorpromazina; didanosina (Videx); medicamentos para la ansiedad, enfermedades mentales o convulsiones; ciertos medicamentos de quimioterapia para el cáncer, como cisplatino (Platinol), paclitaxel (Abraxane, Taxol) y vincristina; reserpina (Serpalan); sedantes; pastillas para dormir; y tranquilizantes. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.
- Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), un nivel bajo de glóbulos blancos en la sangre o convulsiones.
- Informe a su médico si está amamantando.
- Debe saber que la talidomida puede provocarle somnolencia. No conduzca un automóvil, opere maquinaria ni realice otras actividades que requieran que esté completamente alerta hasta que sepa cómo le afecta este medicamento.
- pregúntele a su médico sobre el consumo seguro de bebidas alcohólicas mientras toma talidomida. El alcohol puede empeorar los efectos secundarios de la talidomida.
- Debe saber que la talidomida puede causar mareos, aturdimiento y desmayos cuando se levanta demasiado rápido después de estar acostado. Para ayudar a evitar este problema, levántese de la cama lentamente, apoyando los pies en el suelo durante unos minutos antes de ponerse de pie.
- Debe saber que la talidomida está presente en su sangre y fluidos corporales. Cualquiera que pueda entrar en contacto con estos fluidos debe usar guantes o lavar las áreas expuestas de la piel con agua y jabón.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si faltan menos de 12 horas para su próxima dosis programada, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación regular. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La talidomida puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

- somnolencia
- confusión
- ansiedad
- depresión o cambios de humor
- dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido
- dolor de huesos, músculos, articulaciones o espalda
- debilidad
- dolor de cabeza
- cambio en el apetito
- cambios de peso
- náuseas
- constipación
- boca seca
- piel seca
- piel pálida
- temblor incontrolable de una parte del cuerpo
- hinchazón de las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas
- dificultad para lograr o mantener una erección

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato o busque tratamiento médico de emergencia:

- erupción
- Comezón
- urticaria
- ampollas y descamación de la piel
- hinchazón de la cara, garganta, lengua, labios u ojos
- ronquera
- dificultad para tragar o respirar
- fiebre, dolor de garganta, escalofríos, tos u otros signos de infección
- latido del corazón lento o rápido
- convulsiones

La talidomida puede causar daño a los nervios que puede ser grave y permanente. Este daño puede ocurrir en cualquier momento durante o después de su tratamiento. Su médico lo examinará regularmente para ver cómo la talidomida ha afectado su sistema nervioso. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, deje de tomar talidomida y llame a su médico de inmediato: entumecimiento, hormigueo, dolor o ardor en las manos y los pies.

La talidomida puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono (1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance. http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en líneahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas de laboratorio para verificar la respuesta de su cuerpo a la talidomida.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

- Talomid®

Última revisión - 15/08/2019

Aprende a citar esta página

Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad

SAIA®Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022