



Express Medicine Shipments, Globally!  
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [薬](#)、[ハーブ](#)、[サプリメント](#) → [チオグアニン](#)

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682099.html>

## チオグアニン

(*thye'' oh gwah'neen*) と発音します

### なぜこの薬が処方されているのですか？

チオグアニンは、急性骨髄性白血病（AML、白血球から発生するがんの一種）の治療に使用されます。チオグアニンは、プリン類縁物質として知られている薬のクラスに含まれています。それはあなたの体の癌細胞の成長を遅らせるか、または止めることによって働きます。

### わあ、この薬を使うべきですか？

チオグアニンは、通常1日1回経口摂取する錠剤として提供されます。治療の長さは、服用している薬の種類、体がそれらにどれだけうまく反応するか、そしてあなたが持っている癌の種類によって異なります。毎日ほぼ同じ時間にチオグアニンを服用してください。処方箋の指示に注意深く従って、あなたが理解していない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指示通りにチオグアニンを服用してください。多かれ少なかれ服用したり、医師の処方よりも頻繁に服用したりしないでください。

医師は、治療中にチオグアニンの投与量を増減する場合があります。これは、薬がどれだけうまく機能するか、そしてあなたが経験する副作用に依存します。治療中の気分について医師に相談してください。気分が良くてもチオグアニンを服用し続けてください。医師に相談せずにチオグアニンの服用をやめないでください

薬剤師または医師に、患者に関する製造元の情報のコピーを依頼してください。

### この薬の用途

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

### 特別な注意事項に従う必要がありますか？

チオグアニンを服用する前に、

- あなたがチオグアニン、他の薬、またはチオグアニン錠剤の成分のいずれかにアレルギーがあるかどうかを医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。
- 癌を治療するためにすでにチオグアニンまたはメルカプトプリンを服用している場合は、医師に相談してください。これらの薬のいずれかが過去にあなたの癌に対してうまく機能しなかった場合、あなたの医者はあなたにチオグアニンを服用しないように言うかもしれません。

- あなたが服用している、または服用する予定の他の処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、およびハーブ製品を医師と薬剤師に伝えてください。次のいずれかに必ず言及してください：メサラミン（アプリソ、アサコール、ペンタサなど）、オルサラジン（ジペンタム）、スルファサラジン（アズルフィジン）などのアミノサリチル酸塩。あなたの医師はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。また、医師と薬剤師にあなたが服用しているすべての薬について知らせてください。そうすれば、あなたの薬のいずれかがチオグアニンによる治療中に肝臓障害を発症するリスクを高める可能性があるかどうかを確認できます。
- 肝疾患を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。
- あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。チオグアニンを服用している間は、妊娠したり授乳したりしないでください。チオグアニンの投与中に妊娠した場合は、医師に連絡してください。チオグアニンは胎児に害を及ぼす可能性があります。
- 医師に相談せずに予防接種を受けしないでください。
- 遺伝的（遺伝的）危険因子がある場合、チオグアニンの深刻な副作用を発症するリスクが高くなる可能性があることを知っておく必要があります。医師は、治療前または治療中に、この危険因子があるかどうかを確認するための検査を命じることがあります。

## 特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

チオグアニンによる治療中は水分をたっぷりと飲んでください。

## 服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

忘れた分は、覚えたらすぐに飲んでください。ただし、次の通常の服用時間になったら、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばして、通常の服用時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

## この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

チオグアニンは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 吐き気
- 嘔吐
- 食欲または体重の減少
- 口と喉の痛み
- 頭痛

いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。

- 異常な倦怠感または脱力感
- 異常な出血またはあざ
- 皮膚や目の黄変
- インフルエンザのような症状

- 腹部の腫れ
- 特に胃の右側の胃の痛み
- 顔、腕、手、足、足首または下肢の腫れ
- 吐血
- 黒、タールまたは血便
- 発熱、喉の痛み、進行中の咳やうっ血、またはその他の感染症の兆候
- 呼吸困難
- 立ちくらみ

チオグアニンは他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の服用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。

（<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]）または電話（1-800-332-1088）。

## この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は入った容器に入れ、しっかりと閉じて、子供の手の届かないところに保管してください。室温で、過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください（<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸入器など）は子供に耐性がなく、幼児は簡単に開けることができるため、すべての薬を子供の手の届かないところに置いておくことが重要です。幼児を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

## n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

**過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。**

- 吐き気

- 嘔吐
- 過度の発汗
- 異常な倦怠感または脱力感
- 異常な出血またはあざ
- 発熱、喉の痛み、進行中の咳やうっ血、またはその他の感染症の兆候

## 他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。医師は、チオグアニンに対する体の反応を確認するために、特定の臨床検査を命じることがあります。

他の人にあなたの薬を服用させないでください。処方箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

## ランド名

- タブロイド®

## それらの名前

- 2-アミノ-6-メルカプトプリン
- 6-TG
- 6-チオグアニン

最終改訂日-2017年5月15日

[このページを引用する方法を学ぶ](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. 免責事項](#)

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製  
商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日