



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Drogas, Ervas e Suplementos](#) → Tioguanina

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682099.html>

Tioguanina

pronunciado como (thye'' oh gwah' neen)

por que este medicamento é prescrito?

A tioguanina é usada para tratar a leucemia mieloide aguda (LMA; um tipo de câncer que começa nos glóbulos brancos). A tioguanina está em uma classe de medicamentos conhecidos como análogos de purina. Funciona retardando ou interrompendo o crescimento de células cancerígenas em seu corpo.

como este medicamento deve ser usado?

Tioguanina vem como um comprimido para tomar por via oral geralmente uma vez ao dia. A duração do tratamento depende dos tipos de medicamentos que você está tomando, de quão bem seu corpo responde a eles e do tipo de câncer que você tem. Tome tioguanina por volta do mesmo horário todos os dias. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome tioguanina exatamente como indicado. Não tome mais ou menos ou tome com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

O seu médico pode aumentar ou diminuir a sua dose de tioguanina durante o seu tratamento. Isso depende de quão bem o medicamento funciona para você e dos efeitos colaterais que você experimenta. Converse com seu médico sobre como você está se sentindo durante o tratamento. Continue a tomar tioguanina mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar tioguanina sem falar com seu médico

Peça ao seu farmacêutico ou médico uma cópia das informações do fabricante para o paciente.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar tioguanina,

- informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à tioguanina, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos ingredientes dos comprimidos de tioguanina. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.
- informe o seu médico se já tomou tioguanina ou mercaptopurina para tratar o seu cancro. Seu médico pode dizer para você não tomar tioguanina se algum desses medicamentos não funcionou bem contra o câncer no passado.

- informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos nutricionais e produtos fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: aminossalicilatos, como mesalamina (Apriso, Asacol, Pentasa, outros), olsalazina (Dipentum) e sulfassalazina (Azulfidina). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. Informe também o seu médico e farmacêutico sobre todos os medicamentos que está a tomar para que possam verificar se algum dos seus medicamentos pode aumentar o risco de desenvolver danos no fígado durante o tratamento com tioguanina.
- informe o seu médico se tem ou já teve doença hepática.
- informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Você não deve engravidar ou amamentar enquanto estiver recebendo tioguanina. Se você engravidar enquanto estiver recebendo tioguanina, ligue para o seu médico. A tioguanina pode prejudicar o feto.
- não tome nenhuma vacina sem falar com o seu médico.
- você deve saber que o risco de desenvolver efeitos colaterais graves da tioguanina pode ser maior se você tiver um fator de risco genético (hereditário). Seu médico pode solicitar exames antes ou durante o tratamento para verificar se você tem esse fator de risco.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

Beba bastante líquido durante o tratamento com tioguanina.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perda.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

A tioguanina pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:

- náusea
- vômito
- perda de apetite ou peso
- feridas na boca e garganta
- dor de cabeça

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu médico imediatamente:

- cansaço ou fraqueza incomum
- sangramento ou hematomas incomuns
- amarelecimento da pele ou olhos
- sintomas como os da gripe

- inchaço da área do estômago
- dor de estômago, particularmente na parte direita do estômago
- inchaço da face, braços, mãos, pés, tornozelos ou pernas
- vômito sangrento
- fezes pretas, alcatroadas ou com sangue
- febre, dor de garganta, tosse e congestão contínuas ou outros sinais de infecção
- falta de ar
- tontura

A tioguanina pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line em <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de overdose podem incluir o seguinte:

- náusea

- vômito
- suor excessivo
- cansaço ou fraqueza incomum
- sangramento ou hematomas incomuns
- febre, dor de garganta, tosse e congestão contínuas ou outros sinais de infecção

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. Seu médico pode solicitar certos exames de laboratório para verificar a resposta do seu corpo à tioguanina.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Deve trazer esta lista consigo sempre que visitar um médico ou se for internado num hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Tablóide®

outros nomes

- 2-Amino-6-mercaptipurina
- 6-TG
- 6-Tioguanina

Última revisão - 15/05/2017

[Saiba como citar esta página](#)



[Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade](#)

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022