

عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682099.html>

## ثيوجوانين تنطقك (ثي "أوه جواه" نين)

### لماذا يوصف هذا الدواء؟

يستخدم الثيوجوانين لعلاج ابيضاض الدم النخاعي الحاد (AML ؛ نوع من السرطان يبدأ في خلايا الدم البيضاء). ينتمي الثيوجوانين إلى فئة من الأدوية تعرف باسم نظائر البيورين. إنه يعمل عن طريق إبطاء أو إيقاف نمو الخلايا السرطانية في جسمك.

### كيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي Thioguanine على شكل قرص ليأخذ عن طريق الفم عادة مرة واحدة في اليوم. تعتمد مدة العلاج على أنواع الأدوية التي تتناولها ، ومدى استجابة جسمك لها ، ونوع السرطان الذي تعاني منه. خذ ثيوجوانين في نفس الوقت تقريباً كل يوم. اتبع الإرشادات الموجودة على ملصق الوصفة الخاص بك بعناية ، واطلب من طبيبك أو الصيدلي شرح أي جزء لا تفهمه. خذ ثيوجوانين بالضبط حسب التوجيهات. لا تأخذ أكثر أو أقل منه أو تتناوله أكثر مما وصفه طبيبك.

قد يقوم طبيبك بزيادة أو تقليل جرعتك من الثيوجوانين أثناء العلاج. هذا يعتمد على مدى فعالية الدواء بالنسبة لك وعلى الآثار الجانبية التي تعاني منها. تحدث إلى طبيبك حول ما تشعر به أثناء علاجك. استمر في تناول الثيوجوانين حتى لو كنت تشعر بصحة جيدة. لا تتوقف عن تناول الثيوجوانين دون التحدث مع طبيبك

اطلب من الصيدلي أو الطبيب الحصول على نسخة من معلومات الشركة المصنعة للمريض.

### هناك استخدامات لهذا الدواء

يمكن وصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

### قبعة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

#### قبل تناول الثيوجوانين ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كان لديك حساسية من ثيوجوانين ، أو أي أدوية أخرى ، أو أي من مكونات أقراص ثيوجوانين. اسأل الصيدلي عن قائمة المكونات.
- أخبر طبيبك إذا كنت قد تناولت بالفعل ثيوجوانين أو مركبات بيورين لعلاج السرطان. قد يخبرك طبيبك بعدم تناول الثيوجوانين إذا لم يعمل أي من هذه الأدوية بشكل جيد ضد السرطان في الماضي.

• أخبر طبيبك والصيدلي عن الأدوية الأخرى الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التي تتناولها أو تخطط لتناولها. تأكد من ذكر أي مما يلي: aminosalicylates (مثل Azulfidine) and sulfasalazine ، (Dipentum) olsalazine ، (Apriso، Asacol، Pentasa، others) mesalamine. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية. أخبر طبيبك والصيدلي أيضاً عن جميع الأدوية التي تتناولها حتى يتمكنوا من التحقق مما إذا كان أي من الأدوية الخاصة بك قد يزيد من خطر الإصابة بتلف الكبد أثناء علاجك باستخدام الثيوجوانين.

- أخبر طبيبك إذا كان لديك أو سبق أن عانيت من مرض في الكبد.
- أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة الطبيعية. يجب ألا تصبحي حاملاً أو ترضعين رضاعة طبيعية أثناء تلقيك للثيوجوانين. إذا أصبحت حاملاً أثناء تناول الثيوجوانين ، فاتصل بطبيبك. قد يؤدي الثيوجوانين الجنين.
- لاتأخذ أي تطعيمات دون التحدث مع طبيبك.
- يجب أن تعلم أن خطر تعرضك لآثار جانبية خطيرة للثيوجوانين قد يكون أعلى إذا كان لديك عامل خطر وراثي (موروث). قد يطلب طبيبك إجراء اختبارات قبل أو أثناء العلاج لمعرفة ما إذا كان لديك عامل الخطر هذا.

## قبة تعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

مالم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك ، استمر في نظامك الغذائي المعتاد.

اشرب الكثير من السوائل أثناء علاجك بالثيوجوانين.

## قبة يجب أن أفعلها إذا نسيت جرعة؟

خذ الجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها. ومع ذلك ، إذا حان الوقت تقريباً للجرعة التالية ، فتجاوز الجرعة الفائتة وتابع جدول الجرعات المعتاد. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

## الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قد يسبب الثيوجوانين آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- غثيان
- التقيؤ
- فقدان الشهية أو الوزن
- تقرحات في الفم والحلق
- صداع الراس

**بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، فاتصل بطبيبك على الفور:**

- إرهاق أو ضعف غير عادي
- نزيف أو كدمات غير عادية
- اصفرار الجلد أو العينين
- باعراض تشبه اعراض الانفلونزا

- تورم في منطقة المعدة
- آلام في المعدة ، خاصة في الجزء الأيمن من المعدة
- تورم في الوجه والذراعين واليدين والقدمين والكاحلين أو أسفل الساقين
- قيء دموي
- براز أسود أو قطراني أو دموي
- الحمى والتهاب الحلق والسعال المستمر والاحتقان أو علامات أخرى للعدوى
- ضيق في التنفس
- دوام

قد يسبب الثيوجوانين آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء تناول هذا الدواء.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرة عبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).  
[http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] http://www.fda.gov/Safety/MedWatch أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

## قبة يجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

احتفظ بهذا الدواء في الحاوية التي جاء فيها ، ومغلقة بإحكام ، وبعيداً عن متناول الأطفال. قم بتخزينه في درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن الحرارة والرطوبة الزائدة (وليس في الحمام).

يجب التخلص من الأدوية غير الضرورية بطرق خاصة لضمان عدم تمكن الحيوانات الأليفة والأطفال والأشخاص الآخرين من تناولها. ومع ذلك ، يجب ألا تغسل هذا الدواء في المراض. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل طريقة للتخلص من أدويةك هي من خلال برنامج استعادة الأدوية. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك أو اتصل بقسم القمامة / إعادة التدوير المحلي للتعرف على برامج الاستعادة في مجتمعك. راجع موقع ويب التخلص الآمن من الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء [http://goo.gl/c4Rm4p] /c4Rm4p (http://goo.gl) لمزيد من المعلومات إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج الاستعادة.

من المهم إبقاء جميع الأدوية بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال لأن العديد من الحاويات (مثل الأدوية الأسبوعية وقطرات العين والكريمات والبقع وأجهزة الاستنشاق) ليست مقاومة للأطفال ويمكن للأطفال الصغار فتحها بسهولة. لحماية الأطفال الصغار من التسمم ، قم دائماً بإغلاق أعطية الأمان ووضع الدواء على الفور في مكان آمن - مكان مرتفع وبعيداً عن أنظارهم ومدى وصولهم. [http://www.upandaway.org] http://www.upandaway.org

## ن حالة طارئة / جرعة زائدة

في حالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على [https://www.poisonhelp.org/help] https://www.poisonhelp.org/help. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقافه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

## قد تشمل أعراض الجرعة الزائدة ما يلي:

- غثيان

- التقيؤ
- التعرق المفرط
- إرهاق أو ضعف غير عادي
- نزيف أو كدمات غير عادية
- الحمى والتهاب الحلق والسعال المستمر والاحتقان أو علامات أخرى للعدوى

## قبة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

احتفظ بجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر. قد يطلب طبيبك بعض الاختبارات المعملية للتحقق من استجابة جسمك للثيوجوانين.

لاتدع أي شخص آخر يأخذ دوائك. اسأل الصيدلي عن أي أسئلة لديك حول إعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك.

من المهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب أن تحضر هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

## أسماء راند

- صحيفة شعبية®

## أسماء هناك

- 2-أمينو-6-مركابتوبورين

- 6-تيراغرام

- 6-ثيوجوانين

آخر مراجعة - 2017/05/15

[تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة](#)



[إخلاء المسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي](#)

AHFS® معلومات الدواء المريض™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي® كل الحقوق محفوظة. الإزدواجية. 4500 East-West Highway، Suite 900، Bethesda، Maryland. للاستخدام التجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبة الوطنية للطب Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 8600 ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهد الوطنية للصحة

آخر تحديث للصفحة: 25 مارس 2022