



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [药物、草药和补充剂](#) → 硫鸟嘌呤

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682099.html>

硫鸟嘌呤

发音为 (thye'' oh gwah' neen)

为什么要开这种药?

硫鸟嘌呤用于治疗急性髓性白血病 (AML; 一种始于白细胞的癌症)。硫鸟嘌呤属于一类称为嘌呤类似物的药物。它的作用是减缓或阻止体内癌细胞的生长。

这个药应该怎么用?

硫鸟嘌呤以片剂形式出现, 通常每天一次口服。治疗时间长短取决于您服用的药物类型、您的身体对药物的反应程度以及您患有的癌症类型。每天大约在同一时间服用硫鸟嘌呤。仔细遵循处方标签上的说明, 并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用硫鸟嘌呤。不要多吃或少吃, 也不要比医生开的更频繁。

您的医生可能会在您治疗期间增加或减少您的硫鸟嘌呤剂量。这取决于药物对您的效果以及您所经历的副作用。与您的医生谈谈您在治疗期间的感受。即使您感觉良好, 也要继续服用硫鸟嘌呤。不要在未咨询医生的情况下停止服用硫鸟嘌呤。

向您的药剂师或医生索取患者的制造商信息副本。

该药的其他用途

这种药物可用于其他用途; 向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施?

在服用硫鸟嘌呤之前,

- 如果您对硫鸟嘌呤、任何其他药物或硫鸟嘌呤片剂中的任何成分过敏, 请告诉您的医生和药剂师。向您的药剂师索取成分清单。
- 如果您已经服用硫鸟嘌呤或巯基嘌呤来治疗癌症, 请告诉您的医生。如果这些药物中的任何一种在过去对您的癌症无效, 您的医生可能会告诉您不要服用硫鸟嘌呤。

- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用的其他处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。请务必提及以下任何一项：氨基水杨酸盐，例如美沙拉嗪（Apriso、Asacol、Pentasa 等）、奥沙拉秦（Dipentum）和柳氮磺吡啶（Azulfidine）。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。还要告诉您的医生和药剂师您正在服用的所有药物，以便他们检查您的任何药物是否会增加您在硫鸟嘌呤治疗期间发生肝损伤的风险。
- 如果您患有或曾经患有肝病，请告诉您的医生。
- 如果您怀孕、计划怀孕或正在哺乳，请告诉您的医生。在接受硫鸟嘌呤期间，您不应怀孕或哺乳。如果您在接受硫鸟嘌呤时怀孕，请致电您的医生。硫鸟嘌呤可能会伤害胎儿。
- 不与您的医生交谈，不要接种任何疫苗。
- 您应该知道，如果您有遗传（遗传）风险因素，您发生硫鸟嘌呤严重副作用的风险可能会更高。您的医生可能会在您治疗之前或期间要求进行测试，以查看您是否有这种风险因素。

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

除非您的医生另有说明，否则请继续您的正常饮食。

在硫鸟嘌呤治疗期间多喝水。

如果我忘记服药该怎么办？

记住后立即服用错过的剂量。但是，如果快到下一次服药的时间了，请跳过错过的服药并继续您的常规服药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

这种药物会引起副作用吗？

硫鸟嘌呤可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 恶心
- 呕吐
- 食欲不振或体重下降
- 口腔和喉咙痛
- 头痛

一些副作用可能很严重。如果您遇到任何这些症状，请立即致电您的医生：

- 异常疲倦或虚弱
- 异常出血或瘀伤
- 皮肤或眼睛发黄
- 流感样症状

- 胃部肿胀
- 胃痛，特别是在胃的右侧
- 面部、手臂、手、脚、脚踝或小腿肿胀
- 带血的呕吐物
- 黑色、柏油样或血便
- 发烧、喉咙痛、持续咳嗽和充血或其他感染迹象
- 气促
- 头晕目眩

硫鸟嘌呤可能会引起其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在室温下，远离过多的热量和水分（不要放在浴室里）。

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站 (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免于中毒，请始终锁上安全帽并立即将药物放在安全的位置——一个高高的、远离他们视线和够不到的地方。<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

过量服用的症状可能包括以下内容：

- 恶心

- 呕吐
- 出汗过多
- 异常疲倦或虚弱
- 异常出血或瘀伤
- 发烧、喉咙痛、持续咳嗽和充血或其他感染迹象

我应该知道其他信息吗？

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生可能会下令进行某些实验室测试，以检查您的身体对硫鸟嘌呤的反应。

不要让其他人服用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 小报®

其他名字

- 2-氨基-6-巯基嘌呤
- 6-TG
- 6-硫鸟嘌呤

最后修订 - 2017年5月15日

[了解如何引用此页面](#)



[美国卫生系统药剂师协会免责声明](#)

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®，4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面：2022年3月25日