

[Huis](#) → [Medicijnen, kruiden en supplementen](#) → Thioguanine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL van deze pagina: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682099.html>

Thioguanine

uitgesproken als (thye'' oh gwah' neen)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Thioguanine wordt gebruikt voor de behandeling van acute myeloïde leukemie (AML; een type kanker dat in de witte bloedcellen begint). Thioguanine zit in een klasse van medicijnen die bekend staat als purine-analogen. Het werkt door de groei van kankercellen in uw lichaam te vertragen of te stoppen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Thioguanine wordt geleverd als een tablet die gewoonlijk eenmaal per dag via de mond moet worden ingenomen. De duur van de behandeling hangt af van de soorten medicijnen die u gebruikt, hoe goed uw lichaam erop reageert en het type kanker dat u heeft. Neem thioguanine elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem thioguanine precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Uw arts kan uw dosis thioguanine tijdens uw behandeling verhogen of verlagen. Dit hangt af van hoe goed de medicatie voor u werkt en van de bijwerkingen die u ervaart. Praat met uw arts over hoe u zich voelt tijdens uw behandeling. Blijf thioguanine gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van thioguanine zonder met uw arts te overleggen

Vraag uw apotheker of arts om een kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u thioguanine inneemt,

- vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor thioguanine, voor andere medicijnen of voor één van de bestanddelen van thioguaninetabletten. Vraag uw apotheker om een lijst van de ingrediënten.
- vertel het uw arts als u al thioguanine of mercaptopurine heeft gebruikt om uw kanker te behandelen. Uw arts kan u vertellen om geen thioguanine te gebruiken als een van deze medicijnen in het verleden niet goed heeft gewerkt tegen uw kanker.

- vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: aminosalicylaten zoals mesalamine (Apriso, Asacol, Pentasa, anderen), olsalazine (Dipentum) en sulfasalazine (Azulfidine). Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Vertel uw arts en apotheker ook over alle medicijnen die u gebruikt, zodat zij kunnen controleren of een van uw medicijnen het risico kan verhogen dat u leverbeschadiging krijgt tijdens uw behandeling met thioguanine.
- vertel het uw arts als u een leverziekte heeft of ooit heeft gehad.
- vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. U mag niet zwanger worden of borstvoeding geven terwijl u thioguanine krijgt. Als u zwanger wordt terwijl u thioguanine krijgt, neem dan contact op met uw arts. Thioguanine kan de foetus schaden.
- laat u niet vaccineren zonder overleg met uw arts.
- u moet weten dat het risico dat u ernstige bijwerkingen van thioguanine krijgt groter kan zijn als u een genetische (erfelijke) risicofactor heeft. Uw arts kan voor of tijdens uw behandeling tests bestellen om te zien of u deze risicofactor heeft.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

Drink veel vocht tijdens uw behandeling met thioguanine.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Thioguanine kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

- misselijkheid
- braken
- verlies van eetlust of gewicht
- zweren in de mond en keel
- hoofdpijn

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

- ongewone vermoeidheid of zwakte
- ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken
- geel worden van de huid of ogen
- griepachtige symptomen

- zwelling van het maaggebied
- maagpijn, vooral in het rechter deel van de maag
- zwelling van het gezicht, armen, handen, voeten, enkels of onderbenen
- bloederig braaksel
- zwarte, teerachtige of bloederige ontlasting
- koorts, keelpijn, aanhoudende hoest en congestie, of andere tekenen van infectie
- kortademigheid
- duizeligheid

Thioguanine kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) of telefonisch (1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse pilopassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op: <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

- misselijkheid

- braken
- overmatig zweten
- ongewone vermoeidheid of zwakte
- ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken
- koorts, keelpijn, aanhoudende hoest en congestie, of andere tekenen van infectie

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts kan bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie van uw lichaam op thioguanine te controleren.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige (zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

- tabloid®

andere namen

- 2-Amino-6-mercaptapurine
- 6-TG
- 6-thioguanine

Laatst herzien - 15-05-2017

[Leer hoe u deze pagina kunt citeren](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstututen

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022