



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Bahay](#) → [Mga Gamot, Herb at Supplement](#) → Thioguanine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ng page na ito: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682099.html>

Thioguanine

binibigkas bilang (thye'' oh gwah' neen)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Thioguanine ay ginagamit upang gamutin ang acute myeloid leukemia (AML; isang uri ng kanser na nagsisimula sa mga puting selula ng dugo). Ang Thioguanine ay nasa isang klase ng mga gamot na kilala bilang purine analogs. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbagal o pagpapahinto sa paglaki ng mga selula ng kanser sa iyong katawan.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Thioguanine ay dumarating bilang isang tablet na iniinom sa pamamagitan ng bibig karaniwang isang beses sa isang araw. Ang tagal ng paggamot ay depende sa mga uri ng mga gamot na iyong iniinom, kung gaano kahusay tumugon ang iyong katawan sa mga ito, at ang uri ng kanser na mayroon ka. Uminom ng thioguanine sa halos parehong oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Uminom ng thioguanine nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Maaaring taasan o bawasan ng iyong doktor ang iyong dosis ng thioguanine sa panahon ng iyong paggamot. Depende ito sa kung gaano kahusay ang paggana ng gamot para sa iyo at sa mga side effect na iyong nararanasan. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa iyong nararamdaman sa panahon ng iyong paggamot. Ipagpatuloy ang pag-inom ng thioguanine kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag tumigil sa pag-inom ng thioguanine nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng thioguanine,

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa thioguanine, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa thioguanine tablets. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.
- sabihin sa iyong doktor kung nakainom ka na ng thioguanine o mercaptopurine para gamutin ang iyong kanser. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng thioguanine kung alinman sa mga gamot na ito ay hindi gumana nang maayos laban sa iyong kanser sa nakaraan.

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: aminosalicylates tulad ng mesalamine (Apriso, Asacol, Pentasa, iba pa), olsalazine (Dipentum), at sulfasalazine (Azulfidine). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Sabihin din sa iyong doktor at parmasyutiko ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom upang masuri nila kung ang alinman sa iyong mga gamot ay maaaring magpataas ng panganib na magkaroon ka ng pinsala sa atay sa panahon ng iyong paggamot na may thioguanine.
- sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa atay.
- sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Hindi ka dapat magbuntis o magpapasuso habang tumatanggap ka ng thioguanine. Kung ikaw ay buntis habang tumatanggap ng thioguanine, tawagan ang iyong doktor. Ang Thioguanine ay maaaring makapinsala sa fetus.
- huwag magkaroon ng anumang pagbabakuna nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.
- dapat mong malaman na ang panganib na magkaroon ka ng malubhang epekto ng thioguanine ay maaaring mas mataas kung mayroon kang genetic (minanang) risk factor. Maaaring mag-order ang iyong doktor ng mga pagsusuri bago o sa panahon ng iyong paggamot upang makita kung mayroon kang ganitong risk factor.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Uminom ng maraming likido sa panahon ng iyong paggamot na may thioguanine.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyl ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Thioguanine ay maaaring maging sanhi ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

- pagduduwal
- pagsusuka
- pagkawala ng gana o timbang
- mga sugat sa bibig at lalamunan
- sakit ng ulo

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan kaagad ang iyong doktor:

- hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan
- hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa
- paninilaw ng balat o mata
- mga sintomas tulad ng trangkaso

- pamamaga ng bahagi ng tiyan
- pananakit ng tiyan, lalo na sa kanang bahagi ng tiyan
- pamamaga ng mukha, braso, kamay, paa, bukung-bukong o ibabang binti
- madugong suka
- itim, dumi o madugong dumi
- lagnat, namamagang lalamunan, patuloy na pag-ubo at kasikipan, o iba pang mga palatandaan ng impeksyon
- kinakapos na paghinga
- pagkahilo

Ang Thioguanine ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332-1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

Mahalagang panatiliing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emerhensya sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

- pagduduwal

- pagsusuka
- Sobra-sobrang pagpapawis
- hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan
- hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa
- lagnat, namamagang lalamunan, patuloy na pag-ubo at kasikipan, o iba pang mga palatandaan ng impeksyon

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay maaaring mag-order ng ilang mga pagsubok sa lab upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa thioguanine.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

- Tabloid®

mga pangalan

- 2-Amino-6-mercaptopurine
- 6-TG
- 6-Thioguanine

Huling Binago - 05/15/2017

[Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS® Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022