

[Domicile](#) → [Médicaments, herbes et suppléments](#) → Thioguanine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682099.html>

Thioguanine

prononcé comme (thye" oh gwah' neen)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

La thioguanine est utilisée pour traiter la leucémie myéloïde aiguë (LMA, un type de cancer qui prend naissance dans les globules blancs). La thioguanine appartient à une classe de médicaments appelés analogues de la purine. Il agit en ralentissant ou en arrêtant la croissance des cellules cancéreuses dans votre corps.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

La thioguanine se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale, généralement une fois par jour. La durée du traitement dépend des types de médicaments que vous prenez, de la façon dont votre corps y répond et du type de cancer dont vous souffrez. Prenez de la thioguanine à peu près à la même heure chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez la thioguanine exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Votre médecin peut augmenter ou diminuer votre dose de thioguanine pendant votre traitement. Cela dépend de l'efficacité du médicament pour vous et des effets secondaires que vous ressentez. Discutez avec votre médecin de la façon dont vous vous sentez pendant votre traitement. Continuez à prendre de la thioguanine même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre de la thioguanine sans en parler à votre médecin

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre de la thioguanine,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la thioguanine, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients des comprimés de thioguanine. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.
- informez votre médecin si vous avez déjà pris de la thioguanine ou de la mercaptopurine pour traiter votre cancer. Votre médecin peut vous dire de ne pas prendre de thioguanine si l'un de ces médicaments n'a pas bien fonctionné contre votre cancer dans le passé.

- informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : les aminosalicyles tels que la mésalamine (Apriso, Asacol, Pentasa, autres), l'olsalazine (Dipentum) et la sulfasalazine (Azulfidine). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. Informez également votre médecin et votre pharmacien de tous les médicaments que vous prenez afin qu'ils puissent vérifier si l'un de vos médicaments peut augmenter le risque que vous développiez des lésions hépatiques pendant votre traitement par la thioguanine.
- informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie du foie.
- informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Vous ne devez pas devenir enceinte ou allaiter pendant que vous recevez de la thioguanine. Si vous tombez enceinte pendant que vous recevez de la thioguanine, appelez votre médecin. La thioguanine peut nuire au fœtus.
- ne vous faites pas vacciner sans en parler avec votre médecin.
- vous devez savoir que le risque de développer des effets secondaires graves de la thioguanine peut être plus élevé si vous présentez un facteur de risque génétique (héréditaire). Votre médecin peut prescrire des tests avant ou pendant votre traitement pour voir si vous avez ce facteur de risque.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

Buvez beaucoup de liquides pendant votre traitement avec la thioguanine.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

La thioguanine peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

- nausée
- vomissement
- perte d'appétit ou de poids
- plaies dans la bouche et la gorge
- mal de crâne

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez immédiatement votre médecin :

- fatigue ou faiblesse inhabituelle
- saignements ou ecchymoses inhabituels
- jaunissement de la peau ou des yeux
- symptômes pseudo-grippaux

- gonflement de la région de l'estomac
- douleurs à l'estomac, en particulier dans la partie droite de l'estomac
- gonflement du visage, des bras, des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes
- vomi sanglant
- selles noires, goudronneuses ou sanglantes
- fièvre, mal de gorge, toux et congestion persistantes ou autres signes d'infection
- essoufflement
- étourdissement

La thioguanine peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patches et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne sur <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

- nausée

- vomissement
- transpiration excessive
- fatigue ou faiblesse inhabituelle
- saignements ou ecchymoses inhabituels
- fièvre, mal de gorge, toux et congestion persistantes ou autres signes d'infection

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin peut prescrire certains tests de laboratoire pour vérifier la réponse de votre corps à la thioguanine.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

- Tabloïde®

autres noms

- 2-Amino-6-mercaptopurine
- 6-TG
- 6-thioguanine

Dernière révision - 15/05/2017

[Apprenez à citer cette page](#)



[Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.](#)

AHFS®Renseignements pour les patients sur les médicamentsMC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autoriséé par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022