



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [薬](#)、[ハーブ](#)、[サプリメント](#) → [チオテパ注射](#)

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682821.html>

## チオテパ注射

(*thye'' oh tep'a*) と発音されます

### なぜこの薬が処方されているのですか？

チオテパは、特定の種類の卵巣がん（卵子が形成される女性の生殖器で発生するがん）、乳がん、膀胱がんの治療に使用されます。また、癌性腫瘍によって引き起こされる悪性胸水（肺や心臓の周りに体液が溜まる状態）の治療にも使用されます。チオテパは、アルキル化剤と呼ばれる薬のクラスに属しています。それはあなたの体の癌細胞の成長を遅らせるか、または止めることによって働きます。

### わあ、この薬を使うべきですか？

チオテパは、医療施設の医師または看護師が静脈内（静脈内）に注射する液体と混合する粉末として提供されます。また、腹腔内（腹腔内）、胸膜内（胸腔内）、または心膜内（心臓の内層）に注射することもできます。治療のスケジュールは、あなたの状態とチオテパへの反応によって異なります。

膀胱がんを使用する場合、チオテパはチューブまたはカテーテルを介して週に1回、4週間膀胱に注入（ゆっくりと注入）されます。治療前の8~12時間は水分を飲まないでください。膀胱内に2時間薬を入れておく必要があります。膀胱内に2時間薬を入れておくことができない場合は、医療提供者に伝えてください。

### この薬の用途

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

### 特別な注意事項に従う必要がありますか？

チオテパを受け取る前に、

- チオテパ、他の薬、またはチオテパ注射の成分のいずれかにアレルギーがあるかどうかを医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。
- あなたが服用している、または服用する予定の他の処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、およびハーブ製品を医師と薬剤師に伝えてください。
- 腎臓や肝臓の病気にかかったことがあるか、今までにあったかどうかを医師に伝えてください。あなたの医師はあなたにチオテパを受け取らないことを望まないかもしれません。

- 以前に放射線（X線）療法または他の化学療法を受けたことがあるか、または受ける予定であるかどうか、および何らかの病状を経験したか、または経験したことがあるかどうかを医師に伝えてください。
- チオテパは、女性の通常の月経周期（期間）を妨げ、男性の精子産生を停止させ、不妊症（妊娠困難）を引き起こす可能性があることを知っておく必要があります。妊娠中の女性は、この薬の服用を開始する前に医師に相談する必要があります。あなたまたはあなたのパートナーは、あなたがチオテパを服用している間は妊娠してはいけません。チオテパ注射による治療中は、避妊を使用して自分自身またはパートナーの妊娠を防ぐ必要があります。
- 母乳育児をしている場合は医師に相談してください。チオテパを服用している間は授乳しないでください。

## 特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

## この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

チオテパは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 吐き気
- 嘔吐
- 食欲減少
- 胃痛
- 異常な倦怠感または脱力感
- めまい
- 頭痛
- かすみ目
- 目の痛みや赤い
- 脱毛
- 薬が注射された場所の痛み

いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡するか、緊急治療を受けてください。

- じんましん
- 発疹
- かゆみ
- 呼吸困難または嚥下困難
- 頻繁な、緊急の、または痛みを伴う排尿
- 尿中の血
- 発熱、喉の痛み、悪寒、またはその他の感染症の兆候

- 異常な出血またはあざ
- 黒とタールのスツール
- 便中の赤い血
- 吐血; コーヒーかすのように見える嘔吐物
- 鼻血

チオテパは、他の癌を発症するリスクを高める可能性があります。チオテパ注射を受けるリスクについて医師に相談してください。

チオテパは他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の服用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。

（<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]）または電話（1-800-332-1088）。

## n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

### 過剰摂取の症状には次のものがあります。

- 発熱、喉の痛み、悪寒、またはその他の感染症の兆候
- 異常な出血またはあざ
- 黒とタールのスツール
- 便中の赤い血
- 吐血; コーヒーかすのように見える嘔吐物

### 他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。医師は、チオテパに対する体の反応をチェックするために、特定の臨床検査を注文します。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

## ランド名

- テパディーナ®
- チオブレックス®¶

¶-このブランドの製品はもう市場に出ていません。一般的な代替手段が利用できる場合があります。

最終改訂日-2013年3月15日

[このページを引用する方法を学ぶ](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc.免責事項](#)

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製  
商用利用はASHPの承認が必要です。

---

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日