



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [药物、草药和补充剂](#) → 噻替帕注射液

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682821.html>

噻替帕注射液

发音为 (thye'' oh tep' a)

为什么要开这种药?

Thiotepa 用于治疗某些类型的卵巢癌（从形成卵子的女性生殖器官开始的癌症）、乳腺癌和膀胱癌。它还用于治疗由癌性肿瘤引起的恶性积液（液体聚集在肺部或心脏周围的情况）。Thiotepa 属于一类称为烷化剂的药物。它的作用是减缓或阻止体内癌细胞的生长。

这个药应该怎么用?

噻替帕是一种粉末，与液体混合，由医疗机构的医生或护士静脉注射（进入静脉）。它也可以腹膜内（进入腹腔）、胸膜内（进入胸腔）或心包内（进入心脏内壁）注射。您的治疗时间表取决于您的病情以及您对噻替帕的反应。

当用于治疗膀胱癌时，噻替帕每周一次通过管子或导管注入（缓慢注射）到您的膀胱中，持续 4 周。治疗前 8 至 12 小时避免饮用液体。您应该将药物留在膀胱中 2 小时。如果您不能将药物在膀胱中保留整整 2 小时，请告诉您的医疗保健提供者。

该药的其他用途

这种药物可用于其他用途；向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施?

在接受噻替帕之前，

- 如果您对噻替帕、任何其他药物或噻替帕注射液中的任何成分过敏，请告诉您的医生和药剂师。向您的药剂师索取成分清单。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用的其他处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。
- 如果您患有或曾经患有肾脏或肝脏疾病，请告诉您的医生。您的医生可能不希望您不接受噻替帕。

- 告诉您的医生您之前是否接受过或将要接受放射（X射线）治疗或其他化学疗法，以及您是否曾经或曾经患有任何疾病。
- 您应该知道噻替帕可能会干扰女性的正常月经周期（经期），可能会阻止男性的精子生成，并可能导致不孕症（难以怀孕）。怀孕的妇女应该在开始接受这种药物之前告诉她们的医生。您或您的伴侣在接受噻替帕治疗期间不应怀孕。在噻替帕注射液治疗期间，您应该使用避孕措施来防止您自己或您的伴侣怀孕。
- 如果您正在哺乳，请告诉您的医生。接受噻替帕治疗期间不应进行母乳喂养。

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

除非您的医生另有说明，否则请继续您的正常饮食。

这种药物会引起副作用吗？

噻替帕可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 恶心
- 呕吐
- 食欲不振
- 肚子痛
- 异常疲倦或虚弱
- 头晕
- 头痛
- 视力模糊
- 眼睛酸痛或发红
- 脱发
- 注射药物的地方疼痛

一些副作用可能很严重。如果您出现任何这些症状，请立即致电您的医生或接受紧急医疗：

- 麻疹
- 皮疹
- 瘙痒
- 呼吸或吞咽困难
- 频繁、紧急或疼痛的排尿
- 尿液中有血
- 发烧、喉咙痛、发冷或其他感染迹象

- 异常出血或瘀伤
- 黑色和柏油样凳子
- 大便带红血
- 血腥呕吐物；看起来像咖啡渣的呕吐物
- 鼻血

Thiotepa 可能会增加您患其他癌症的风险。与您的医生讨论接受噻替帕注射的风险。

噻替帕可能会引起其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] 或通过电话 (1-800-332-1088))。

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

过量服用的症状可能包括：

- 发烧、喉咙痛、发冷或其他感染迹象
- 异常出血或瘀伤
- 黑色和柏油样凳子
- 大便带红血
- 血腥呕吐物；看起来像咖啡渣的呕吐物

我应该知道其他信息吗？

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生会下令进行某些实验室测试，以检查您的身体对噻替帕的反应。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 特帕迪纳®
- 硫代复合物®¶

¶ - 该品牌产品已不再上市。可能有通用的替代品。

最后修订 - 2013年3月15日

[了解如何引用此页面](#)



[美国卫生系统药剂师协会免责声明](#)

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面: 2022年3月25日