Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614002.html

替加环素注射液

发音为 (tye" ge sye' kleen)

重要警告：

在临床研究中，因严重感染而接受替加环素注射治疗的患者比因严重感染而接受其他药物治疗的患者死亡人数更多。这些人死亡是因为他们的感染恶化，因为他们出现了感染并发症，或者因为他们患有其他疾病。没有足够的信息来判断使用替加环素注射液是否会增加治疗期间的死亡风险。如果其他药物不能用于治疗您的感染，您的医生只会给您注射替加环素。

与您的医生讨论使用替加环素注射液的风险。

为什么要开这种药？

替加环素注射液用于治疗某些严重感染，包括社区获得性肺炎（一种在未住院的人身上发生的肺部感染）、皮肤感染和腹部感染（胸部和腰部之间的区域）。替加环素注射液不应用于治疗使用呼吸机或住院患者发生的肺炎或糖尿病患者的足部感染。替加环素注射液属于一类称为四环素抗生素的药物。它通过杀死引起感染的细菌起作用。

替加环素注射液等抗生素对感冒、流感或其他病毒感染无效。在不需要的情况下使用抗生素会增加您以后感染抗生素治疗的风险。

这个药应该怎么用？

替加环素注射液以粉末形式出现，与液体混合并注入静脉。它通常在 30 到 60 分钟的时间内通过静脉内（进入静脉）输注（缓慢注射），每 12 小时一次。您的治疗时间取决于您感染的类型以及您的身体对药物的反应。

您可以在医院接受替加环素注射，也可以在家中使用该药物。如果您将在家中使用替加环素注射液，您的医疗保健提供者将向您展示如何注入药物。确保您了解这些说明，如有任何问题，请咨询您的医疗保健提供者。如果您在输注替加环素注射液时遇到任何问题，请咨询您的医疗保健提供者该怎么做。

在替加环素注射治疗的最初几天，您应该开始感觉好些。如果您的症状没有改善或恶化，请致电您的医生。

即使您感觉好些，也要使用替加环素注射液直至完成处方。如果您过早停止使用替加环素注射液或跳过剂量，您的感染可能无法完全治疗，并且细菌可能会对抗生素产生耐药性。

该药的其他用途

这种药物可用于其他用途；向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施？

在使用替加环素注射液之前，

- 如果您对替加环素注射液过敏，请告诉您的医生和药剂师；其他四环素抗生素，例如地美环素、强力霉素（Monodox、Oracea、Vibramcyin）、米诺环素（Dynacin、Minocin、Solodyn）和四环素（Achromycin V，in Pylera）；任何其他药物，或替加环素注射液中的任何成分。向您的药剂师索取成分清单。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用的其他处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。请务必提及抗凝剂（“血液稀释剂”），例如华法林（Coumadin，Jantoven）。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。
- 如果您患有或曾经患有肝病，请告诉您的医生。
- 您应该知道替加环素可能会降低激素避孕药（避孕药、贴片、避孕环或注射剂）的有效性。与您的医生讨论使用另一种避孕方式。
- 如果您怀孕或计划怀孕，请告诉您的医生。如果您在使用替加环素注射液时怀孕，请致电您的医生。
- 如果您正在哺乳，请告诉您的医生。您的医生可能会告诉您在使用替加环素治疗期间和最后一次服药后的 9 天内不要进行母乳喂养。
- 计划避免不必要或长时间暴露在阳光或紫外线下（日光浴床和太阳灯），并穿防护服、太阳镜和防晒霜。替加环素注射液可能会使您的皮肤对阳光或紫外线敏感。
- 您应该知道，在怀孕的第二或第三个三个月或在婴儿或 8 岁以下的儿童中使用替加环素注射液时，可能会导致牙齿永久染色并暂时影响骨骼生长。除非您的医生决定需要替加环素，否则不应将替加环素用于 8 岁以下的儿童。

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

除非您的医生另有说明，否则请继续您的正常饮食。

这种药物会引起副作用吗？

替加环素注射液可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 恶心
- 呕吐
- 腹泻
- 胃灼热
- 食欲不振
- 改变事物的味道
- 头痛
- 头晕
- 阴道瘙痒
- 白色或黄色阴道分泌物
- 替加环素注射部位附近的疼痛、发红、肿胀或出血

一些副作用可能很严重。如果您出现以下任何症状，请立即致电您的医生或寻求紧急医疗帮助：

- 伴有或不伴有发烧和胃痉挛的严重腹泻（水样便或血便）（可能在治疗后长达 2 个月或更长时间出现）
- 起泡或脱皮的皮肤
- 皮疹
- 麻疹
- 面部、颈部、喉咙、舌头、嘴唇或眼睛刺痛或肿胀
- 呼吸或吞咽困难
- 瘙痒
- 从胃部开始但可能扩散到背部的持续疼痛
- 喉咙痛、发烧、发冷和其他新感染或感染恶化的迹象

替加环素注射液可能会引起其他副作用。如果您在使用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告 (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. 如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

过量服用的症状可能包括以下内容：

- 恶心
- 呕吐

我应该知道其他信息吗？

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生可能会下令进行某些实验室测试，以检查您的身体对替加环素注射液的反应。

如果您在完成替加环素注射后仍有感染症状，请致电您的医生。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 泰加西尔®

最后修订 - 2020 年 3 月 15 日

了解如何引用此页面

美国卫生系统药剂师协会免责声明
AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制
用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部
美国国立卫生研究院
最后更新页面：2022 年 3 月 25 日