

כתובת האתר של דף זה: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610007.html>

טופוטקאן

(toe" poe tee' kan) מבוטא כמו

אזהרה חשובה:

טופוטקאן עלול לגרום לירידה במספר תאי הדם המיוצרים על ידי מח העצם שלך. זה מגביר את הסיכון שתפתח זיהום רציני. אסור ליטול טופוטקאן אם כבר יש לך מספר נמוך של תאי דם. הרופא שלך יזמין בדיקות מעבדה באופן קבוע לפני ובמהלך הטיפול כדי לבדוק אם יש לגוף מספיק תאי דם. אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים, התקשר לרופא מיד: כאב גרון, צמרמורות, חום, שיעול, צריבה או הטלת שתן כואבת, או סימנים אחרים של זיהום; כאב בטן; חבורות או דימום חריגים; עייפות יתר; כאב ראש; סחרחורת; בלבול; עור חיוור; פעימות לב מהירות; או קוצר נשימה.

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך והמעבדה. הרופא שלך יזמין בדיקות מסוימות כדי לבדוק את תגובת הגוף שלך לטופוטקן.

שוחח עם הרופא שלך על הסיכונים של נטילת טופוטקן.

היי האם נרשמה תרופה זו?

זה עובד על ידי הרג תאים סרטניים. I משמש לטיפול בסרטן ריאות של תאים קטנים (סוג של סרטן שמתחיל בריאות) שטופל בהצלחה בתרופה כימותרפית אחרת אך חזר לא לפני 45 ימים לאחר נטילת המנה האחרונה של התרופה הכימותרפית הראשונה. טופוטקאן הוא בקבוצה של תרופות הנקראות מעכבי טופואיזומראז Topotecan

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

טופוטקאן מגיע כקפסולה לנטילה דרך הפה. זה יכול להילקח עם או בלי אוכל. זה נלקח בדרך כלל פעם ביום במשך 5 ימים ברציפות כל 21 יום. הרופא שלך יחליט כמה פעמים עליך לחזור על מחזור זה. קח טופוטקאן בערך באותה שעה בכל יום. עקוב אחר ההוראות על תווית המרשם שלך בקפידה, ובקש מהרופא או הרוקח שלך להסביר כל חלק שאינך מבין. קח טופוטקאן בדיוק לפי ההוראות. אין ליטול יותר או פחות ממנו או לקחת אותו לעתים קרובות יותר ממה שרשם הרופא שלך.

לבלוע את הכמוסות בשלמותן עם מים; אין לפתוח, ללעוס או לכתוש אותם.

כמוסות טופוטקאן מגיעות בשני עוצמות שונות. ייתכן שהרופא שלך ירצה שתיקח שילוב של שתי החוזקות של כמוסות כדי להמציא את המינון המלא שלך. ודא שאתה יודע איך כל סוג של כמוסה נראה וכמה אתה צריך לקחת מכל אחד. שאל את הרופא או הרוקח אם יש לך שאלות כלשהן.

אם אחת מהקפסולות נשברה או דולפת, אל תיגע בהן בידיים חשופות. השלך בזהירות את הקפסולות השבורות מבלי לגעת בהן ישירות ולאחר מכן שטף את הידיים היטב במים וסבון. אם תכולת הקפסולה אכן נוגעת בעור שלך, שטפו את האזור היטב במים וסבון מיד. אם תכולת קפסולה כלשהי נכנסת לעיניים, שטפו את העיניים מיד במים זורמים בעדינות למשך 15 דקות לפחות. התקשר לרופא שלך אם יש לך תגובה עורית כלשהי או אם תרופות נכנסות לעיניים שלך.

אתה עלול להקיא לאחר נטילת התרופה. אם זה קורה, הודע לרופא שלך מיד. אין ליטול מנה נוספת של טופוטקאן באותו היום.

ייתכן שהרופא שלך יצטרך לדחות את הטיפול או להתאים את המינון שלך אם אתה חווה תופעות לוואי מסוימות. הקפד לספר לרופא שלך איך אתה מרגיש במהלך הטיפול בטופוטקן.

בקש מהרוקח או מהרופא שלך עותק של מידע היצרן עבור המטופל.

השימושים בתרופה זו

תרופה זו עשויה להירשם לשימושים אחרים; שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

יש לנקוט באמצעי זהירות מיוחדים?

לפני נטילת טופוטקאן,

- ספר לרופא ולרוקח שלך אם אתה אלרגי לטופוטקן, לכל תרופה אחרת או לאחד מהמרכיבים שבקפסולות טופוטקן. בקש מהרוקח שלך רשימה של המרכיבים.
- ספר לרופא ולרוקח אילו תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחים אתה לוקח או מתכוון לקחת. הקפד להזכיר כל אחד מהדברים הבאים: ציקלוספורין (Gengraf, Neoral, Sandimmune); ketoconazole (ניזורל); ritonavir (נורביר, בקאלטרה); או (Fortovase, Invirase, saquinavir). ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את מינון התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי.
- ספר לרופא שלך אם יש לך או סבלת ממחלת כליות.
- ספר לרופא שלך אם אתה בהריון או מתכננת להיכנס להריון. את לא צריכה להיכנס להריון בזמן שאת נוטלת טופוטקאן. שוחח עם הרופא שלך על שיטות למניעת הריון בהן תוכל להשתמש במהלך הטיפול. אם את נכנסת להריון בזמן נטילת טופוטקאן, התקשרי לרופא מיד. טופוטקן עלול להזיק לעובר.
- ספר לרופא שלך אם אתה מניקה. את לא צריכה להניק בזמן שאת נוטלת טופוטקאן.
- אם אתה עובר ניתוח, כולל ניתוח שיניים, ספר לרופא או לרופא השיניים שאתה נוטל טופוטקן.
- אתה צריך לדעת שטופוטקן עלול לגרום לך ישנוני, עייף או חלש. אין לנהוג במכונית, להשתמש בכלים כבדים או להפעיל מכונות עד שתדע כיצד התרופה הזו משפיעה עליך.
- עליך לדעת שטופוטקן עלול לגרום לשלשולים חמורים שייתכן שיידרשו טיפול בבית חולים. שוחח עם הרופא שלך על איך למנוע ולטפל בשלשולים. התקשר לרופא שלך מיד אם יש לך

כל אחד מהתסמינים הבאים: שלשול עם חום, שלשול 3 פעמים או יותר ביום, או שלשול עם כאבי בטן או התכווצויות.

האם עליי לעקוב אחר הוראות תזונה מיוחדות?

אלא אם כן הרופא שלך אומר לך אחרת, המשך בתזונה הרגילה שלך.

כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

דלג על המנה שהוחמצה והמשך בלוח הזמנים הקבוע שלך במינון. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמצה. הודע לרופא שלך אם אתה מתגעגע למנה.

תופעות לוואי של תרופה זו יכולה לגרום?

טופטקאן עלול לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף:

- בחילה
- הקאה
- שלשול
- אובדן תיאבון
- איבוד שיער

תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים הללו או מאלה המפורטים בסעיפים 'אזהרה חשובה' או 'אמצעי זהירות מיוחדים', התקשר לרופא מיד:

- כוורות
- פריחה
- עקצוץ
- צר'ידות
- קשיי נשימה או בליעה

טופטקאן עלול לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות בזמן נטילת התרופה.

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatch באינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>) או בטלפון (1-800-332-1088).

צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

שמור את התרופה במיכל שבו היא הגיעה, סגור היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן אותו במקרר והגן עליו מפני אור.

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכניות החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות (<http://goo.gl/c4Rm4p>] <http://goo.gl/c4Rm4p>]) למידע נוסף אם אין לך גישה לתוכנית החזרה.

חשוב להרחיק את כל התרופות מטווח ראייה ומהישג ידם של ילדים, שכן מיכלים רבים (כגון משמר גלולות שבועי ואלו עבור טיפות עיניים, קרמים, מדבקות ומשאפים) אינם עמידים לילדים וילדים צעירים יכולים לפתוח אותם בקלות. כדי להגן על ילדים צעירים מפני הרעלה, תמיד לנעול מכסי בטיחות ולהניח מיד את התרופה במקום בטוח - כזה שנמצא למעלה והרחק ומחוץ לטווח ראייה והישג ידם. <http://www.upandaway.org>] <http://www.upandaway.org>

במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת <https://www.poisohelp.org/help>] <https://www.poisohelp.org/help>. אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

תסמינים של מנת יתר עשויים לכלול:

- כאב גרון, צמרמורות, חום, שיעול, צריבה או השתנה כואבת, או סימנים אחרים של זיהום
- חבורות או דימום חריגים
- עייפות יתר
- כאב ראש
- סחרחורת
- בלבול
- עור חיוור
- פעימות לב מהירות
- קוצר נשימה

צריך לדעת מידע אחר?

אל תיתן לאף אחד אחר לקחת את התרופות שלך. שאל את הרוקח שלך כל שאלה שיש לך לגבי מילוי מחדש של המרשם שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כגון ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

שמות רנד

- היקמטין®

מתוקן לאחרונה - 15/10/2016

[למד כיצד לצטט דף זה](#)

[האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc.](#) כתב ויתור

AHFS® מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות® כל הזכויות שמורות. שכפול. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 8600 מחלקת הבריאות ושירותי האנוש האמריקאית

המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022