

[家](#) → [薬](#)、[ハーブ](#)、[サプリメント](#) → トポテカン

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610007.html>

## トポテカン

(toe'' poe tee'kan) と発音します

### 重要な警告：

トポテカンは、骨髄によって作られる血球の数を減らす可能性があります。これにより、深刻な感染症を発症するリスクが高まります。すでに血球数が少ない場合は、トポテカンを服用しないでください。医師は、治療前と治療中に定期的に臨床検査を行い、体に十分な血球があるかどうかを確認します。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。喉の痛み、悪寒、発熱、咳、灼熱感または排尿時の痛み、またはその他の感染症の兆候。胃痛; 異常なあざや出血; 過度の倦怠感; 頭痛; めまい; 錯乱; 薄い肌; 速い心拍; または息切れ。

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。あなたの医者はトポテカンに対するあなたの体の反応をチェックするために特定のテストを命じます。

トポテカンを服用するリスクについて医師に相談してください。

### なぜこの薬が処方されているのですか？

トポテカンは、別の化学療法薬でうまく治療されたが、最初の化学療法薬の最後の投与が行われてから45日以内に再発した小細胞肺癌（肺で始まるがんの一種）の治療に使用されます。トポテカンは、トポイソメラーゼI阻害剤と呼ばれる薬のクラスに含まれています。それは癌細胞を殺すことによって機能します。

### わあ、この薬を使うべきですか？

トポテカンは、経口摂取するカプセルとして提供されます。それは食物の有無にかかわらず取られるかもしれませんが。通常、21日ごとに5日連続で1日1回服用します。あなたの医者はあなたがこのサイクルを何回繰り返すべきかを決定します。毎日ほぼ同じ時間にトポテカンを服用してください。処方箋の指示に注意深く従って、あなたが理解していない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指示通りにトポテカンを服用してください。多かれ少なかれ服用したり、医師の処方よりも頻繁に服用したりしないでください。

カプセル全体を水で飲み込みます。それらを開いたり、噛んだり、押しつぶしたりしないでください。

トポテカンカプセルには2つの異なる強みがあります。あなたの医者はあなたにあなたの全用量を作るためにカプセルの両方の強さの組み合わせをとることをあなたに望むかもしれません。各タイプのカプセルがどのように見えるか、そしてそれぞれをいくつ服用するかを知っていることを確認してください。ご不明な点がございましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

カプセルが壊れたり漏れたりした場合は、素手で触れないでください。壊れたカプセルは直接触れずに丁寧に処分し、石鹼と水でよく洗ってください。カプセルの中身が肌に触れた場合は、すぐに石鹼と水でよく洗ってください。カプセルの内容物が目に入った場合は、すぐに穏やかに流れる水で15分以上目を洗ってください。皮膚反応がある場合、または薬が目に入った場合は、医師に連絡してください。

薬を服用した後、嘔吐することがあります。これが発生した場合は、すぐに医師に知らせてください。同じ日にトポテカンをもう1回服用しないでください。

あなたが特定の副作用を経験した場合、あなたの医者はあなたの治療を遅らせるか、あなたの用量を調整する必要があるかもしれません。トポテカンによる治療中の気分を医師に伝えてください。

薬剤師または医師に、患者に関する製造元の情報のコピーを依頼してください。

## この薬の用途

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

## 特別な注意事項に従う必要がありますか？

### トポテカンを服用する前に、

- トポテカン、他の薬、またはトポテカンカプセルの成分にアレルギーがあるかどうかを医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。
- 医師と薬剤師に、処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、および服用中または服用予定のハーブ製品を伝えてください。次のいずれかに必ず言及してください。シクロスポリン（Gengraf、Neoral、Sandimmune）。ケトコナゾール（ニゾラル）；リトナビル（カレトラのノルビル）；またはサキナビル（Fortovase、Invirase）。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。
- あなたが腎臓病を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。
- あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるかどうかを医師に伝えてください。トポテカンを服用している間は妊娠してはいけません。治療中に使用できる避妊方法については、医師に相談してください。トポテカン服用中に妊娠した場合は、すぐに医師に連絡してください。トポテカンは胎児に害を及ぼす可能性があります。
- 母乳育児をしている場合は医師に相談してください。トポテカン服用している間は授乳しないでください。
- 歯科手術を含む手術を受けている場合は、トポテカン服用していることを医師または歯科医に伝えてください。
- トポテカンは眠気を催したり、疲れたり、衰弱したりする可能性があることを知っておく必要があります。この薬があなたにどのような影響を与えるかがわかるまで、車を運転したり、重い道具を使用したり、機械を操作したりしないでください。
- トポテカンは、病院で治療する必要があるかもしれない重度の下痢を引き起こす可能性があることを知っておく必要があります。下痢を予防および治療する方法について医師に相談してください。持っている場合はすぐに医師に連絡してください。

次の症状のいずれか：発熱を伴う下痢、1日3回以上の下痢、または腹痛やけいれんを伴う下痢。

## 特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

## 服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

飲み忘れた分は飛ばして、通常の服用時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。服用し忘れた場合は医師に知らせてください。

## この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

トポテカンは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 吐き気
- 嘔吐
- 下痢
- 食欲減少
- 脱毛

いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状のいずれか、または重要な警告または特別な注意事項のセクションに記載されている症状が発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。

- じんましん
- 発疹
- かゆみ
- 嘔声
- 呼吸困難または嚥下困難

トポテカンは他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の服用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。

（（<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) または電話 (1-800-332-1088)。

## この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は入った容器に入れ、しっかりと閉じて、子供の手の届かないところに保管してください。冷蔵庫に保管し、光から保護してください。

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門にお問い合わせください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸入器など）は子供に耐性がなく、幼児は簡単に開けることができるため、すべての薬を子供の手の届かないところに置いておくことが重要です。幼児を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。 <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

## n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。 <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

### 過剰摂取の症状には次のものがあります。

- 喉の痛み、悪寒、発熱、咳、灼熱感または痛みを伴う排尿、またはその他の感染症の兆候
- 異常なあざや出血
- 過度の倦怠感
- 頭痛
- めまい
- 錯乱
- 薄い肌
- 速いハートビート
- 呼吸困難

### 他の情報を知っておく必要がありますか？

他の人にあなたの薬を服用させないでください。処方箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

## ランド名

- ハイカムチン®

最終改訂日-2016年10月15日

[このページを引用する方法を学ぶ](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. 免責事項](#)

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製  
商用利用はASHPの承認が必要です。

---

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日