

[Acasă](#) → [Medicamente, ierburi și suplimente](#) → Topotecan

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610007.html>

## Topotecan

pronunțat ca (toe" poe tee' kan)

### AVERTISMENT IMPORTANT:

Topotecanul poate determina o scădere a numărului de celule sanguine produse de măduva dumneavoastră osoasă. Acest lucru crește riscul de a dezvolta o infecție gravă. Nu trebuie să luați topotecan dacă aveți deja un număr scăzut de celule sanguine. Medicul dumneavoastră vă va comanda în mod regulat teste de laborator înainte și în timpul tratamentului pentru a verifica dacă corpul dumneavoastră are suficiente celule sanguine. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră: durere în gât, frisoane, febră, tuse, arsuri sau urinare dureroasă sau alte semne de infecție; dureri de stomac; vânătăi sau sângerări neobișnuite; oboseală excesivă; durere de cap; amețelă; confuzie; piele palidă; bătăi rapide ale inimii; sau scurtarea respirației.

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va prescrie anumite teste pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la topotecan.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua topotecan.

### de ce este prescris acest medicament?

Topotecanul este utilizat pentru a trata cancerul pulmonar cu celule mici (un tip de cancer care debutează în plămâni) care a fost tratat cu succes cu un alt medicament de chimioterapie, dar care a revenit la cel mult 45 de zile de la administrarea ultimei doze din primul medicament de chimioterapie. Topotecanul face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori ai topoizomerazei I. Funcționează prin uciderea celulelor canceroase.

### cum trebuie utilizat acest medicament?

Topotecanul vine sub formă de capsulă de luat pe cale orală. Poate fi luat cu sau fără alimente. De obicei, se ia o dată pe zi timp de 5 zile la rând la fiecare 21 de zile. Medicul dumneavoastră va decide de câte ori trebuie să repetați acest ciclu. Luați topotecan în fiecare zi aproximativ la aceeași oră. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și cereți-i medicului sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați topotecan exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Înghițiți capsulele întregi cu apă; nu le deschideți, mestecați sau zdrobiți.

Capsulele de topotecan sunt disponibile în două concentrații diferite. Medicul dumneavoastră poate dori să luați o combinație a ambelor concentrații de capsule pentru a vă completa doza completă. Asigurați-vă că știți cum arată fiecare tip de capsulă și câte trebuie să luați din fiecare. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări.

Dacă vreuna dintre capsule este ruptă sau are scurgeri, nu o atingeți cu mâinile goale. Aruncați cu grijă capsulele sparte fără a le atinge direct și apoi spălați-vă bine mâinile cu apă și săpun. Dacă conținutul capsulei vă atinge pielea, spălați bine zona cu apă și săpun imediat. Dacă conținutul capsulei vă intră în ochi, spălați-vă imediat ochii cu apă curgătoare ușor timp de cel puțin 15 minute. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți vreo reacție cutanată sau dacă vă intră medicamente în ochi.

Puteți vomita după ce luați medicamentul. Dacă se întâmplă acest lucru, anunțați imediat medicul dumneavoastră. Nu luați o altă doză de topotecan în aceeași zi.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să vă amâne tratamentul sau să vă ajusteze doza dacă prezentați anumite reacții adverse. Asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră cum vă simțiți în timpul tratamentului cu topotecan.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

### **există utilizări pentru acest medicament**

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

## **ce precauții speciale ar trebui să urmez?**

### **Înainte de a lua topotecan,**

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la topotecan, la orice alte medicamente sau la oricare dintre ingredientele din capsulele de topotecan. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: ciclosporină (Gengraf, Neoral, Sandimmune); ketoconazol (Nizoral); ritonavir (Norvir, în Kaletra); sau saquinavir (Fortovase, Invirase). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală de rinichi.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Nu trebuie să rămâneți gravidă în timp ce luați topotecan. Discutați cu medicul dumneavoastră despre metodele contraceptive pe care le puteți utiliza în timpul tratamentului. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați topotecan, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră. Topotecanul poate dăuna fătului.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Nu trebuie să alăptați în timp ce luați topotecan.
- dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați topotecan.
- trebuie să știți că topotecanul vă poate provoca somnolență, oboseală sau slăbiciune. Nu conduceți o mașină, nu folosiți unelte grele și nu utilizați utilaje până când nu știți cum vă afectează acest medicament.
- trebuie să știți că topotecanul poate provoca diaree severă care ar putea trebui tratată într-un spital. Discutați cu medicul dumneavoastră despre cum să preveniți și să tratați diareea. Sunați imediat medicul dumneavoastră dacă aveți

oricare dintre următoarele simptome: diaree cu febră, diaree de 3 sau mai multe ori pe zi sau diaree cu dureri de stomac sau crampe.

## ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

## ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Omiteți doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Anunțați medicul dumneavoastră dacă omiteți o doză.

## ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Topotecanul poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispăre:

- greață
- vărsături
- diaree
- pierderea poftei de mâncare
- Pierderea parului

**Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate în secțiunile AVERTISMENT IMPORTANT sau PRECAUȚII SPECIALE, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră:**

- urticarie
- eczemă
- mâncărime
- răgușeală
- dificultăți de respirație sau de înghițire

Topotecanul poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) sau la telefon (1-800-332-1088).

## ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la frigider și protejați-l de lumină.

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

## n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la adresa <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

### Simptomele supradozajului pot include:

- durere în gât, frisoane, febră, tuse, arsuri sau urinare dureroasă sau alte semne de infecție
- vânătăi sau sângerări neobișnuite
- oboseala excesiva
- durere de cap
- amețeală
- confuzie
- piele palida
- bătăi rapide ale inimii
- dificultăți de respirație

## ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

## nume rand

- Hycamtin®

Ultima revizuire - 15.10.2016

[Aflați cum să citați această pagină](#)



[Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii](#)

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

---

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022