

[Hem](#) → [Läkemedel, örter och kosttillskott](#) → Topotecan

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610007.html>

## Topotecan

uttalas som (toe" poe tee' kan)

### VIKTIG VARNING:

Topotecan kan orsaka en minskning av antalet blodkroppar som bildas av din benmärg. Detta ökar risken för att du ska utveckla en allvarlig infektion. Du ska inte ta topotecan om du redan har ett lågt antal blodkroppar. Din läkare kommer att beställa laborietester regelbundet före och under din behandling för att kontrollera om din kropp har tillräckligt med blodkroppar. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: ont i halsen, frossa, feber, hosta, brännande eller smärtsam urinering eller andra tecken på infektion; magont; ovanliga blåmärken eller blödningar; överdriven trötthet; huvudvärk; yrsel; förvirring; blek hud; snabb hjärtslag; eller andnöd.

Håll alla möten med din läkare och laborietester. Din läkare kommer att beställa vissa tester för att kontrollera din kropps svar på topotecan.

Tala med din läkare om riskerna med att ta topotecan.

### hur är denna medicin utskriven?

Topotecan används för att behandla småcellig lungcancer (en typ av cancer som börjar i lungorna) som framgångsrikt behandlats med en annan kemoterapimedicin men har kommit tillbaka tidigast 45 dagar efter att den sista dosen av den första kemoterapimedieinen togs. Topotecan är i en klass av läkemedel som kallas topoisomeras I-hämmare. Det fungerar genom att döda cancerceller.

### hur ska detta läkemedel användas?

Topotecan kommer som en kapsel att ta genom munnen. Det kan tas med eller utan mat. Det tas vanligtvis en gång om dagen i 5 dagar i rad var 21:e dag. Din läkare kommer att bestämma hur många gånger du ska upprepa denna cykel. Ta topotecan vid ungefär samma tid varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta topotecan exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Svälj kapslarna hela med vatten; öppna, tugga eller krossa dem inte.

Topotecan kapslar finns i två olika styrkor. Din läkare kanske vill att du ska ta en kombination av båda styrkorna av kapslarna för att kompensera för din fulla dos. Var säker på att du vet hur varje typ av kapsel ser ut och hur många du ska ta av varje. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor.

Om någon av kapslarna är trasiga eller läcker, rör dem inte med bara händerna. Kassera de trasiga kapslarna försiktigt utan att röra dem direkt och tvätta sedan händerna väl med tvål och vatten. Om kapselinnehållet vidrör din hud, tvätta området väl med tvål och vatten omedelbart. Om något kapselinnehåll kommer i ögonen, skölj ögonen genast med försiktigt rinnande vatten i minst 15 minuter. Ring din läkare om du får någon hudreaktion eller om du får medicin i ögonen.

Du kan kräkas efter att du tagit medicinen. Om detta händer, låt din läkare veta omedelbart. Ta inte en ny dos topotekan samma dag.

Din läkare kan behöva skjuta upp behandlingen eller justera din dos om du upplever vissa biverkningar. Se till att berätta för din läkare hur du mår under din behandling med topotekan.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

#### **användningsområdena för detta läkemedel**

Denna medicin kan ordinerats för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

### **bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?**

#### **Innan du tar topotekan,**

- Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot topotekan, andra läkemedel eller något av innehållsämnen i topotekankapslar. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: ciklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); ketokonazol (Nizoral); ritonavir (Norvir, i Kaletra); eller saquinavir (Fortovase, Invirase). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.
- tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft njursjukdom.
- tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Du ska inte bli gravid medan du tar topotecan. Tala med din läkare om preventivmetoder som du kan använda under din behandling. Om du blir gravid medan du tar topotecan, kontakta din läkare omedelbart. Topotecan kan skada fostret.
- tala om för din läkare om du ammar. Du bör inte amma medan du tar topotecan.
- om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar topotecan.
- du bör veta att topotecan kan göra dig dåsig, trött eller svag. Kör inte bil, använd inte tunga verktyg eller använd maskiner förrän du vet hur denna medicin påverkar dig.
- du bör veta att topotecan kan orsaka svår diarré som kan behöva behandlas på sjukhus. Tala med din läkare om hur du förebygger och behandlar diarré. Ring din läkare omedelbart om du har

något av följande symtom: diarré med feber, diarré 3 eller fler gånger om dagen, eller diarré med magsmärtor eller kramper.

## **hatt speciella kostråd ska jag följa?**

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

## **hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?**

Hoppa över den missade dosen och fortsätt med ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos. Låt din läkare veta om du missar en dos.

## **hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?**

**Topotekan kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:**

- illamående
- kräkningar
- diarre
- aptitlöshet
- håravfall

**Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de som anges i avsnitten VIKTIG VARNING eller SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, kontakta din läkare omedelbart:**

- nässelfeber
- utslag
- klåda
- heshet
- svårigheter att andas eller svälja

Topotekan kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

## **hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?**

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i kylan och skydda den från ljus.

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) för mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

## **n nödfall/överdos**

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på<https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

### **Symtom på överdosering kan inkludera:**

- ont i halsen, frossa, feber, hosta, brännande eller smärtsam urinering eller andra tecken på infektion
- ovanliga blåmärken eller blödningar
- överdriven trötthet
- huvudvärk
- yrsel
- förvirring
- blek hud
- snabba hjärtslag
- andnöd

## **hat annan information bör jag veta?**

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

## **rand namn**

- Hycamtin®

Senast reviderad - 2016-10-15

[Lär dig hur du citerar den här sidan](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul](#)

AHFS® Patientmedicinering information™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

---

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022