



عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610007.html>

توبوتيكان تنطق باسم (toe "poe tee" kan)

تحذيرهام:

قد يتسبب التوبوتيكان في انخفاض عدد خلايا الدم التي ينتجها نخاع العظم. هذا يزيد من خطر إصابتك بعدوى خطيرة. يجب ألا تتناول توبوتيكان إذا كان لديك بالفعل عدد منخفض من خلايا الدم. سيطلب طبيبك الفحوصات المخبرية بانتظام قبل وأثناء العلاج للتحقق مما إذا كان جسمك يحتوي على خلايا دم كافية. إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية ، فاتصل بطبيبك على الفور: التهاب الحلق ، قشعريرة ، حمى ، سعال ، حرقة أو تبول مؤلم ، أو علامات أخرى للعدوى ؛ آلام في المعدة كدمات أو نزيف غير عادي. التعب المفرط صداع الراس؛ دوخة؛ ارتباك؛ جلد شاحب؛ ضربات قلب سريعة أو ضيق في التنفس.

احتفظ بجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر. سيطلب طبيبك اختبارات معينة للتحقق من استجابة جسمك للتوبوتيكان.

تحدث إلى طبيبك حول مخاطر تناول هذا الدواء.

لماذا يوصف هذا الدواء؟

يستخدم Topotecan لعلاج سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة (نوع من السرطان يبدأ في الرئتين) والذي تم علاجه بنجاح باستخدام دواء مختلف من العلاج الكيميائي ولكنه عاد بعد 45 يوماً من أخذ آخر جرعة من العلاج الكيميائي الأول. يقع Topotecan في فئة من الأدوية تسمى مثبطات Topoisomerase I. يعمل عن طريق قتل الخلايا السرطانية.

كيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي Topotecan كبسولة لأخذها عن طريق الفم. يمكن أن تؤخذ مع أو بدون الطعام. عادة ما يتم تناوله مرة واحدة يومياً لمدة 5 أيام متتالية كل 21 يوماً. سيقدر طبيبك عدد المرات التي يجب أن تكرر فيها هذه الدورة. خذ توبوتيكان في نفس الوقت تقريباً كل يوم. اتبع الإرشادات الموجودة على ملصق الوصفة الخاص بك بعناية ، واطلب من طبيبك أو الصيدلي شرح أي جزء لا تفهمه. خذ توبوتيكان بالضبط حسب التوجيهات. لا تأخذ أكثر أو أقل منه أو تتناوله أكثر مما وصفه طبيبك.

ابتلع الكبسولات كاملة بالماء ؛ لا تفتحها أو تمضغها أو تسحقها.

تأتي كبسولات Topotecan بنوعين مختلفين من القوة. قد يطلب منك طبيبك أن تأخذ مزيجاً من كلتا قوتي الكبسولات لتعويض جرعتك الكاملة. تأكد من أنك تعرف شكل كل نوع من الكبسولات وكم يجب أن تأخذ من كل منها. اسأل طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك أي أسئلة.

في حالة كسر أو تسريب أي من الكبسولات ، لا تلمسها بيديك. تخلص بعناية من الكبسولات المكسورة دون لمسها مباشرة ثم اغسل يديك جيداً بالماء والصابون. إذا لمست محتويات الكبسولة جلدك ، اغسل المنطقة جيداً بالماء والصابون على الفور. إذا دخلت أي من محتويات الكبسولة في عينيك ، اغسل عينيك على الفور بماء يتدفق برفق لمدة 15 دقيقة على الأقل. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي رد فعل جلدي أو إذا دخلت الأدوية في عينيك.

قد تتقيأ بعد تناول الدواء. إذا حدث هذا ، أخبر طبيبك على الفور. لا تأخذ جرعة أخرى من توبوتيكان في نفس اليوم.

قد يحتاج طبيبك إلى تأخير علاجك أو تعديل جرعتك إذا واجهت بعض الآثار الجانبية. تأكد من إخبار طبيبك بما تشعر به أثناء علاجك باستخدام توبوتيكان.

اطلب من الصيدلي أو الطبيب الحصول على نسخة من معلومات الشركة المصنعة للمريض.

هناك استخدامات لهذا الدواء

يمكن وصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

قبة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبل أخذ توبوتيكان ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كان لديك حساسية من توبوتيكان ، أو أي أدوية أخرى ، أو أي من المكونات في كبسولات توبوتيكان. اسأل الصيدلي عن قائمة المكونات.
- أخبر طبيبك والصيدلي عن الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التي تتناولها أو تخطط لتناولها. تأكد من ذكر أي مما يلي: السيكلوسبورين (Gengraf ، Neoral ، Sandimmune) ؛ الكيتوكونازول (نيزورال) ريتونافير (نورفير ، في كالترا) ؛ أو ساكوينافير (Fortovase ، Invirase). قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية.
- أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من مرض في الكلى أو سبق أن عانيت منه.
- أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل. يجب ألا تحملي أثناء تناول هذا الدواء. تحدث إلى طبيبك حول طرق تحديد النسل التي يمكنك استخدامها أثناء العلاج. إذا أصبحت حاملاً أثناء تناول هذا الدواء ، فاتصل بطبيبك على الفور. قد يؤدي التوبوتيكان الجنين.
- أخبر طبيبك إذا كنت مرضعة. يجب عدم الرضاعة الطبيعية أثناء تناول هذا الدواء.
- إذا كنت تخضع لعملية جراحية ، بما في ذلك جراحة الأسنان ، أخبر الطبيب أو طبيب الأسنان أنك تتناول توبوتيكان.
- يجب أن تعلم أن التوبوتيكان قد يجعلك نعساناً أو متعباً أو ضعيفاً. لا تقود السيارة أو تستخدم الأدوات الثقيلة أو تشغل الآلات حتى تعرف كيف يؤثر هذا الدواء عليك.
- يجب أن تعلم أن توبوتيكان يمكن أن يسبب الإسهال الشديد الذي قد يحتاج إلى العلاج في المستشفى. تحدث إلى طبيبك حول كيفية الوقاية من الإسهال وعلاجه. اتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك

أي من الأعراض التالية: إسهال مصحوب بحمى ، إسهال 3 مرات أو أكثر في اليوم ، أو إسهال مصحوب بآلام في المعدة أو تقلصات.

قبعة تعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

مالم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك ، استمر في نظامك الغذائي المعتاد.

قبعة يجب أن أفعلها إذا نسيت جرعة؟

تخطي الجرعة الفائتة واستمر في جدول الجرعات المعتاد. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية. أخبر طبيبك إذا فاتتك جرعة.

الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قد يسبب Topotecan آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- غثيان
- التقيؤ
- إسهال
- فقدان الشهية
- تساقط الشعر

بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض أو تلك المذكورة في قسم تحذير هام أو احتياطات خاصة ، فاتصل بطبيبك على الفور:

- قشعريرة
- متسرع
- متلهف، متشوق
- بحة في الصوت
- صعوبة في التنفس أو البلع

قد يسبب Topotecan آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء تناول هذا الدواء.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرة عبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).

[http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

قبعة يجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

احتفظ بهذا الدواء في الحاوية التي جاء فيها ، ومغلقة بإحكام ، وبعيداً عن متناول الأطفال. قم بتخزينه في الثلاجة وحمايته من الضوء.

يجب التخلص من الأدوية غير الضرورية بطرق خاصة لضمان عدم تمكن الحيوانات الأليفة والأطفال والأشخاص الآخرين من تناولها. ومع ذلك ، يجب ألا تغسل هذا الدواء في المراض. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل طريقة للتخلص من أدويةك هي من خلال برنامج استعادة الأدوية. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك أو اتصل بقسم القمامة / إعادة التدوير المحلي للتعرف على برامج الاستعادة في مجتمعك. راجع موقع ويب التخلص الآمن من الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء [http://goo.gl/c4Rm4p] /c4Rm4p]http://goo.gl/c4Rm4p] لمزيد من المعلومات إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج الاستعادة.

من المهم إبقاء جميع الأدوية بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال لأن العديد من الحاويات (مثل الأدوية الأسبوعية وقطرات العين والكريمات والبقع وأجهزة الاستنشاق) ليست مقاومة للأطفال ويمكن للأطفال الصغار فتحها بسهولة. لحماية الأطفال الصغار من التسمم ، قم دائماً بإغلاق أغطية الأمان ووضع الدواء على الفور في مكان آمن - مكان مرتفع وبعيداً عن أنظارهم ومدى وصولهم. [http://www.upandaway.org]http://www.upandaway.org]

نحالة طارئة / جرعة زائدة

في حالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على [https://www.poisonhelp.org/help]https://www.poisonhelp.org/help]. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

قد تشمل أعراض الجرعة الزائدة:

- التهاب الحلق ، قشعريرة ، حمى ، سعال ، حرقان أو التبول المؤلم ، أو علامات أخرى للعدوى
- كدمات أو نزيف غير عادي
- التعب المفرط
- صداع الراس
- دوخة
- ارتباك
- جلد شاحب
- ضربات قلب سريعة
- ضيق في التنفس

قبة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

لاتدع أي شخص آخر يأخذ دوائك. اسأل الصيدلي عن أي أسئلة لديك حول إعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك.

من المهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماء راند

- هيكامتين®

آخرمراجعة - 15/10/2016

[تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة](#)

إخلاءالمسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

AHFS®معلومات الدواء المريض ™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي®كل الحقوق محفوظة.
الازدواجية. 4500 East-West Highway، Suite 900، Bethesda، Maryland.
للاستخدامالتجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبةالوطنية للطب 8600 Rockville Pike، Bethesda، MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية
المعاهدالوطنية للصحة
آخرتحديث للصفحة: 25 مارس 2022