



Express Medicine Shipments, Globally!  
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

כתובת האתר של דף זה: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611047.html>

## הזרקת טריפטורלין מבוטא כ(trip"toe rel' in)

### היי האם נרשמה תרופה זו?

הזרקת טריפטורלין (Trelstar) משמשת לטיפול בתסמינים הקשורים לסרטן ערמונית מתקדם. הזרקת טריפטורלין (Triptodur) משמשת לטיפול בהתבגרות מוקדמת מרכזית (CPP); מצב הגורם לילדים להיכנס לגיל ההתבגרות מוקדם מדי, וכתוצאה מכך לצמיחת עצם מהירה מהרגיל והתפתחות מאפיינים מיניים) בילדים בני שנתיים ומעלה. הזרקת טריפטורלין היא בקבוצה של תרופות הנקראות אגוניסטים של הורמון משחרר גונדוטורופין (GnRH). זה עובד על ידי הפחתת כמות ההורמונים מסוימים בגוף.

### כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

הזרקת טריפטורלין (Trelstar) מגיעה כתרסיף בשחרור מורחב (ארוכי טווח) להזרקה לשריר של הישבן על ידי רופא או אחות במשרד רפואי או במרפאה. הזרקת טריפטורלין (Trelstar) מגיעה גם בתור תרסיף בשחרור מורחב להזרקה לשריר הישבן או הירך על ידי רופא או אחות במשרד רפואי או במרפאה. כאשר משתמשים בסרטן הערמונית, ניתנת בדרך כלל זריקה של 3.75 מ"ג טריפטורלין (Trelstar) כל 4 שבועות, זריקה של 11.25 מ"ג טריפטורלין (Trelstar) ניתנת בדרך כלל כל 12 שבועות, או זריקה של 22.5 מ"ג טריפטורלין (Trelstar) (ניתן בדרך כלל כל 24 שבועות. בשימוש בילדים עם התבגרות מוקדמת מרכזית, ניתנת בדרך כלל זריקה של 22.5 מ"ג של טריפטורלין (Triptodur) כל 24 שבועות.

טריפטורלין עלול לגרום לעלייה בהורמונים מסוימים בשבועות הראשונים לאחר ההזרקה. הרופא שלך יעקוב אחרך בקפידה עבור כל תסמין חדש או החמרה במהלך תקופה זו.

### השימושים בתרופה זו

תרופה זו עשויה להירשם לשימושים אחרים; שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

### יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

#### לפני קבלת זריקת טריפטורלין,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי לטריפטורלין, גוסרלין (זולדקס), היסטרלין (סופרלין (LA, Vantas), לאופרוליד (אליגרד, לופרון), נפארלין (סינראל), כל תרופה אחרת או כל אחד מהמרכיבים בהזרקת טריפטורלין. בקש מהרוקח שלך רשימה של המרכיבים.

- ספר לרופא ולרוקח אילו עוד תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחים אתה נוטל או מתכוון לקחת. הקפד להזכיר כל אחד מהדברים הבאים  
 ( : Nexterone, Pacerone(; bupropion)Aplenzin, Wellbutrin, Zyban( ;amiodarone;קרבמזפין  
 Tegretol, Teril), אחרים); מתילדופה (באלדוריל); (Reglan) metoclopramide; סרפין, או מעכבי ספיגה חוזרת של סרוטונין סלקטיביים (SSRI) כגון פלואוקסטין (פרוזק, סראפם), סרטלין (זולופט) ופארוקסטין (פקסיל). ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את מינון התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי.
- ספר לרופא שלך אם אתה או מישהו ממשפחתך סבלת אי פעם בתסמונת QT ארוכה (מצב המגביר את הסיכון לפתח דופק לא סדיר שעלול לגרום להתעלפות או למוות פתאומי). ספר גם לרופא שלך אם יש לך או סבלת אי פעם בסוכרת; סרטן שהתפשט לעמוד השדרה (עמוד השדרה); חסימת שתן (חסימה הגורמת לקושי במתן שתן), רמה נמוכה של אשלגן, סידן או מגנזיום בדם, התקף לב; אי ספיקת הלב; מחלת נפש; התקף או אפילפסיה; שבץ מוחי, מיני שבץ או בעיות מוח אחרות; גידול במוח; או מחלת לב, כליות או כבד.
- עליך לדעת שאין להשתמש בטריפטורלין בנשים בהריון או שעלולות להיכנס להריון. ספר לרופא שלך אם את בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה. אם אתה חושב שנכנסת להריון בזמן השימוש בהזרקת טריפטורלין, התקשר מיד לרופא שלך. הזרקת טריפטורלין עלולה להזיק לעובר.

## האם עליי לעקוב אחר הוראות תזונה מיוחדות?

אלא אם כן הרופא שלך אומר לך אחרת, המשך בתזונה הרגילה שלך.

## התרופה יכולה לגרום לתופעות לוואי?

**הזרקת טריפטורלין עלולה לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף:**

- כאב ראש
- צרבת
- עצירות
- גלי חום (גל פתאומי של חום גוף קל או עז), הזעה או רטיבות
- ירידה ביכולת או בתשוקה המינית
- שינויים במצב הרוח כגון בכי, עצבנות, חוסר סבלנות, כעס ותוקפנות
- כאבי רגליים או מפרקים
- כאבים בחזה
- דפאון
- כאב, גירוד, נפיחות או אדמומיות במקום שבו ניתנה ההזרקה
- קושי להירדם או להישאר ישן
- להשתעל

**תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים הללו, התקשר לרופא מיד או קבל טיפול רפואי חירום:**

- כוורות

- פריחה
- עקצוץ
- קשיי נשימה או בליעה
- נפיחות של הפנים, העיניים, הפה, הגרון, הלשון או השפתיים
- צרידות
- התקפים
- כאב בחזה
- כאב בזרועות, בגב, בצוואר או בלסת
- דיבור איטי או קשה
- סחרחורת או עילפון
- חולשה או חוסר תחושה של יד או רגל
- לא מסוגל להזיז רגליים
- כאב עצם
- הטלת שתן כואבת או קשה
- דם בשתן
- הטלת שתן תכופה
- צמא קיצוני
- חולשה
- ראייה מטושטשת
- פה יבש
- בחילה
- הקאה
- נשימה בעלת ריח פירותי
- ירידה בהכרה

בילדים המקבלים זריקת טריפטורלין (Triptodur) עבור התבגרות מוקדמת מרכזית, עלולים להופיע תסמינים חדשים או מחמירים של התפתחות מינית במהלך השבועות הראשונים של הטיפול. אצל בנות עלולה להופיע תחילת הווסת או כתמים (דימום נרתיקי קל) במהלך החודשיים הראשונים של טיפול זה. אם הדימום נמשך מעבר לחודש השני, התקשר לרופא שלך.

הזרקת טריפטורלין עלולה לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות בזמן השימוש בתרופה זו.

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatch באינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]http://www.fda.gov/Safety/MedWatch[ או בטלפון (1-800-332-1088).

## במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת <https://www.poisohelp.org/help>] <https://www.poisohelp.org/help>. אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

## צריך לדעת מידע אחר?

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך והמעבדה. הרופא שלך יזמין בדיקות מעבדה מסוימות וייקח מדידות גוף מסוימות כדי לבדוק את תגובת הגוף שלך להזרקת טריפטורלין. יש לבדוק את רמת הסוכר בדם ואת ההמוגלובין הגלוקוזיל (HbA1c) באופן קבוע.

לפני ביצוע בדיקת מעבדה כלשהי, ספר לרופא שלך ולצוות המעבדה שאתה מקבל הזרקת טריפטורלין.

שאל את הרוקח שלך כל שאלה שיש לך לגבי הזרקת טריפטורלין.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כמו ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

## שמות רנד

- טרלסטאר®
- טריפטודור®

מתוקן לאחרונה - 15/01/2018

[למד כיצד לצטט דף זה](#)



[האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc. כתב ויתור](#)

© AHFS מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות כל הזכויות שמורות. נשכפול. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 8600 משרד הבריאות האמריקאי ושירותי אנוש

המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022

