

[Acasă](#) → [Medicamente, ierburii și suplimente](#) → Injecție cu triptorelină

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611047.html>

## Injecție cu triptorelină pronunțat ca (trip" toe rel' in)

### de ce este prescris acest medicament?

Injecția cu triptorelină (Trelstar) este utilizată pentru a trata simptomele asociate cu cancerul de prostată avansat. Injecția cu triptorelină (Triptodur) este utilizată pentru a trata pubertatea precoce centrală (CPP; o afecțiune care determină copiii să intre în pubertate prea devreme, ducând la o creștere a oaselor și dezvoltarea caracteristicilor sexuale mai rapide decât în mod normal) la copiii de 2 ani și peste. Injecția cu triptorelină face parte dintr-o clasă de medicamente numite agoniști ai hormonului de eliberare a gonadotropinei (GnRH). Acționează prin scăderea cantității anumitor hormoni din organism.

### cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția cu triptorelină (Trelstar) vine ca o suspensie cu eliberare prelungită (cu acțiune prelungită) care trebuie injectată în mușchiul fiecărei fese de către un medic sau o asistentă într-un cabinet medical sau clinică. Injecția cu triptorelină (Trelstar) vine, de asemenea, ca o suspensie cu eliberare prelungită, care trebuie injectată în mușchiul fesei sau al coapsei de către un medic sau o asistentă într-un cabinet medical sau clinică. Când este utilizat pentru cancerul de prostată, o injecție de 3,75 mg de triptorelină (Trelstar) este de obicei administrată la fiecare 4 săptămâni, o injecție de 11,25 mg de triptorelină (Trelstar) se administrează de obicei la fiecare 12 săptămâni sau o injecție de 22,5 mg de triptorelină (Trelstar) se administrează de obicei la fiecare 24 de săptămâni. Când este utilizat la copiii cu pubertate precoce centrală, o injecție de 22,5 mg de triptorelină (Triptodur) se administrează de obicei la fiecare 24 de săptămâni.

Triptorelina poate determina o creștere a anumitor hormoni în primele câteva săptămâni după injecție. Medicul dumneavoastră vă va monitoriza cu atenție pentru orice simptome noi sau care se agravează în această perioadă.

### există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

### ce precauții speciale ar trebui să urmez?

#### Înainte de a primi injecție cu triptorelină,

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la triptorelină, goserelină (Zoladex), histrelină (Supprelin LA, Vantas), leuprolidă (Eligard, Lupron), nafarelină (Synarel), orice alte medicamente sau oricare dintre ingredientele injectării cu triptorelină. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: amiodarona (Nexterone, Pacerone); bupropion (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban); carbamazepină (Tegretol, Teril, altele); metildopa (în Aldoril); metoclopramidă (Reglan); reserpina sau inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), cum ar fi fluoxetina (Prozac, Sarafem), sertralina (Zoloft) și paroxetina (Paxil). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă dumneavoastră sau cineva din familia dumneavoastră ați avut vreodată sindrom QT lung (afecțiune care crește riscul de a dezvolta bătăi neregulate ale inimii care poate provoca leșin sau moarte subită). De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată diabet; cancer care s-a extins la coloana vertebrală (coloana vertebrală); obstrucție urinară (blocare care provoacă dificultăți la urinare), un nivel scăzut de potasiu, calciu sau magneziu în sânge, un atac de cord; insuficiența cardiacă; o boală psihică; o criză sau epilepsie; un accident vascular cerebral, mini-accident vascular cerebral sau alte probleme ale creierului; o tumoră pe creier; sau boli ale inimii, rinichilor sau ficatului.
- trebuie să știți că triptorelina nu trebuie utilizată la femeile însărcinate sau care pot rămâne gravide. Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă credeți că ați rămas gravidă în timp ce utilizați triptorelină, sunați imediat medicului dumneavoastră. Injectia cu triptorelină poate dăuna fătului.

## ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

## ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

**Injectia cu triptorelină poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispere:**

- durere de cap
- arsuri la stomac
- constipație
- bufeuri (un val brusc de căldură corporală ușoară sau intensă), transpirație sau umezeală
- scăderea capacității sau a dorinței sexuale
- modificări ale dispoziției, cum ar fi plâns, iritabilitate, nerăbdare, furie și agresivitate
- dureri de picioare sau articulații
- durere de sân
- depresie
- durere, mâncărime, umflare sau roșeață la locul unde a fost administrată injectia
- dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit
- tuse

**Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:**

- urticarie

- eczemă
- mâncărime
- dificultăți de respirație sau de înghițire
- umflarea feței, ochilor, gurii, gâtului, limbii sau buzelor
- răgușeală
- convulsii
- dureri în piept
- durere la nivelul brațelor, spatelui, gâtului sau maxilarului
- vorbire lentă sau dificilă
- amețeli sau leșin
- slăbiciune sau amorțeală a unui braț sau picior
- incapabil să miște picioarele
- dureri osoase
- urinare dureroasă sau dificilă
- sânge în urină
- Urinare frecventă
- sete extremă
- slăbiciune
- vedere încetățată
- gură uscată
- greață
- vărsături
- respirație care miroase fructat
- scăderea conștienței

La copiii cărora li se administrează triptorelină injectabilă (Triptodur) pentru pubertatea precoce centrală, în primele câteva săptămâni de tratament pot apărea simptome noi sau agravate ale dezvoltării sexuale. La fete, debutul menstruației sau spotting (sângerare vaginală ușoară) poate apărea în primele două luni ale acestui tratament. Dacă sângerarea continuă după a doua lună, sunați-vă medicul.

Injectia cu triptorelină poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce utilizați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) sau la telefon (1-800-332-1088).

## n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la adresa <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

## ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de laborator și va efectua anumite măsurători corporale pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu triptorelină. Glicemia și hemoglobina glicozilată (HbA1c) trebuie verificate în mod regulat.

Înainte de a efectua orice test de laborator, spuneți medicului dumneavoastră și personalului de laborator că vi se administrează injecție cu triptorelină.

Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre injecția cu triptorelină.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

## nume rand

- Trelstar®
- Triptodur®

Ultima revizuire - 15.01.2018

[Aflați cum să citați această pagină](#)



[Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii](#)

AHFS® Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

