



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Medicamentos, hierbas y suplementos](#) → Inyección de triptorelina

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611047.html>

Inyección de triptorelina

pronunciado como (trip'' toe rel' in)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La inyección de triptorelina (Trelstar) se usa para tratar los síntomas asociados con el cáncer de próstata avanzado. La inyección de triptorelina (Triptodur) se usa para tratar la pubertad precoz central (CPP, una afección que hace que los niños entren en la pubertad demasiado pronto, lo que resulta en un crecimiento óseo y desarrollo de características sexuales más rápido de lo normal) en niños de 2 años o más. La inyección de triptorelina pertenece a una clase de medicamentos llamados agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH). Funciona al disminuir la cantidad de ciertas hormonas en el cuerpo.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La inyección de triptorelina (Trelstar) viene como una suspensión de liberación prolongada (acción prolongada) para ser inyectada en el músculo de cualquiera de las nalgas por un médico o enfermera en un consultorio médico o clínica. La inyección de triptorelina (Trelstar) también viene como una suspensión de liberación prolongada para ser inyectada en el músculo de la nalga o el muslo por un médico o enfermera en un consultorio médico o clínica. Cuando se usa para el cáncer de próstata, generalmente se administra una inyección de 3,75 mg de triptorelina (Trelstar) cada 4 semanas, una inyección de 11,25 mg de triptorelina (Trelstar) generalmente se administra cada 12 semanas, o una inyección de 22,5 mg de triptorelina (Trelstar) generalmente se administra cada 24 semanas. Cuando se usa en niños con pubertad precoz central, generalmente se administra una inyección de 22,5 mg de triptorelina (Triptodur) cada 24 semanas.

La triptorelina puede provocar un aumento de ciertas hormonas en las primeras semanas después de la inyección. Su médico lo controlará atentamente para detectar cualquier síntoma nuevo o que empeore durante este tiempo.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de recibir la inyección de triptorelina,

- Informe a su médico y a su farmacéutico si es alérgico a la triptorelina, la goserelina (Zoladex), la histrelina (Supprelin LA, Vantas), la leuprolida (Eligard, Lupron), la nafarelina (Synarel), cualquier otro medicamento o cualquiera de los ingredientes de la inyección de triptorelina. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

- informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: amiodarona (Nexterone, Pacerone); bupropión (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban); carbamazepina (Tegretol, Teril, otros); metildopa (en Aldoril); metoclopramida (Reglan); reserpina o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) como fluoxetina (Prozac, Sarafem), sertralina (Zoloft) y paroxetina (Paxil). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.
- dígame a su médico si usted o alguien de su familia ha tenido alguna vez el síndrome de QT largo (afección que aumenta el riesgo de desarrollar latidos cardíacos irregulares que pueden causar desmayos o muerte súbita). También informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido diabetes; cáncer que se ha propagado a la columna vertebral (columna vertebral); obstrucción urinaria (obstrucción que causa dificultad para orinar), un nivel bajo de potasio, calcio o magnesio en la sangre, un ataque al corazón; insuficiencia cardíaca; una enfermedad mental; una convulsión o epilepsia; un derrame cerebral, un mini derrame cerebral u otros problemas cerebrales; un tumor cerebral; o enfermedad cardíaca, renal o hepática.
- Debe saber que la triptorelina no debe utilizarse en mujeres embarazadas o que puedan quedar embarazadas. Informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si cree que ha quedado embarazada mientras usa la inyección de triptorelina, llame a su médico de inmediato. La inyección de triptorelina puede dañar al feto.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La inyección de triptorelina puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

- dolor de cabeza
- acidez
- constipación
- sofocos (una oleada repentina de calor corporal leve o intenso), sudoración o sudoración
- disminución de la capacidad o el deseo sexual
- cambios de humor como llanto, irritabilidad, impaciencia, ira y agresión
- dolor en las piernas o articulaciones
- dolor en los senos
- depresión
- dolor, picazón, hinchazón o enrojecimiento en el lugar donde se aplicó la inyección
- dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido
- tos

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su médico de inmediato o busque tratamiento médico de emergencia:

- urticaria

- erupción
- Comezón
- dificultad para respirar o tragar
- hinchazón de la cara, los ojos, la boca, la garganta, la lengua o los labios
- ronquera
- convulsiones
- Dolor de pecho
- dolor en los brazos, la espalda, el cuello o la mandíbula
- habla lenta o difícil
- mareos o desmayos
- debilidad o entumecimiento de un brazo o una pierna
- no puede mover las piernas
- dolor de huesos
- micción dolorosa o difícil
- sangre en la orina
- micción frecuente
- sed extrema
- debilidad
- visión borrosa
- boca seca
- náuseas
- vómitos
- aliento que huele afrutado
- disminución de la conciencia

En los niños que reciben la inyección de triptorelina (Triptodur) para la pubertad precoz central, pueden presentarse síntomas nuevos o que empeoran del desarrollo sexual durante las primeras semanas de tratamiento. En las niñas, la aparición de la menstruación o manchado (sangrado vaginal leve) puede ocurrir durante los dos primeros meses de este tratamiento. Si el sangrado continúa más allá del segundo mes, llame a su médico.

La inyección de triptorelina puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras usa este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o por teléfono (1-800-332-1088).

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea en <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas de laboratorio y tomará ciertas medidas corporales para verificar la respuesta de su cuerpo a la inyección de triptorelina. Su nivel de azúcar en la sangre y la hemoglobina glicosilada (HbA1c) deben controlarse periódicamente.

Antes de realizarse alguna prueba de laboratorio, informe a su médico y al personal del laboratorio que está recibiendo la inyección de triptorelina.

Pregúntele a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre la inyección de triptorelina.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre (de venta libre) que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

- Trelstar®
- triptodur®

Última revisión - 15/01/2018

[Aprende a citar esta página](#)



[Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad](#)

SAIA® Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

