

عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611047.html>

حقن تريبتوريلين تنطقك (رحلة "in" toe rel)

لماذا يوصف هذا الدواء؟

يستخدم حقن تريبتوريلين (Trelstar) لعلاج الأعراض المصاحبة لسرطان البروستاتا المتقدم. يستخدم حقن تريبتوريلين (تريبتودور) لعلاج البلوغ المبكر المركزي (CPP) ؛ وهي حالة تتسبب في دخول الأطفال سن البلوغ في وقت مبكر جداً ، مما يؤدي إلى نمو العظام بشكل أسرع من الطبيعي وتطور الخصائص الجنسية) عند الأطفال بعمر سنتين فما فوق. يوجد حقن تريبتوريلين في فئة من الأدوية تسمى ناهضات الهرمون المطلق لموجهة الغدد التناسلية (GnRH). وهو يعمل عن طريق تقليل كمية بعض الهرمونات في الجسم.

كيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي حقن تريبتوريلين (Trelstar) كتعليق ممتد المفعول (طويل المفعول) ليتم حقنه في عضلة أي من الأرداف بواسطة طبيب أو ممرضة في مكتب طبي أو عيادة. يأتي حقن تريبتوريلين (Trelstar) أيضاً كتعليق ممتد المفعول يتم حقنه في عضلات الأرداف أو الفخذ بواسطة طبيب أو ممرضة في مكتب أو عيادة طبية. عند استخدامه لسرطان البروستاتا ، يتم إعطاء حقنة 3.75 مجم من تريبتوريلين (Trelstar) كل 4 أسابيع ، وعادة ما يتم إعطاء حقنة 11.25 مجم من تريبتوريلين (Trelstar) كل 12 أسبوعاً ، أو حقنة 22.5 مجم من تريبتوريلين (Trelstar) (عادة كل 24 أسبوعاً. عند استخدامه في الأطفال الذين يعانون من سن البلوغ المبكر المركزي ، عادة ما يتم إعطاء حقنة من 22.5 ملغ من تريبتوريلين (تريبتودور) كل 24 أسبوعاً.

قد يسبب تريبتوريلين زيادة في هرمونات معينة في الأسابيع القليلة الأولى بعد الحقن. سيراقبك طبيبك بعناية بحثاً عن أي أعراض جديدة أو تفاقم خلال هذا الوقت.

هناك استخدامات لهذا الدواء

يمكن وصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

قبة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبل تلقي حقن تريبتوريلين ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كنت تعاني من حساسية تجاه تريبتوريلين أو جوسريلين (زولاديكس) أو هيستريلين (سوبريلين) إل إيه ، فانتاس) أو ليوبروليد (إيجارد ، لوبرون) ، نافاريلين (سيناريل) ، أو أي أدوية أخرى ، أو أي من مكونات حقن تريبتوريلين. اسأل الصيدلي عن قائمة المكونات.

• أخبر طبيبك والصيدلي عن الأدوية الأخرى الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التي تتناولها أو تخطط لتناولها. تأكد من ذكر أي مما يلي: أميودارون (نيكسترون ، باسيرون) ؛ بوبروبيون (أبلينزين ، ويلبوترين ، زييان) ؛ كاربامازيبين (تيجريتول ، تيريل ، وغيرهما) ؛ ميثيل دوبا (في ألدوريل) ؛ ميتوكلوبراميد (ريجلان) ؛ ريزيربين ، أو مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) مثل فلوكستين (بروزاك ، سارافيم) ، سيرترالين (زولوفت) ، وباروكستين (باكسيل). قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية.

• أخبر طبيبك إذا كنت أنت أو أي شخص في عائلتك مصاباً بمتلازمة QT الطويلة (حالة تزيد من خطر الإصابة بنبض القلب غير المنتظم الذي قد يسبب الإغماء أو الموت المفاجئ). أخبر طبيبك أيضاً إذا كنت مصاباً بمرض السكري أو سبق أن أصبت به ؛ السرطان الذي انتشر في العنود الفقري (العمود الفقري) ، انسداد المسالك البولية (انسداد يسبب صعوبة في التبول) ، انخفاض مستوى البوتاسيوم أو الكالسيوم أو المغنيسيوم في الدم ، نوبة قلبية ؛ فشل القلب ؛ مرض عقلي نوبة أو صرع. سكتة دماغية أو سكتة دماغية صغيرة أو مشاكل دماغية أخرى ؛ ورم في المخ أو أمراض القلب أو الكلى أو الكبد.

• يجب أن تعلم أنه لا ينبغي استخدام تريبتوريلين في النساء الحوامل أو اللواتي يمكن أن يصبحن حوامل. أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو مرضعة. إذا كنت تعتقد أنك أصبحت حاملاً أثناء استخدام حقن تريبتوريلين ، فاتصل بطبيبك على الفور. يمكن أن يؤدي حقن تريبتوريلين الجنين.

قبة تعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

مالم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك ، استمر في نظامك الغذائي المعتاد.

الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قد يسبب حقن تريبتوريلين آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- صداع الراس
- حرقة من المعدة
- إمساك
- الهبات الساخنة (موجة مفاجئة من حرارة الجسم المعتدلة أو الشديدة) أو التعرق أو التعرق
- انخفاض القدرة الجنسية أو الرغبة
- تغيرات المزاج مثل البكاء والتهيج ونفاد الصبر والغضب والعدوانية
- آلام الساق أو المفاصل
- ألم الثدي
- كآبة
- ألم أو حكة أو تورم أو احمرار في مكان الحقن
- صعوبة في النوم أو البقاء نائماً
- سعال

بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، فاتصل بطبيبك على الفور أو احصل على علاج طبي طارئ:

- قشعريرة

- متسرع
- متلهف، متشوق
- صعوبة في التنفس أو البلع
- تورم في الوجه أو العينين أو الفم أو الحلق أو اللسان أو الشفتين
- بحّة في الصوت
- النوبات
- ألم صدر
- ألم في الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك
- كلام بطيء أو صعب
- الدوخة أو الإغماء
- ضعف أو تميل في الذراع أو الساق
- غير قادر على تحريك الساقين
- آلام العظام
- التبول المؤلم أو الصعب
- دم في البول
- كثرة التبول
- العطش الشديد
- ضعف
- عدم وضوح الرؤية
- فم جاف
- غثيان
- التقيؤ
- رائحة النفس التي تفوح منها رائحة الفواكه
- قلة الوعي

في الأطفال الذين يتلقون حقن تريبتوريلين (تريبتودور) لبلوغ مبكر مركزي ، قد تحدث أعراض جديدة أو متفاقمة للنمو الجنسي خلال الأسابيع القليلة الأولى من العلاج. عند الفتيات ، قد تحدث بداية الحيض أو التبقيع (نزيف مهبطي خفيف) خلال الشهرين الأولين من هذا العلاج. إذا استمر النزيف بعد الشهر الثاني ، فاتصل بطبيبك.

قد يسبب حقن تريبتوريلين آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء استخدام هذا الدواء.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرة عبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).

[http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

نحالة طارئة / جرعة زائدة

في حالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على [https://www.poisonhelp.org/help] [https://www.poisonhelp.org/help]. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

قبة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

احتفظ بجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر. سيطلب طبيبك بعض الفحوصات المخبرية ويأخذ قياسات معينة للجسم للتحقق من استجابة جسمك لحقن تريبتوريلين. يجب فحص نسبة السكر في الدم والهيموغلوبين الغليكوزيلاتي (HbA1c) بانتظام.

قبل إجراء أي اختبار معمل ، أخبر طبيبك وموظفي المختبر أنك تتلقى حقن تريبتوريلين.

اسأل الصيدلي عن أي أسئلة لديك حول حقن تريبتوريلين.

من المهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماء راند

- Trelstar®
- تريبتودور®

آخر مراجعة - 2018/01/15

[تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة](#)



إخلاء المسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

© AHFS معلومات الدواء المريض ™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي® كل الحقوق محفوظة. الإزدواجية. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. للاستخدام التجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبة الوطنية للطب 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهد الوطنية للصحة

آخر تحديث للصفحة: 25 مارس 2022

