



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[บ้าน](#) → [ยา สมุนไพรและอาหารเสริม](#) → การฉีด Triptorelin

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611047.html>

การฉีด Triptorelin

เด่นชัดว่าเป็น (การเดินทาง " toe rel' ใน)

hy เป็นยานี้กำหนด?

การฉีด Triptorelin (Trelstar) ใช้เพื่อรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นสูง การฉีด Triptorelin (Triptodur) ใช้รักษาภาวะก่อนวัยอันควรตอนกลาง (CPP) ซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้เด็กเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วเกินไป ส่งผลให้กระดูกเจริญเติบโตเร็วกว่าปกติและมีลักษณะทางเพศ) ในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป การฉีด Triptorelin อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า agonists gonadotropin-releasing hormone (GnRH) มันทำงานโดยการลดปริมาณของฮอร์โมนบางชนิดในร่างกาย

ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

การฉีด Triptorelin (Trelstar) เป็นการระงับแบบฉีดออก (ออกฤทธิ์นาน) เพื่อฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อของก้นโดยแพทย์หรือพยาบาลในสำนักงานแพทย์หรือคลินิก การฉีด Triptorelin (Trelstar) ยังมาพร้อมกับการระงับแบบขยายเพื่อฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อของก้นหรือต้นขาโดยแพทย์หรือพยาบาลในสำนักงานแพทย์หรือคลินิก เมื่อใช้สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก มักจะฉีด triptorelin (Trelstar) 3.75 มก. ทุก 4 สัปดาห์ การฉีด triptorelin (Trelstar) 11.25 มก. มักจะได้รับทุก 12 สัปดาห์ หรือ การฉีด triptorelin 22.5 มก. (Trelstar)) โดยปกติจะได้รับทุก 24 สัปดาห์ เมื่อใช้ในเด็กที่มีวัยแรกรุ่งกลางๆ มักฉีด triptorelin (Triptodur) 22.5 มก. ทุก 24 สัปดาห์

Triptorelin อาจทำให้ฮอร์โมนบางชนิดเพิ่มขึ้นในช่วงสองสามสัปดาห์แรกหลังการฉีด แพทย์ของคุณจะตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับอาการใหม่หรืออาการที่แย่ลงในช่วงเวลานี้

ใช้สำหรับยานี้

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้อย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ จันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีด triptorelin

- แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ triptorelin, goserelin (Zoladex), histrelin (Supprelin LA, Vantas), leuprolide (Eligard, Lupron), nafarelin (Synarel), ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีด triptorelin สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่หาซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: amidarone (Nexterone, Pacerone); บูโพรพิออน (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban); carbamazepine (Tegretol, Teril, อื่น ๆ); เมริลาโดปา (ในอัลโดริส); metoclopramide (Reglan); reserpine หรือ selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) เช่น fluoxetine (Prozac, Sarafem), sertraline (Zoloft) และ paroxetine (Paxil) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณเคยเป็นโรค QT มานาน (เงื่อนไขที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดการเต้นของหัวใจผิดปกติที่อาจทำให้เป็นลมหรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน) แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน มะเร็งที่แพร่กระจายไปยังกระดูกสันหลัง (กระดูกสันหลัง); การอุดตันทางเดินปัสสาวะ (การอุดตันที่ทำให้ปัสสาวะลำบาก) โฟแทสเซียมแคลเซียมหรือแมกนีเซียมในเลือดในระดับต่ำอาการหัวใจวาย หัวใจล้มเหลว; ความเจ็บป่วยทางจิต อาการชักหรือโรคลมชัก; โรคหลอดเลือดสมอง มีนิสโตรก หรือปัญหาสมองอื่นๆ เนื่องจากในสมอง หรือโรคหัวใจ ไต หรือตับ
- คุณควรรู้ว่าไม่ควรใช้ triptorelin ในสตรีที่ตั้งครรภ์หรือสามารถตั้งครรภ์ได้ แจ้งแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร หากคุณคิดว่าคุณตั้งครรภ์ขณะใช้การฉีดทริปโทเรลิน ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที การฉีด Triptorelin อาจเป็นอันตรายต่อการรกในครรภ์

ฉันควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม่?

ให้ทานอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

การฉีด Triptorelin อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- ปวดหัว
- อิจฉาริษยา
- ท้องผูก
- ร้อนวูบวาบ (คลื่นความร้อนในร่างกายเล็กน้อยหรือรุนแรง) เหงื่อออกหรือชื้น
- ความสามารถหรือความต้องการทางเพศลดลง
- อาการเปลี่ยนแปลง เช่น ร้องไห้ หงุดหงิด ใจร้อน โกรธ ก้าวร้าว
- ปวดขาหรือข้อ
- เจ็บหน้าอก
- ภาวะซึมเศร้า
- ปวด คัน บวม หรือแดงบริเวณที่ฉีดยา
- นอนหลับยากหรือหลับยาก
- ไอ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษายาบาลฉุกเฉิน:

- ลมพิษ

- ไข้
- อาการคัน
- หายใจลำบากหรือกลืนลำบาก
- บวมที่ใบหน้า ตา ปาก คอ ลิ้น หรือริมฝีปาก
- เสียงแหบ
- อาการชัก
- อาการเจ็บหน้าอก
- ปวดแขน หลัง คอ หรือขากรรไกร
- พูดซ้ำหรือพูดยาก
- อาการเวียนศีรษะหรือเป็นลม
- ความอ่อนแรงหรือชาที่แขนหรือขา
- ขยับขาไม่ได้
- ปวดกระดูก
- ปัสสาวะเจ็บปวดหรือปัสสาวะลำบาก
- เลือดในปัสสาวะ
- ปัสสาวะบ่อย
- กระหายน้ำมาก
- ความอ่อนแอ
- มองเห็นภาพซ้อน
- ปากแห้ง
- คลื่นไส้
- อาเจียน
- ลมหายใจที่มีกลิ่นผลไม้
- สติลดลง

ในเด็กที่ได้รับการฉีด triptorelin (Triptodur) สำหรับวัยแรกรุ่งในวัยแรกรุ่ง อาการใหม่หรือแย่งของการพัฒนาทางเพศ อาจเกิดขึ้นในช่วงสองสามสัปดาห์แรกของการรักษา ในเด็กผู้หญิง การเริ่มมีประจำเดือนหรือเป็นจุด (เลือดออกทางช่องคลอดเล็กน้อย) อาจเกิดขึ้นในช่วงสองเดือนแรกของการรักษา นี้ หากเลือดออกต่อเนื่องเกินเดือนที่สอง ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ

การฉีด Triptorelin อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหากผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยา นี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

ก กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่ <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินทันทีที่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการและทำการวัดร่างกายบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดทริปโตเรลิน ควรตรวจน้ำตาลในเลือดและฮีโมโกลบินในเลือด (HbA1c) เป็นประจำ

ก่อนทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการว่าคุณได้รับการฉีดทริปโตเรลิน

ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการฉีดทริปโตเรลิน

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) ทั้งหมดที่คุณกำลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่คุณไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

ชื่อแบรนด์

- Trelstar®
- ทริปโตดอร์®

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2018

[เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ขอจำกัดความรับผิดชอบ](#)

AHFS® ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ © ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเธสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ

สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022

