

[Ev](#) → [İlaçlar, Otlar ve Takviyeler](#) → Triptorelin Enjeksiyonu

Source : U.S. National Library of Medicine

Bu sayfanın URL'si: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611047.html>

Triptorelin Enjeksiyonu

olarak telaffuz edilir (trip" toe rel' in)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Triptorelin enjeksiyonu (Trelstar), ilerlemiş prostat kanseri ile ilişkili semptomları tedavi etmek için kullanılır. Triptorelin enjeksiyonu (Triptodur), 2 yaş ve üzeri çocuklarda merkezi erken ergenliği (CPP; çocukların ergenliğe çok erken girmesine neden olan ve normalden daha hızlı kemik büyümesi ve cinsel özelliklerin gelişmesine neden olan bir durum) tedavi etmek için kullanılır. Triptorelin enjeksiyonu, gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) agonistleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücuttaki belirli hormonların miktarını azaltarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Triptorelin enjeksiyonu (Trelstar), bir tıbbi ofis veya klinikte bir doktor veya hemşire tarafından her iki kalça kasına enjekte edilecek uzun süreli (uzun etkili) bir süspansiyon olarak gelir. Triptorelin enjeksiyonu (Trelstar), bir tıbbi ofis veya klinikte bir doktor veya hemşire tarafından kalça veya uyluk kasına enjekte edilecek uzatılmış salımlı bir süspansiyon olarak da gelir. Prostat kanseri için kullanıldığında, genellikle 4 haftada bir 3.75 mg triptorelin (Trelstar) enjeksiyonu yapılır, genellikle 12 haftada bir 11.25 mg triptorelin (Trelstar) enjeksiyonu veya 22.5 mg triptorelin enjeksiyonu (Trelstar) verilir.) genellikle her 24 haftada bir verilir. Merkezi erken ergenliğe sahip çocuklarda kullanıldığında, genellikle her 24 haftada bir 22.5 mg triptorelin (Triptodur) enjeksiyonu yapılır.

Triptorelin, enjeksiyondan sonraki ilk birkaç hafta içinde bazı hormonlarda artışa neden olabilir. Doktorunuz bu süre zarfında herhangi bir yeni veya kötüleşen semptom için sizi dikkatle izleyecektir.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Triptorelin enjeksiyonu almadan önce,

- triptorelin, goserelin (Zoladex), histrelin (Supprelin LA, Vantas), leuprolide (Eligard, Lupron), nafarelin (Synarel), diğer ilaçlar veya triptorelin enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

- aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: amiodaron (Nexterone, Pacerone); bupropion (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban); karbamazepin (Tegretol, Teril, diğerleri); metildopa (Aldoril'de); metoklopramid (Reglan); reserpin veya fluoksetin (Prozac, Sarafem), sertralin (Zoloft) ve paroksetin (Paxil) gibi seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.
- Sizde veya ailenizden herhangi birinde uzun QT sendromu (bayılma veya ani ölüme neden olabilen düzensiz kalp atışı geliştirme riskini artıran durum) olup olmadığını doktorunuza söyleyin. Ayrıca şeker hastalığınız olup olmadığını da doktorunuza söyleyiniz; omurgaya (omurga) yayılmış kanser; üriner obstrüksiyon (idrar yapma zorluğuna neden olan tıkanıklık), kanınızdaki düşük potasyum, kalsiyum veya magnezyum seviyesi, kalp krizi; kalp yetmezliği; akıl hastalığı; nöbet veya epilepsi; felç, mini felç veya diğer beyin sorunları; bir beyin tümörü; veya kalp, böbrek veya karaciğer hastalığı.
- Triptorelin hamile veya hamile kalabilecek kadınlarda kullanılmamalıdır. Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Triptorelin enjeksiyonu kullanırken hamile kaldığınızı düşünüyorsanız hemen doktorunuzu arayınız. Triptorelin enjeksiyonu fetüse zarar verebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Triptorelin enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

- baş ağrısı
- göğüste ağrılı yanma hissi
- kabızlık
- sıcak basması (ani hafif veya yoğun vücut ısısı dalgası), terleme veya rutubet
- azalmış cinsel yetenek veya arzu
- ağlama, sinirlilik, sabırsızlık, öfke ve saldırganlık gibi ruh hali değişiklikleri
- bacak veya eklem ağrısı
- Meme ağrısı
- depresyon
- enjeksiyonun yapıldığı yerde ağrı, kaşıntı, şişme veya kızarıklık
- uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu
- öksürük

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

- kurdeşen

- döküntü
- kaşıntı
- nefes alma veya yutma zorluğu
- yüz, gözler, ağız, boğaz, dil veya dudakların şişmesi
- ses kısıklığı
- nöbetler
- göğüs ağrısı
- kollarda, sırtta, boyunda veya çenede ağrı
- yavaş veya zor konuşma
- baş dönmesi veya bayılma
- bir kol veya bacağın zayıflığı veya uyuşması
- bacaklarını hareket ettiremez
- kemik ağrısı
- ağrılı veya zor idrara çıkma
- idrarda kan
- sık idrara çıkma
- aşırı susuzluk
- zayıflık
- bulanık görme
- kuru ağız
- mide bulantısı
- kusma
- meyveli kokan nefes
- azalmış bilinç

Merkezi erken ergenlik için triptorelin enjeksiyonu (Triptodur) alan çocuklarda, tedavinin ilk birkaç haftasında yeni veya kötüleşen cinsel gelişim belirtileri ortaya çıkabilir. Kızlarda bu tedavinin ilk iki ayında adet görme veya lekelenme (hafif vajinal kanama) meydana gelebilir. Kanama ikinci aydan sonra da devam ederse doktorunuzu arayın.

Triptorelin enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorunuz varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) veya telefonla (1-800-332-1088).

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur:<https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Mağdur bayılmışsa, nöbet geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun triptorelin enjeksiyonuna tepkisini kontrol etmek için belirli laboratuvar testleri isteyecek ve belirli vücut ölçümlerini alacaktır. Kan şekerinizi ve glikozile hemoglobin (HbA1c) düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Herhangi bir laboratuvar testi yaptırmadan önce doktorunuza ve laboratuvar personeline triptorelin enjeksiyonu yaptığınızı söyleyiniz.

Triptorelin enjeksiyonu ile ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

rand isimleri

- Trelstar®
- triptodur®

Son Revize - 01/15/2018

[Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin](#)



[Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi](#)

AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmelidir.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022

