



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Nhà](#) → [Thuốc, thảo mộc và chất bổ sung](#) → Tiêm Triptorelin

Source : U.S. National Library of Medicine

URL của trang này: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611047.html>

Triptorelin Tiêm

phát âm là (trip " toe rel 'in)

hy là thuốc này được kê đơn?

Thuốc tiêm Triptorelin (Trelstar) được sử dụng để điều trị các triệu chứng liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối. Tiêm Triptorelin (Triptodur) được sử dụng để điều trị dậy thì sớm trung ương (CPP; một tình trạng khiến trẻ em bước vào tuổi dậy thì quá sớm, dẫn đến sự phát triển xương và phát triển các đặc điểm giới tính nhanh hơn bình thường) ở trẻ em từ 2 tuổi trở lên. Tiêm triptorelin nằm trong nhóm thuốc được gọi là chất chủ vận hormone giải phóng gonadotropin (GnRH). Nó hoạt động bằng cách giảm lượng hormone nhất định trong cơ thể.

có nên sử dụng thuốc này không?

Tiêm triptorelin (Trelstar) có dạng hỗn dịch giải phóng kéo dài (tác dụng kéo dài) để được bác sĩ hoặc y tá tại phòng khám hoặc phòng khám tiêm vào cơ ở mông. Tiêm triptorelin (Trelstar) cũng có dạng hỗn dịch giải phóng kéo dài để được bác sĩ hoặc y tá tại phòng khám hoặc phòng khám tiêm vào cơ mông hoặc đùi. Khi được sử dụng cho bệnh ung thư tuyến tiền liệt, thường tiêm 3,75 mg triptorelin (Trelstar) 4 tuần một lần, tiêm 11,25 mg triptorelin (Trelstar) thường được tiêm 12 tuần một lần hoặc tiêm 22,5 mg triptorelin (Trelstar) thường được đưa ra 24 tuần một lần. Khi dùng cho trẻ dậy thì sớm trung ương, thường tiêm 22,5 mg triptorelin (Triptodur) sau mỗi 24 tuần.

Triptorelin có thể gây ra sự gia tăng một số hormone trong vài tuần đầu sau khi tiêm. Bác sĩ sẽ theo dõi bạn cẩn thận xem có bất kỳ triệu chứng mới hoặc xấu đi nào trong thời gian này hay không.

nhật sử dụng cho thuốc này

Thuốc này có thể được kê đơn cho các mục đích sử dụng khác; Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để biết thêm thông tin.

tôi nên làm theo các biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?

Trước khi tiêm triptorelin,

- Hãy cho bác sĩ và dược sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với triptorelin, goserelin (Zoladex), histrelin (Supprelin LA, Vantas), leuprolide (Eligard, Lupron), nafarelin (Synarel), bất kỳ loại thuốc nào khác hoặc bất kỳ thành phần nào trong thuốc tiêm triptorelin. Hỏi dược sĩ của bạn để biết danh sách các thành phần.

- cho bác sĩ và dược sĩ của bạn biết những loại thuốc kê đơn và không kê đơn, vitamin, chất bổ sung dinh dưỡng và các sản phẩm thảo dược mà bạn đang dùng hoặc dự định dùng. Hãy chắc chắn đề cập đến bất kỳ điều nào sau đây: amiodarone (Nexterone, Pacerone); bupropion (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban); carbamazepine (Tegretol, Teril, những loại khác); methyldopa (trong Aldoril); metoclopramide (Reglan); Reserpin, hoặc các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI) như fluoxetine (Prozac, Sarafem), sertraline (Zoloft) và paroxetine (Paxil). Bác sĩ có thể cần thay đổi liều lượng thuốc của bạn hoặc theo dõi bạn cẩn thận về các tác dụng phụ.
- Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn hoặc bất kỳ ai trong gia đình bạn đã từng mắc hội chứng QT dài (tình trạng làm tăng nguy cơ phát triển nhịp tim không đều có thể gây ngất xỉu hoặc đột tử). Cũng cho bác sĩ biết nếu bạn bị hoặc đã từng mắc bệnh tiểu đường; ung thư di căn đến cột sống (xương sống) ; tắc nghẽn đường tiết niệu (tắc nghẽn gây khó đi tiểu), mức độ thấp của kali, canxi hoặc magiê trong máu của bạn, một cơn đau tim; suy tim; một bệnh tâm thần; co giật hoặc động kinh; đột quỵ, đột quỵ nhỏ, hoặc các vấn đề về não khác; một khối u não; hoặc bệnh tim, thận, hoặc gan.
- bạn nên biết rằng triptorelin không được sử dụng cho phụ nữ đang mang thai hoặc những người có thể mang thai. Cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã mang thai khi sử dụng thuốc tiêm triptorelin, hãy gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức. Tiêm triptorelin có thể gây hại cho thai nhi.

hạt hướng dẫn chế độ ăn uống đặc biệt tôi nên làm theo?

Trừ khi bác sĩ cho bạn biết cách khác, hãy tiếp tục chế độ ăn uống bình thường của bạn.

hạt tác dụng phụ thuốc này có thể gây ra?

Tiêm triptorelin có thể gây ra tác dụng phụ. Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bất kỳ triệu chứng nào nghiêm trọng hoặc không biến mất:

- đau đầu
- ợ nóng
- táo bón
- bốc hỏa (một đợt nhiệt độ cơ thể nhẹ hoặc dữ dội đột ngột), đổ mồ hôi hoặc nổi váng
- giảm khả năng hoặc ham muốn tình dục
- thay đổi tâm trạng như khóc, cáu kỉnh, thiếu kiên nhẫn, tức giận và hung hăng
- đau chân hoặc khớp
- đau vú
- Phiền muộn
- đau, ngứa, sưng hoặc đỏ ở nơi tiêm
- khó đi vào giấc ngủ hoặc không ngủ được
- ho

Một số tác dụng phụ có thể nghiêm trọng. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này, hãy gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức hoặc được điều trị y tế khẩn cấp:

- tổ ong

- phát ban
- ngứa
- khó thở hoặc nuốt
- sưng mặt, mắt, miệng, họng, lưỡi hoặc môi
- khàn tiếng
- co giật
- đau ngực
- đau ở cánh tay, lưng, cổ hoặc hàm
- nói chậm hoặc khó
- chóng mặt hoặc ngất xỉu
- yếu hoặc tê tay hoặc chân
- không thể di chuyển chân
- đau xương
- đi tiểu đau hoặc khó khăn
- máu trong nước tiểu
- đi tiểu thường xuyên
- cực kỳ khát
- yếu đuối
- mờ mắt
- khô miệng
- buồn nôn
- nôn mửa
- hơi thở có mùi trái cây
- giảm ý thức

Ở trẻ em được tiêm triptorelin (Triptodur) để dậy thì sớm trung ương, các triệu chứng phát triển giới tính mới hoặc xấu đi có thể xảy ra trong vài tuần đầu điều trị. Ở trẻ em gái, sự bắt đầu hành kinh hoặc ra máu (chảy máu âm đạo nhẹ) có thể xảy ra trong hai tháng đầu tiên của điều trị này. Nếu tiếp tục ra máu sau tháng thứ hai, hãy gọi cho bác sĩ của bạn.

Tiêm triptorelin có thể gây ra các tác dụng phụ khác. Gọi cho bác sĩ nếu bạn có bất kỳ vấn đề bất thường nào khi sử dụng thuốc này.

Nếu bạn gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, bạn hoặc bác sĩ của bạn có thể gửi báo cáo đến chương trình Báo cáo sự kiện có hại MedWatch của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) trực tuyến

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) hoặc qua điện thoại (1-800-332-1088).

n trường hợp khẩn cấp / quá liều

Trong trường hợp quá liều, hãy gọi cho đường dây trợ giúp kiểm soát chất độc theo số 1-800-222-1222. Thông tin cũng có sẵn trực tuyến tại <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Nếu nạn nhân gục xuống, co giật, khó thở hoặc không thể tỉnh lại, hãy gọi ngay dịch vụ cấp cứu theo số 911.

hat thông tin khác tôi nên biết?

Giữ tất cả các cuộc hẹn với bác sĩ của bạn và các phòng thí nghiệm. Bác sĩ sẽ yêu cầu một số xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và thực hiện các phép đo cơ thể nhất định để kiểm tra phản ứng của cơ thể bạn với việc tiêm triptorelin. Lượng đường trong máu và hemoglobin glycosyl hóa (HbA1c) của bạn nên được kiểm tra thường xuyên.

Trước khi thực hiện bất kỳ xét nghiệm nào trong phòng thí nghiệm, hãy nói với bác sĩ và nhân viên phòng thí nghiệm rằng bạn đang được tiêm triptorelin.

Hỏi dược sĩ của bạn bất kỳ câu hỏi nào bạn có về tiêm triptorelin.

Điều quan trọng là bạn phải giữ một danh sách bằng văn bản về tất cả các loại thuốc theo toa và không kê đơn (bán qua quầy) bạn đang dùng, cũng như bất kỳ sản phẩm nào như vitamin, khoáng chất hoặc các chất bổ sung chế độ ăn uống khác. Bạn nên mang theo danh sách này mỗi khi đến gặp bác sĩ hoặc khi nhập viện. Đây cũng là thông tin quan trọng cần mang theo trong trường hợp khẩn cấp.

tên rand

- Trelstar®
- Triptodur®

Sửa đổi lần cuối - 15/01/2018

[Tìm hiểu cách trích dẫn trang này](#)



[Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ, Inc. Tuyên bố từ chối trách nhiệm](#)

AHFS® Thông tin Thuốc dành cho Bệnh nhân™. © Bản quyền, 2022. Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ®, Đại lộ Đông Tây 4500, Suite 900, Bethesda, Maryland. Đã đăng ký Bản quyền. Sự trùng lặp để sử dụng cho mục đích thương mại phải được ASHP cho phép.

Thư viện Y khoa Quốc gia 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ

Viện Y tế Quốc gia

Trang được cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 3 năm 2022

