



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [药物、草药和补充剂](#) → 曲普瑞林注射液

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611047.html>

曲普瑞林注射液

读作 (trip' toe rel' in)

为什么要开这种药?

曲普瑞林注射液 (Trelstar) 用于治疗与晚期前列腺癌相关的症状。曲普瑞林注射液 (Triptodur) 用于治疗 2 岁及以上儿童的中枢性性早熟 (CPP; 一种导致儿童过早进入青春期, 导致骨骼生长和性特征发育速度超过正常的疾病)。曲普瑞林注射液属于一类称为促性腺激素释放激素 (GnRH) 激动剂的药物。它通过减少体内某些激素的数量起作用。

这个药应该怎么用?

曲普瑞林注射液 (Trelstar) 是一种缓释 (长效) 混悬剂, 由医疗办公室或诊所的医生或护士注射到臀部肌肉中。曲普瑞林注射液 (Trelstar) 也是一种缓释混悬液, 由医疗办公室或诊所的医生或护士注射到臀部或大腿的肌肉中。用于前列腺癌时, 通常每 4 周注射 3.75 mg 曲普瑞林 (Trelstar), 通常每 12 周注射 11.25 mg 曲普瑞林 (Trelstar), 或注射 22.5 mg 曲普瑞林 (Trelstar)) 通常每 24 周给予一次。当用于中枢性性早熟的儿童时, 通常每 24 周注射 22.5 毫克曲普瑞林 (Triptodur)。

曲普瑞林可能会在注射后的最初几周内导致某些激素的增加。在此期间, 您的医生会仔细监测您是否有任何新的或恶化的症状。

该药的其他用途

这种药物可用于其他用途; 向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施?

在接受曲普瑞林注射之前,

- 如果您对曲普瑞林、戈舍瑞林 (Zoladex)、histrelin (Supprelin LA, Vantas)、亮丙瑞林 (Eligard, Lupron)、那法瑞林 (Synarel)、任何其他药物或曲普瑞林注射液中的任何成分过敏, 请告诉您的医生和药剂师。向您的药剂师索取成分清单。

- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用的其他处方药和非处方药、维生素、营养补充剂和草药产品。请务必提及以下任何一项：胺碘酮（Nexterone, Pacerone）；安非他酮（Aplenzin、Wellbutrin、Zyban）；卡马西平（Tegretol、Teril 等）；甲基多巴（在 Aldoril 中）；甲氧氯普胺（Reglan）；利血平或选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRIs），例如氟西汀（Prozac, Sarafem），舍曲林（Zoloft）和帕罗西汀（Paxil）。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。
- 告诉您的医生您或您的家人是否曾患有长 QT 综合征（这种情况会增加发生心律不齐的风险，可能导致昏厥或猝死）。如果您患有或曾经患有糖尿病，请告诉您的医生；已经扩散到脊柱（骨干）的癌症；尿路梗阻（导致排尿困难的阻塞），血液中钾、钙或镁含量低，心脏病发作；心脏衰竭；精神疾病；癫痫发作或癫痫；中风、小中风或其他脑部问题；脑瘤；或心脏、肾脏或肝脏疾病。
- 您应该知道曲普瑞林不适用于怀孕或可能怀孕的女性。如果您怀孕、计划怀孕或正在哺乳，请告诉您的医生。如果您认为自己在使用曲普瑞林注射液时怀孕了，请立即致电您的医生。曲普瑞林注射液会伤害胎儿。

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

除非您的医生另有说明，否则请继续您的正常饮食。

这种药物会引起副作用吗？

曲普瑞林注射液可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 头痛
- 胃灼热
- 便秘
- 潮热（突然一阵轻微或强烈的体温）、出汗或湿冷
- 性能力或性欲下降
- 情绪变化，例如哭泣、烦躁、急躁、愤怒和攻击性
- 腿或关节疼痛
- 乳房疼痛
- 沮丧
- 注射部位疼痛、瘙痒、肿胀或发红
- 难以入睡或保持睡眠
- 咳嗽

一些副作用可能很严重。如果您出现以下任何症状，请立即致电您的医生或接受紧急医疗：

- 麻疹

- 皮疹
- 瘙痒
- 呼吸或吞咽困难
- 面部、眼睛、嘴巴、喉咙、舌头或嘴唇肿胀
- 嘶哑
- 癫痫发作
- 胸痛
- 手臂、背部、颈部或下巴疼痛
- 缓慢或困难的讲话
- 头晕或昏厥
- 手臂或腿无力或麻木
- 不能移动腿
- 骨痛
- 排尿疼痛或困难
- 尿液中有血
- 尿频
- 极度口渴
- 弱点
- 模糊的视野
- 口干
- 恶心
- 呕吐
- 闻起来有果味的气息
- 意识下降

在接受曲普瑞林注射 (Triptodur) 治疗中枢性早熟儿童中，在治疗的最初几周内可能会出现新的或恶化的性发育症状。在女孩中，在这种治疗的前两个月内可能会出现月经或点滴出血（少量阴道流血）。如果出血持续超过第二个月，请致电您的医生。

曲普瑞林注射液可能会引起其他副作用。如果您在使用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

n 紧急情况/过量

如果服用过量, 请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来, 请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

我应该知道其他信息吗?

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生会下令进行某些实验室测试并进行某些身体测量, 以检查您的身体对曲普瑞林注射的反应。应定期检查您的血糖和糖化血红蛋白 (HbA1c)。

在进行任何实验室检查之前, 请告诉您的医生和实验室人员您正在接受曲普瑞林注射液。

如果您对曲普瑞林注射液有任何疑问, 请咨询您的药剂师。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药 (非处方药) 以及任何产品 (如维生素、矿物质或其他膳食补充剂) 的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时, 您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 星辰®
- 雷公藤®

最后修订 - 2018 年 1 月 15 日

[了解如何引用此页面](#)



[美国卫生系统药剂师协会免责声明](#)

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有, 2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

