



Express Medicine Shipments, Globally!  
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Bahay](#) → [Mga Gamot, Herb at Supplement](#) → Triptorelin Injection

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ng page na ito: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611047.html>

## Triptorelin Injection

binibigkas bilang (trip " toe rel' in)

### Why ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Triptorelin injection (Trelstar) ay ginagamit upang gamutin ang mga sintomas na nauugnay sa advanced na kanser sa prostate. Ang Triptorelin injection (Triptodur) ay ginagamit upang gamutin ang central precocious puberty (CPP; isang kondisyon na nagiging sanhi ng pagbibinata ng mga bata nang masyadong maaga, na nagreresulta sa mas mabilis kaysa sa normal na paglaki ng buto at pagbuo ng mga sekswal na katangian) sa mga batang 2 taon at mas matanda. Ang Triptorelin injection ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonists. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng dami ng ilang hormone sa katawan.

### paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Triptorelin injection (Trelstar) ay dumarating bilang isang extended-release (long-acting) na suspensyon na iturok sa kalamnan ng alinman sa puwit ng isang doktor o nars sa isang medikal na opisina o klinika. Ang Triptorelin injection (Trelstar) ay dumarating din bilang isang extended-release na suspensyon na iturok sa kalamnan ng buttock o hita ng isang doktor o nars sa isang medikal na opisina o klinika. Kapag ginamit para sa kanser sa prostate, ang isang iniksyon na 3.75 mg ng triptorelin (Trelstar) ay karaniwang ibinibigay tuwing 4 na linggo, ang isang iniksyon ng 11.25 mg ng triptorelin (Trelstar) ay karaniwang ibinibigay tuwing 12 linggo, o isang iniksyon ng 22.5 mg ng triptorelin (Trelstar) ay karaniwang ibinibigay tuwing 24 na linggo. Kapag ginamit sa mga batang may gitnang maagang pagbibinata, ang isang iniksyon na 22.5 mg ng triptorelin (Triptodur) ay karaniwang ibinibigay tuwing 24 na linggo.

Ang Triptorelin ay maaaring magdulot ng pagtaas sa ilang partikular na hormones sa unang ilang linggo pagkatapos ng iniksyon. Susubaybayan ka ng iyong doktor nang mabuti para sa anumang bago o lumalalang sintomas sa panahong ito.

### may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

### hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

#### Bago tumanggap ng triptorelin injection,

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa triptorelin, goserelin (Zoladex), histrelin (Supprelin LA, Vantas), leuprolide (Eligard, Lupron), nafarelin (Synarel), anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa triptorelin injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: amiodarone (Nexterone, Pacerone); bupropion (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban); carbamazepine (Tegretol, Teril, iba pa); methyldopa (sa Aldoril); metoclopramide (Reglan); reserpine, o mga selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) tulad ng fluoxetine (Prozac, Sarafem), sertraline (Zoloft), at paroxetine (Paxil). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.
- sabihin sa iyong doktor kung ikaw o sinuman sa iyong pamilya ay nagkaroon ng matagal na QT syndrome (kondisyon na nagpapataas ng panganib na magkaroon ng hindi regular na tibok ng puso na maaaring magdulot ng pagkahimatay o biglaang pagkamatay). Sabihin din sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng diabetes; kanser na kumalat sa gulugod (backbone); pagbara sa ihi (pagbara na nagdulot ng kahirapan sa pag-ih), mababang antas ng potasa, calcium, o magnesium sa iyong dugo, atake sa puso; heart failure; isang sakit sa isip; isang seizure o epilepsy; isang stroke, mini-stroke, o iba pang mga problema sa utak; isang tumor sa utak; o sakit sa puso, bato, o atay.
- dapat mong malaman na ang triptorelin ay hindi dapat gamitin sa mga babaeng buntis o maaaring mabuntis. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung sa tingin mo ay nabuntis ka habang gumagamit ng triptorelin injection, tawagan kaagad ang iyong doktor. Ang Triptorelin injection ay maaaring makapinsala sa fetus.

### **sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?**

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

### **mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?**

**Maaaring magdulot ng mga side effect ang Triptorelin injection. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:**

- sakit ng ulo
- heartburn
- pagtitibi
- hot flashes (isang biglaang alon ng banayad o matinding init ng katawan), pagpapawis, o clamminess
- nabawasan ang kakayahang makipagtalik o pagnanais
- pagbabago ng mood tulad ng pag-iyak, pagkamayamutin, pagkainip, galit, at pagsalakay
- pananakit ng binti o kasukasuan
- sakit sa dibdib
- depresyon
- pananakit, pangangati, pamamaga, o pamumula sa lugar kung saan iniksyon
- nahihirapang makatulog o manatiling tulog
- ubo

**Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emergency na medikal na paggamot:**

- mga pantal

- pantal
- nangangati
- kahirapan sa paghinga o paglunok
- pamamaga ng mukha, mata, bibig, lalamunan, dila, o labi
- pamamalat
- mga seizure
- pananakit ng dibdib
- pananakit sa mga braso, likod, leeg, o panga
- mabagal o mahirap na pananalita
- pagkahilo o nanghihina
- kahinaan o pamamanhid ng braso o binti
- hindi maigalaw ang mga paa
- sakit ng buto
- masakit o mahirap na pag-ihi
- dugo sa ihi
- madalas na pag-ihi
- matinding pagkauhaw
- kahinaan
- malabong paningin
- tuyong bibig
- pagduduwal
- pagsusuka
- hininga na amoy prutas
- nabawasan ang kamalayan

Sa mga bata na tumatanggap ng triptorelin injection (Triptodur) para sa gitnang maagang pagbibinata, ang mga bago o lumalalang sintomas ng sekswal na pag-unlad ay maaaring mangyari sa mga unang ilang linggo ng paggamot. Sa mga batang babae, ang simula ng regla o spotting (light vaginal bleeding) ay maaaring mangyari sa unang dalawang buwan ng paggamot na ito. Kung magpapatuloy ang pagdurugo lampas sa ikalawang buwan, tawagan ang iyong doktor.

Ang Triptorelin injection ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang ginagamit ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 1088).

## n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emerhensiya sa 911.

### Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab at magsasagawa ng ilang mga sukat ng katawan upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa triptorelin injection. Ang iyong asukal sa dugo at glycosylated hemoglobin (HbA1c) ay dapat na regular na suriin.

Bago magkaroon ng anumang pagsubok sa laboratoryo, sabihin sa iyong doktor at sa mga tauhan ng laboratoryo na ikaw ay tumatanggap ng triptorelin injection.

Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa triptorelin injection.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

#### mga pangalan ng rand

- Trelstar®
- Triptodur®

Huling Binago - 01/15/2018

[Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito](#)



### [American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS® Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022

