

[Domicile](#) → [Médicaments, herbes et suppléments](#) → Injection de triptoréline

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611047.html>

Injection de triptoréline

prononcé comme (trip'' toe rel' in)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection de triptoréline (Trelstar) est utilisée pour traiter les symptômes associés au cancer avancé de la prostate. L'injection de triptoréline (Triptodur) est utilisée pour traiter la puberté précoce centrale (PPC; une condition qui fait que les enfants entrent trop tôt dans la puberté, entraînant une croissance osseuse et un développement des caractéristiques sexuelles plus rapides que la normale) chez les enfants de 2 ans et plus. L'injection de triptoréline appartient à une classe de médicaments appelés agonistes de l'hormone de libération des gonadotrophines (GnRH). Il agit en diminuant la quantité de certaines hormones dans le corps.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'injection de triptoréline (Trelstar) se présente sous la forme d'une suspension à libération prolongée (à action prolongée) à injecter dans le muscle de l'une ou l'autre des fesses par un médecin ou une infirmière dans un cabinet médical ou une clinique. L'injection de triptoréline (Trelstar) se présente également sous la forme d'une suspension à libération prolongée à injecter dans le muscle de la fesse ou de la cuisse par un médecin ou une infirmière dans un cabinet médical ou une clinique. Lorsqu'il est utilisé pour le cancer de la prostate, une injection de 3,75 mg de triptoréline (Trelstar) est généralement administrée toutes les 4 semaines, une injection de 11,25 mg de triptoréline (Trelstar) est généralement administrée toutes les 12 semaines, ou une injection de 22,5 mg de triptoréline (Trelstar) est généralement administrée toutes les 24 semaines. Lorsqu'il est utilisé chez les enfants atteints de puberté précoce centrale, une injection de 22,5 mg de triptoréline (Triptodur) est généralement administrée toutes les 24 semaines.

La triptoréline peut provoquer une augmentation de certaines hormones dans les premières semaines suivant l'injection. Votre médecin vous surveillera attentivement pour tout symptôme nouveau ou aggravé pendant cette période.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de recevoir l'injection de triptoréline,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la triptoréline, à la goséréline (Zoladex), à l'histréline (Supprelin LA, Vantas), au leuprolide (Eligard, Lupron), à la nafaréline (Synarel), à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients de la triptoréline injectable. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

- informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : amiodarone (Nexterone, Pacerone); bupropion (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban); carbamazépine (Tegretol, Teril, autres); méthyl dopa (dans Aldoril); métoprolol (Reglan); la réserpine ou les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS) tels que la fluoxétine (Prozac, Sarafem), la sertraline (Zoloft) et la paroxétine (Paxil). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.
- informez votre médecin si vous ou un membre de votre famille avez déjà eu le syndrome du QT long (affection qui augmente le risque de développer un rythme cardiaque irrégulier pouvant entraîner un évanouissement ou une mort subite). Informez également votre médecin si vous souffrez ou avez déjà souffert de diabète; cancer qui s'est propagé à la colonne vertébrale (colonne vertébrale); obstruction urinaire (blocage qui provoque des difficultés à uriner), un faible taux de potassium, de calcium ou de magnésium dans le sang, une crise cardiaque ; arrêt cardiaque; une maladie mentale; une crise ou une épilepsie; un accident vasculaire cérébral, un mini-accident vasculaire cérébral ou d'autres problèmes cérébraux ; une tumeur au cerveau; ou une maladie cardiaque, rénale ou hépatique.
- vous devez savoir que la triptoréline ne doit pas être utilisée chez les femmes enceintes ou susceptibles de le devenir. Informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de devenir enceinte ou si vous allaitez. Si vous pensez être tombée enceinte alors que vous utilisiez l'injection de triptoréline, appelez immédiatement votre médecin. L'injection de triptoréline peut nuire au fœtus.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

L'injection de triptoréline peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

- mal de crâne
- brûlures d'estomac
- constipation
- bouffées de chaleur (une vague soudaine de chaleur corporelle légère ou intense), transpiration ou moiteur
- diminution de la capacité ou du désir sexuel
- changements d'humeur tels que pleurs, irritabilité, impatience, colère et agressivité
- douleur aux jambes ou aux articulations
- douleur mammaire
- une dépression
- douleur, démangeaisons, gonflement ou rougeur à l'endroit où l'injection a été administrée
- difficulté à s'endormir ou à rester endormi
- la toux

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence :

- urticaire

- éruption
- démangeaison
- **difficulté à respirer ou à avaler**
- gonflement du visage, des yeux, de la bouche, de la gorge, de la langue ou des lèvres
- enrouement
- convulsions
- douleur thoracique
- douleur dans les bras, le dos, le cou ou la mâchoire
- **discours lent ou difficile**
- étourdissements ou évanouissements
- faiblesse ou engourdissement d'un bras ou d'une jambe
- pas capable de bouger les jambes
- douleur osseuse
- miction douloureuse ou difficile
- sang dans les urines
- urination fréquente
- **soif extrême**
- la faiblesse
- **Vision floue**
- bouche sèche
- **nausée**
- vomissement
- **haleine qui sent le fruit**
- diminution de la conscience

Chez les enfants recevant une injection de triptoréline (Triptodur) pour une puberté précoce centrale, de nouveaux symptômes ou une aggravation du développement sexuel peuvent survenir au cours des premières semaines de traitement. Chez les filles, l'apparition de menstruations ou de spotting (légers saignements vaginaux) peut survenir au cours des deux premiers mois de ce traitement. Si le saignement persiste au-delà du deuxième mois, appelez votre médecin.

L'injection de triptoréline peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels lors de l'utilisation de ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

En cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne sur <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira certains tests de laboratoire et prendra certaines mesures corporelles pour vérifier la réponse de votre corps à l'injection de triptoréline. Votre glycémie et votre hémoglobine glycosylée (HbA1c) doivent être contrôlées régulièrement.

Avant de subir un test de laboratoire, informez votre médecin et le personnel du laboratoire que vous recevez une injection de triptoréline.

Demandez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur l'injection de triptoréline.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

Noms rands

- Trelstar®
- Triptodur®

Dernière révision - 15/01/2018

[Apprenez à citer cette page](#)



[Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.](#)

AHFS® Renseignements pour les patients sur les médicaments MC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisée par l'ASHP.

